



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



5000432301



E. BIBL. RADCL.

~~7/18~~ ~~57.10.21~~
189493 e. 62





CURCULIONIDUM
DISPOSITIO METHODICA

CUM GENERUM CHARACTERIBUS, DESCRIPTIONIBUS
ATQUE OBSERVATIONIBUS VARIIS

S E U

P R O D R O M U S

A D

SYNONYMIAE INSECTORUM

P A R T E M IV.

A U C T O R E

C. J. S C H O E N H E R R,

REG. SYEC. COLLEGI COMMERCI CONSIL. ACAD. REG. SCIENT. HOLMIENS.-
SOC. IMP. NAT. STUDIOS. MOSCOV.-ACAD. ITAL.- SOCIET. NAT. SCRUTAT.
BEROL.- WETTERAV.- GOTHOB. ATQUE SOC. PHYSIOGR. LUND.
CET. MEMBRO.

L I P S I A E

APUD FRIDERICUM FLEISCHER.

1 8 2 6.

INSTRUMENTUM

INSTRUMENTUM

Quam multiplicata sunt opera tua, *Jehovah*! Omnia ipsa in
sapientia fecisti: impleta est terra possessionibus tuis.

Psalm. CIV. 24.

L E C T O R I.

Quae de opusculo hocce Lectori praecipue praemonenda habui, una cum Tabula Synoptica in Ephemeride Isis inserta, jam in medium proposui. Nonnulla inde repetens, alia quaedam haec addenda putavi.

In continuanda, quam inchoavi, *Synonymia Insectorum* occupatus, non potui, quin familiae *Curculionidum* perlustrandae studium adhiberem singulare quidem et diuturnum. Immortalis de LINNÉ vix centum hujus familiae species novit, septingentas recensuit OLIVIER, FABRICIUS circiter septingentas et octoginta; mihi vero contigit, ut mille et septingentas inspicere et examinare potuerim. His si adnumerantur aliae, quibus quidem careo, quas tamen plene et exacte alii descripserunt auctores, numerus hujus familiae, inter Coleoptera ditissimae, duo certe millia excedit.

Familia tam numerosa aliter ac usque adhuc, tractari poscere mihi visa est. Illam vero systematice disponere eo difficilius fuit, quo rarius partes cibariae, quae ad characteres generum essentielles constituendos vulgo adhibentur, conspicuae sunt, sed filiformi et quam maxime

gracili rostro plerumque includuntur. Omnino igitur necesse visum est mihi, ut ad alios characteres genericos recurrerem. Hos ex antennis, rostro ceterarumque partium essentialium forma externa requisivi.

Forsan tamen in eo reprehendar, quod generum saltem magis vulgarium et numerosorum partes cibarias examinare et exponere haud conatus sum. Cum vero subtilissima rostri structura impediret, quominus id in omnibus fieret, nec unquam, me quidem iudice, Systema quoddam certum characteribus, qui tam difficile determinentur, inniti possit; et quaedam praeterea genera ita sint rara, ut ipse non possiderem, sed ex aliorum collectionibus mutuo acciperem individua examinanda; quae tamen dissolvere mihi non licuit; has itaque partes omnino omittendas duxi. Interdum quoque vidi, partes cibarias, magis etiam conspicuas, ex gr. mandibulas, forma et qualitate valde differre in speciebus de cetero maxime affinis et structura simillimis, ut in subgenere *Phloeotribi* et *Euparii*, generis *Anthribi*, et hinc quoque nova accessit causa, quae, ne nimiam harum partium haberem rationem, me deterruit.

Id imprimis egi, ut copiosae huius Familiae varie formatas species in catervas seu series naturales congregarem; quibus nomina imposui generica, cum id haud dubie maiorem memoriae adferat commoditatem, quam multitudo Sectionum et Subdivisionum, numeris notarum. Quis nunc est scientiae huius status, dum paucarum adhuc specierum vitae consuetudo et metamorphosis inno-

tuerunt, paucaeque partes cibariae rite examinatae sunt, intempestivum forsitan esset, sperare fore, ut jam constitui possent genera perfecte naturalia. Quae cum aliquando constitui possunt, hae tamen, quas conguessi species, certe cohaerebunt, vel ut propria genera, vel ut Subgenera et Subdivisiones aliorum generum; quod autem verae rerum naturalium scrutationi minoris erit momenti. Huic tamen fini obtinendo hanc specierum praevidiam congestionem haud inutilem putavi.

Omnes, quas admisi, Divisiones naturae, non plane, quod equidem fateor, conveniunt, cum interdum genera, quae, si alias respexeris partes, propinqua videntur, longe separent; has tamen Subdivisiones, rationibus artificiosis innixas, multitudini tam confusae et quasi chaoticae ordinandae adhuc prorsus necessarias duxi. Ne Orthoceri quidem et Gonatoceri, ut Ordines, naturae omnino innituntur; affinitas certe quaedam, plura quoad genera, illos intercedit; tales vero characteres, ex quibus facilius discernantur, his ordinibus definire conatus sum.

Sensim forsitan Dispositio generica naturae magis consentanea fieri poterit. — Ne vero, in transponendis speciebus ab alio in aliud genus, commutatione quoque nominum specificorum et rescriptione rubricarum opus sit, quod in maioribus saltem Musaeis magnum adferret temporis dispendium, his omnibus generibus nomina imposui masculina, qualia habent genera majora, jam antea masculine nominata ex gr. Curculio, Rhynchaenus, Rhynchites, Anthribus, Brenthus, Lixus etc.

Quae vero commendarunt auctores recentiores nomina foeminina, et pauca sunt, nec horum causa perutilem, ut opinor, regulam abjicere volui.

Nomina generica, ab Entomologis celeberrimis, GERMAR, DEJEAN, MEGERLE cet. his temporibus condita interdum mutavi. Cum enim ad haec nomina nulli expositi sint characteres generici, quibus certe innotescere potuit, quodnam Insectum pro typo adhibuerint, et diversas etiam in generibus construendis regulas sequamur, unde factum est, ut unum eorum genus in plura ego dividerim, in horum nominum locum alia substituere necesse mihi fuit.

Plures certe Entomologos hocce meum conamen in omnibus haud probaturos, non possum, quin ominer. An igitur illud in medium proferrem, haesitavi. Inopia vero, qua adhuc laboravimus, operis plane systematici hanc circa familiam copiosissimam et ardens meum desiderium, ut haud exigua, quae mihi contigit, collectione scientiae carissimae aliquid afferrem incrementi, omnem mihi haesitationem exemit. Animadversionibus, quas circa Tabulam meam Synopticam in Iside propositam, Entomologorum nostri temporis princeps, LATREILLE, in Bulletin des Sciences naturelles et de Geologie inseruit, breviter haec respondeam.

Minus recte a me factum contendit Celeberr. LATREILLE, quod familiae huic nomen Curculionidum imposuerim, cum alia quoque comprehendat genera, ut Bruchum et Attelabum, quae diversa descripsit Linné. Hujus in nominis locum nomen Rhynchophori resti-

tuendum ipse commendat; quod tamen, mea ex sententia, ambiguitatem adferret, cum hoc nomen generi *Calandrae* primum imposuerit Herbst. *). Praecipua vero causa, cur hanc animadversionem probare non possim, haec est, quod LINNÉ generi suo *Curculionis*, paucis modo exceptis, omnes hujus familiae species adnumeravit. Haec utique eandem, quam Celeberr. LATREILLE, secutus sum regulam, qua ex genere quodam primario tota nominatur familia, ex gr. *Carabici*, quamquam *Odocantham* ut speciem *Attelabi* posuerit LINNÉ; *Cerambycini*, etsi ut genus diversum *Lepturam* habuerit idem; *Chrysomelinae*, licet jam diversam statuerit *Cassidam*, ut alia omittam. Cur nomina terminationis tantum masculinae scripserim, nec partes cibarias ad characteres genericos significandos adhibuerim, jam supra ostendi. — Quod dedit Celeberr. LATREILLE promissum, se ex partibus cibariis genera hujus familiae dispositurum, forsán jam certo spondet; hoc illi conamen prospere successurum.

Quantum fieri potuit, omnem adhibui operam, ut accuratior et regulis systematis semper consentiens essem. Quae mihi deest facultas linguae satis bene utendae eruditorum descriptionibus meis molestam forsán aequalitatem attulit, et in hac quoque re intelligentium expeto indul-

*) Nec probanda mihi videtur, quam (Nov. Act. Ups. Vol. VII.) proposuit celeberr. TRUVET, denominatio: *Coleoptera rostrata*, cum plura sint genera, ut *Lycus*, *Stenostoma*, *Mycterus*, *Rhinosimus* (*Salpingus*) etc. quae omnia, licet hujus non sint familiae, rostro instructa sunt.

gentiam. Quoties cetera permiserunt negotia, per annos quadraginta, lubens vacavi scientiae, ex qua maximam cepi oblectationem, quaque haud parum ad summam omnium rerum Originem mens mea erecta fuit, et jucundissimum mihi esset laboris praemium si ad carissimam excolendam scientiam hocce meo conamine aliquid conferre valuerim.

In ordinando Systemate mihi met ipsi non semper satisfeci, nec unquam speravi, primum in hac materia tentamen mihi omnino prospere successurum. Licet enim natura summi saepe ordinis et congruentiae plenam se nobis contemplandam sistat, oculis tamen nostris hebetibus atque obtusis confusa interdum videtur et fere chaotica. Artifici summae sapientiae suam debet originem, nec angustis, prospectui nostro positis finibus, quos Systema vocamus, includi patitur. Altius sane profundiusque illam contempletur necesse est, quisquis verum illius ordinem atque tenorem perspicere velit. Illuc vero demum, lente licet et pededentim, omnia et singula nostra tendant conamina!

Si vero quodam usus fuerim successu, eundem magna ex parte pluribus meis scientiaeque amicis deberi, gratissimus agnosco. DOM. GEBMAR, Professor Halensis celeberrimus, qui ipse bene atque prospere hanc tractavit familiam, summa cum benignitate varias mecum communi-
cavit annotationes graves atque doctissimas, cum circa diversarum corporis partium structuram, tum circa quaedam nova ab ipso nondum descripta Curculionidum genera, et liberaliter mihi hanc dedit veniam, ut quidquid

ex illis et quantum voluerim, ad meum usum adhiberem. Cum vero genera nostra diversis innitantur fundamentis, alioque prorsus ordine disponantur, cumque laetam foveam spem, fore, ut in familia hac ulterius examinanda et describenda operam ipse suam continuat, illius inventa et observationes promulgare ineptum putavi, contentus iis quae proprio Marte efficere potuerim. Liberalitati vero illius et in me benevolentiae summas debeo agoque gratias. Illustriss. Comes DEJEAN, (Parisiis) qui eximie hanc amat et colit scientiam, summa sua liberalitate et litterarum commercio mihi utilissimo, me sibi devinctissimum reddidit. Dom. STEVEN, Consil. Stat. et Entomologus eximius (Symphoropoli in Tauria) plurimos Curculiones rarissimos mihi liberalissime condonavit. Popularibus meis atque amicis dilectissimis, aestimatis-
simo, et meritis-
simo D^m. GYLLENHAL, Summ. Excub. Praef., et D^m. Professore DALMAN, Entomologorum sollertissimo, quorum saepe consiliis et opera adjutus sum, satis dignas numquam persolvere possum gratias. — Plures quoque alii amici, huic operi, quod per decem annos lucubravi, magno fuerunt adjumento: Dom. Professor BESSER (in Volhynia.) D. Consiliar. Dicast. Camer. BILLBERG (Holmiae), D. FREYREISS (Brasiliae), D. Consiliar. Aulicus. GEBLER (in Sibiria), Generos. Comes MANNERHEIM (Petropoli), D. STURM (Norimbergae), D. Prof. et Commend. THUNBERG (Upsaliae), D. WESTERMANN (Hafniae), D. de WINTHEM (Hamburgi), omnes quasi aemula liberalitate certantes plurima summi

pretii individua hujus praesertim familiae mihi donarunt. Nec heic silentio praetereunda sunt, quae mihi praestiterunt officia hujus vel illius nominis, Celeberr. viri Dom. Profess. SAHLBERG (Aboae) de Hist. Natur. Finslandiae meritiassimus, qui summo cum studio quaedam antea incognitas Curculionidum species descripsit, D. Profess. AN. AFZELIUS (Upsaliae), D. Subcentur. BOHEMAN (Smolandiae), D. Profess. FALLÉN (Lundae), D. Consiliar. Stat. Act. FISCHER DE WALDHEIM (Mosquae), D. Praepos. GRAPH (Lapponiae), Dom. HOOKER, Esq. (Norvichiae), D. Praef. Mus. Nat. MEGERLE V. MÜHLFELD (Viennae), Dom. Prof. REINHARDT (Hafniae), D. Senator SCHNEIDER (Stralsundii), D. SPENCE, Esq. (Hulliae), D. Marchio illustriss. SPINOLA (Genuae) et D. Prof. ZETTERSTEDT (Lundae). Omnem mihi praestitam humanitatem gratissimo semper recondam pectore, et optarem, ut hocce meum in scientia nostra communi conamen horum amicorum quodam modo saltem satisfaceret expectationi.

Sparresöter prope Scaram d. 7. Octobr. MDCCCXXV.

C O R R I G E N D A.

pag. 21. Gen. 170. Tapeinotus — leg. Tapinotus.

pag. 49. lin. 9. lineaara — leg. lineare.

N O T I F I C A T I O.

Primo quoque tempore, quam potissimum potest, *Synonymiam Insectorum*, ad quam post partem tertiam jam dudum editam, necessarium apparatus acquisivi, jam porro continuandam suscipere animus est.



DISPOSITIO METHODICA
CURCULIONIDUM.

— — — — — et audere non dedecet.

Quintilian.

TABULA SYNOPTICA FAMILIAE CURCULIONIDUM.

TARSI QUADRI-ARTICULATI. — CAPUT PLUS MINUSVE
ROSTRATUM; OS APICALE; MANDIBULAE SAEPIS-
SIMAE, VALIDAE; PALPI CETERAEQUE PARTES MINUTAE,
OCCULTATAE. — ANTENNAE ROSTRO INSERTAE, SAEPIS-
SIME APICE CLAVATAE. — CORPUS IN PLERISQUE
DURUM.

Ordo 1s. ORTHOCERI.

Antennae non fractae, h. e. ad articulum secundum
haud geniculatae; scapus (articulus basilaris) non valde
elongatus.

Sectio 1ma. Antennae articulis 11, 12.

(*Divisio 1ma. Bruchides: Rostrum latum,
deflexum. Antennae sensim crassiores, serratae aut
pectinatae, in paucis clavatae, 11 — articulatae. Tarsi
distincte 4-articulati, articulo penultimo bilobo.)*

Genus 1. *Bruchus* Auctorum.

Typus: *Bruch. Pisi* Auct. 90

Genus 2. *Rhaebus* Fisch.

Typus: *Rhaebus Gebleri* Fisch. 1

Genus 3. *Urodon* nob.

Typus: *Anthrib. sericeus* Fabr. l. ru-
fipes Latr. 2

(*Divisio 2a. Anthribides. Rostrum latum,
deflexum. Antennae clavatae, 11 — articulatae. Elytra*

Species
nobis
cognit.

anum haud occultantia. Tarsi indistincte 4 — articulati, articulo secundum plerumque tertium subincludente.)

Species
nobis
cognit.

Cohors 1a. Clava antennarum angusta, subincrassata; articulo ultimo acuto.

Genus 4. Anthribus Auctor.

Typus: Anthr. albinus Auct. 2

Subgenus A. Phloeotragus nob.

Typus: Anthr. heros Fabr. 3

Cohors 2a. Clava antennarum abrupto - incrassata, subcompressa, articulis subapproximatis.

Subgenus B. Ptychoderes nob.

Typus: Anthr. elongatus Germ. 2

Subgenus C. Platyrhinus Clairv.

Typus: Anthr. latirostris Auct. 1

Subgenus D. Tropideres nob.

Typus: Anthr. albirostris Auct. 9

Subgenus E. Euparius nob.

Typus: Anthr. (Eupar.) Tigris nob. 7

Subgenus F. Phloeobius nob.

Typus: Anthr. griseus Fabr. 2

Subgenus G. Phaenithon nob.

Typus: Anthr. costatus Dej. 3

Subgenus H. Gymnognathus nob.

Typus: Anthr. (Gymnogn.) signatus nob. 2

Subgenus I. Brachytarsus nob.

Typus: Anthr. varius Auct. 3

Cohors 3a. Clava antennarum abrupto - incrassata, articulis valde remotis.

Subgenus K. Stenocerus nob.

Typus: Anthr. fulvitaris Germ. 2

Subgenus L. Corrhecerus nob.

Typus: Anthr. mixtus Germ. 1

Subgenus M. Araecerus nob.

Typus: Anthr. Coffeae Fabr. 2

Genus 5. Eucorynus nob.

Typus: Anthr. crassicornis Fabr. 1

(*Divisio 3a. Attelabides.* Rostrum subcylindricum, deflexum, saepe filiforme, vel saepius apice dilatatum. Caput pone oculos elongatum. Antennae clavatae, 11, 12 articulatae. Elytra elongato - subquadrata. Pygidium nudum.)

Genus 6. Apoderes Oliv.

Typus: Attel. Coryli Fabr. 11

Genus 7. Attelabus Auct.

Typus: Attel. Curculionoïdes Fabr. 20

Genus 8. Rhynchites Herbat. Gyllen.

Typus: Rhynch. Populi Auct. 23

(*Divisio 4a. Rhinomacerides:* Rostrum elongatum, apice saepius dilatatum, rarius subcylindricum. Caput breve, transversum. Antennae clavatae, 11-articulatae. Elytra oblonga, sublinearia. Pygidium subtectum.)

Genus 9. Rhinomacer Fabr. Oliv.

Typus: Rhinom. attelaboïdes Fabr. 2

Genus 10. Auletes nob.

Typus: Tubicenus rhynchitoïdes Dej. 1

(*Divisio 5a. Apionides:* Rostrum subporrectum, cylindricum l. filiforme, in paucis basi crassum, apice subulatum. Antennae clavatae, 11 - articulatae, versus medium l. ad basin insertae. Caput pone oculos elongatum. Elytra anum tegentia.)

Genus 11. Apion Herbst, Germ., Gyll., Kirby. 108

(*Divisio 6a. Rhamphides:* Rostrum elongatum, inflexum. Antennae clavatae, 11-articulatae, in sincipite insertae. Pedes postici saltatorii.)

Genus 12. Rhamphus Clairv.

Typus: Rhamph. flavicornis Auct. 2

(*Divisio 7a. Thamnophilides:* Rostrum elongatum, cylindricum, deflexum. Antennae arcuatae, clavatae, 12-articulatae, versus medium rostri in canalicula insertae. Caput pone oculos non elongatum. Pygidium nudum.)

		Sp.nob. cognit.
Genus 13.	Laemosaccus nob. Typus: Rhynchaen. plagiatus Fabr.	1
Genus 14.	Thamnophilus nob. — (Magdalis Germ.) Typus: Rhynchaen. violaceus Auct.	14
	Subgenus Panus nob. Typus: Rhynchaen. Rhina var. β . Gyll. Ins. Sv.	1
(Divisio 8 ^a . Ithycerides: Rostrum breve, aut teres aut subangulatum. Antennae breves, clavatae, 12-articulatae.)		
Genus 15.	Chlorophanus Dalm. Germ. Typus: Curc. viridis Auct.	6
Genus 16.	Ithycerus Dalm. Typus: Rhynchites curculionoides Herbst.	1
Genus 17.	Mecaspis nob. Typus: Lixus palmatus Oliv.	1
Genus 18.	Pachycerus Gyllenh. Typus: Lixus madidus Oliv.	1
Genus 19.	Rhinocyllus Germ. Typus: Curc. thaumaturgus Ross.	4
Genus 20.	Lachnaeus nob. Typus: Lachn. crinitus nob.	1
Genus 21.	Nerthops nob. Typus: Rhynchit. multiguttat. Wiedem.	1
Genus 22.	Oxyops Dalm. Typus: Oxyops clathratus Dalm. in Litt.	1
Genus 23.	Tanaos nob. Typus: Apion sanguineum Thunb. n. Act. Ups.	1
Genus 24.	Stenocorynus nob. Typus: Curc. crenulatus Fabr.	1
(Divisio 9 ^a . Cryptopsides: Rostrum breve, crassum, subinflexum. Antennae breves, tenues, arcua- tae, clavatae, 12-articulatae. Thorax subtus pro re- ceptione rostri profunde canaliculatus. Scutellum nullum. Tarsi angustati, setosi.)		

TABULA SYNOPTICA.

7

Genus 25. <i>Cryptops</i> nob.	Sp.nob. cognit.
Typus: <i>Brachycerns quadratus</i> Wiedem.	6
(<i>Divisio</i> 10a. <i>Antliarhinides</i> : Rostrum porrectum. Antennae clavatae, 11-articulatae; clava angusta, tri-articulata. Scutellum distinctum. Corpus deplanatum.)	
Genus 26. <i>Antliarhinus</i> Billb.	
Typus: <i>Curc. Zamiae</i> Thunb., Herbst.	1
(<i>Divisio</i> 11a. <i>Brenthides</i> : Rostrum porrectum. Antennae non clavatae, 11-articulatae. Collum distinctum. Scutellum haud observandum. Abdomen segmento 1 et 2 longissimis, arcte junctis, aegre discernendis, 3 et 4 brevissimis, transversis instructum, ultimo breviusculo, semicirculari. Corpus durum, subcylindricum, elongatum.)	
Genus 27. <i>Brenthus</i> Auctor.	
Typus: <i>Br. canaliculatus</i> Fabr. . . .	12
Subgenus A. <i>Hormocerus</i> nob.	
Typus: <i>Brenth. reticulatus</i> Fabr.	4
Subgenus B. <i>Arrhenodes</i> Steven.	
Typus: <i>Br. septentrionis</i> Herbst.	7
Subgenus C. <i>Nemorhinus</i> Steven.	
Typus: <i>Br. myrmecophaga</i> Herbst.	8
Genus 28. <i>Taphroderes</i> nob.	
Typus: <i>Taphr. brevipes</i> nob. . . .	2
(<i>Divisio</i> 12a. <i>Belides</i> : Rostrum subporrectum. Antennae non clavatae, 11-articulatae. Collum indistinctum. Scutellum manifestum. Abdomen segmentis quinque subaequalibus instructum. Corpus minus durum, angustum, naviculare.)	
Genus 29. <i>Belus</i> nob.	
Typus: <i>Lixus semipunctatus</i> Fabr. .	1
<hr/>	
<i>Sectio</i> 2 ^{la} . Antennae articulis 9, 10.	
(<i>Divisio</i> 13a. <i>Cylades</i> : Rostrum porrectum. Antennae clavatae, 10-articulatae; clava longissima, linearis, uni-articulata.)	

8 TABULA SYNOPTICA.

Genus 30. *Cylas* Latr., Oliv., Germ.

Typus: *Cyl. formicarius* Oliv. . . .

Sp.nob.
cognit.

1

(*Divisio* 14^a. *Ulocerides*: Rostrum porrectum, subulatum. Antennae breves, crassae, 9 - articulae. Clava parva, subsolida. Corpus subcylindricum, angustum.)

Genus 31. *Ulocerus* nob.

Typus: *Uloc. lacerosus* nob. . . .

3

(*Divisio* 15^a. *Oxyrhynchides*: Rostrum elongatum, deflexum, filiforme. Antennae breves, porrectae, validae, articulis 7 ante clavam; clava subsolida, apice spongiosa, forte articulos indistinctos includens. Tarsi latiusculi, spongiosi. Corpus oblongum, durum.)

Genus 32. *Oxyrhynchus* nob.

Typus: *Calandra discors* Fabr. . . .

1

(*Divisio* 16^a. *Brachycerides*: Rostrum breve, crassum, plerumque deflexum, in paucis porrectum. Antennae breves, validae, articulis 7 l. 8 ante clavam; clava parva, subsolida, apice spongiosa, forte articulos indistinctos includens. Tarsi angustati, setosi, haud spongiosi. Corpus breviter ovatum, durum, apterum.)

Genus 33. *Episus* Billb.

Typus: *Brachycer. rostratus* Fabr. . .

2

Genus 34. *Brachycernus* Fabr.

Typus: *Brachyc. obesus* Fabr. . . .

40

Ordo 2^a. GONATOCERI.

Antennae geniculatae; scapus (articulus basilaris) valde elongatus, saepius in canalicula ad latera rostri insertus. Antennae in omnibus clavatae, articulis clavae saepissime arcte connexis.

Legio 1^{ma}. *Brachyrhynchi* (Curculiones Fabr.) Rostrum plus minusve crassum et deforme, breviusculum, parum arcuatum. Antennae prope apicem rostri saepe juxta sinum oris insertae, 12-articulatae.

TABULA SYNOPTICA.

9

<i>Phalanx</i> 1ma. Canalicula antennalis (scrobs) infra-ocularis, curvata vel obliqua.	Species nobis cognit.
(<i>Divisio</i> 1ma. Entimides: Rostrum breviusculum, deflexum, terefinsculum, crassissimum, extrorsum valde incrassatum.)	
<i>Subdivisio</i> 1ma. Corpus brevius, alatum. Humeri angulati, prominuli. Thorax semper pone oculos lobatus.	
Genus 35. Rhigus Dalm. Typus: Curc. tribuloïdes Pall., Herbst.	9
Genus 36. Polydus nob. Typus: Polyd. Stevenii nob.	1
Genus 37. Entimus Germ. Typus: Curc. imperialis Auct.	4
<i>Subdivisio</i> 2da. Corpus oblongum, apterum. Humeri subrotundati.	
Genus 38. Hipporhinus Billb. Typus: Curc. pilularius Fabr. Oliv.	24
Genus 39. Epirrhyinchus nob. Typus: Curc. Argus Sparrm.	1
Genus 40. Prypnus nob. Typus: Prypn. 5-nodosus nob.	2
(<i>Divisio</i> 2da. Pachyrhynchides: Rostrum brevissimum, crassum, deflexum, saepius angulatum, apice vix incrassatum. Humeri non angulati. Corpus apterum.	
<i>Cohors</i> 1ma. Thorax pone oculos lobis productis.	
Genus 41. Cherrus Dalm. Typus: Curc. infaustus Oliv.	3
Genus 42. Deracanthus nob. Typus: Curc. spinifex Fabr.	1
<i>Cohors</i> 2da. Thorax pone oculos non lobatus.	
Genus 43. Pachyrhynchus Germ. (Somatodes nob. olim.) Typus: Pachyr. moniliferus Germ.	1
Genus 44. Psalidium Illig. Typus: Curc. maxillosus Fabr.	1

		Sp.nob. cognit.
Genus 45. <i>Syzygops</i> nob.		
Typus: <i>Syzyg. Cyclops</i> nob.		1
(Divisio 3a. <i>Brachyderides</i> : Rostrum sub- horizontale, latitudine fere capitis eisque contiguum, supra saepius planiusculum, raro teretiusculum, in ple- risque breve vel brevissimum, in aliis vero magis elon- gatum.)		
<i>Subdivisio 1ma.</i> Corpus saepius brevius, in pau- cis ovatum vel oblongo-ovatum, apterum; humeri rotundati l. obtusi, non prominuli.		
*) Genus 46. <i>Thylacites</i> Germ. (<i>Cycloderes</i> nob. olim.)		
Typus: <i>Curc. Robiniae</i> Herbst.		10
Subgenus A. <i>Cneorhinus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. Barcellonicus</i> Herbst.		12
Subgenus B. <i>Strophosomus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. Coryli</i> Auct.		13
Subgenus C. <i>Sciaphilus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. muricatus</i> Fabr., Gyll.		5
Subgenus D. <i>Brachysomus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. hirsutus</i> Fabr., Gyll.		2
Subgenus E. <i>Blosyrus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. Oniscus</i> Oliv.		2
Subgenus F. <i>Platycopes</i> Dalm.		
Typus: <i>Curc. argyrellus</i> Sparrm.		1
**) Genus 47. <i>Herpisticus</i> Germ.		
Typus: <i>Herpist. laevicollis</i> Germ.		1
Genus 48. <i>Brachyderes</i> nob.		
Typus: <i>Curc. incanus</i> Auct.		7
Subgenus <i>Eusomus</i> Germ.		
Typus: <i>Eusom. ovulum</i> Illig., Germ.		3
<i>Subdivisio 2da.</i> Corpus elongatum vel oblongum, plerumque alatum; humeri plus minusve an- gulati l. prominuli.		

TABULA SYNOPTICA.

11

Genus 49. <i>Leptocerus</i> nob., Germ. (<i>Iphius</i> nob. olim.)		Sp. nob. cognit.
Typus: <i>Curc. longimanus</i> Fabr. . . .		25
Subgenus <i>Plectrophorus</i> nob.		
Typus: <i>Leptoc. (Plectroph.) Lutra</i> nob.		2
*** Genus 50. <i>Cyphus</i> nob., Germ. (<i>Cyrtomon</i> nob. olim.)		
Typus: <i>Curc. gibber</i> Fabr.		12
Subgenus A. <i>Platyomus</i> nob.		
Typus: <i>Cyphus cultricolis</i> Germ.		6
Subgenus B. <i>Compsus</i> nob.		
Typus: <i>Cyphus acrolithus</i> Germ.		4
Subgenus C. <i>Oxyderces</i> nob.		
Typus: <i>Curc. cretaeensis</i> Fabr.		1
Genus 51. <i>Hadropus</i> nob.		
Typus: <i>Hadrop. nubiculosus</i> nob.		1
Genus 52. <i>Phaetropus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. candidus</i> Fabr.		1
**** Genus 53. <i>Eustales</i> Germ. (<i>Phaops</i> nob. olim.)		
Typus: <i>Eustal. adamantinus</i> Germ.		4
Genus 54. <i>Exophthalmus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. 4-vittatus</i> Oliv.		3
Genus 55. <i>Diaprepes</i> nob.		
Typus: <i>Curc. Spengleri</i> Fabr.		8
Subgenus <i>Prepodes</i> nob.		
Typus: <i>Curc. vittatus</i> Fabr.		3
Genus 56. <i>Ptilopus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. aurifer</i> Fabr. Oliv.		6
Genus 57. <i>Cratopus</i> Dalm.		
Typus: <i>Lixus melanocephalus</i> Fabr.		11
Genus 58. <i>Pachnaeus</i> nob. (<i>Döcorhinus</i> nob. olim.)		
Typus: <i>Curc. Opalus</i> Boec.		2
Genus 59. <i>Callizonus</i> nob. (<i>Tropirhinus</i> nob. olim.)		
Typus: <i>Curc. 19-punctatus</i> Fabr.		2

		Sp.nob. cognit.
*****) Genus 60. Hypomeces nob.		5
Typus: Curc. squamosus Fabr. . . .		
Subgenus Dereodus nob.		
Typus: Hypom. (Dereod.) denti- collis nob.		1
Genus 61. Anaemerus nob.		
Typus: Curc. tomentosus Fabr. . . .		2
Genus 62. Tanymecus Germ.		
Typus: Curc. palliatus Fabr., Gyll. .		2
Subgenus Asemus nob.		
Typus: Curc. rusticus Fabr. . . .		9
Genus 63. Astycus nob.		
Typus: Curc. adultus Oliv.		1
Genus 64. Lissorhinus nob.		
Typus: Lissorh. Eryx. nob.		1
Genus 65. Protenomus nob.		
Typus: Curc. Saisanensis Gebh. . . .		1
*****) Genus 66. Artipus nob., Sahlb.		
Typus: Artip. corycaeus Sahlb. . . .		1
Genus 67. Sitona Germ.		
Typus: Curc. lineatus Auct.		15
Genus 68. Promecops nob.		
Typus: Promec. nubifer nob.		2
Genus 69. Hadromerus nob.		
Typus: Curc. sagittarius Oliv.		2
Genus 70. Polydrusus Germ. (Phyllerastes nob. olim.)		
Typus: Curc. undatus Fabr., Gyllenh.		18
Subgenus Scythropus nob. (Pachyrhinus nob. olim.)		
Typus: Curc. Mustella Herbst. . .		3
Genus 71. Metallites nob. Germ.		
Typus: Metall. mollis Germ.		6
Genus 72. Entyus nob. (Rembus Germ.)		
Typus: Rembus auricinctus Germ. . .		2
*****) Genus 73. Prostomus Dalm.		
Typus: Curc. scutellaris et exsertus Fabr.		1

TABULA SYNOPTICA.

13

		Species nobis cognit.
*****)	Genus 74. <i>Leptosomus</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. acuminatus</i> Fabr.	
	Oliv.	1
	(<i>Divisio</i> 4a. <i>Cleonides</i> : Rostrum longiuscu- lum, crassum, aut nutans, aut deflexum, plerumque teretiusculum, raro subangulatum, extrorsum saepius subincrassatum.)	
	<i>Subdivisio</i> 1ma. Corpus saepissime alatum.	
*)	Genus 75. <i>Cleonus</i> nob. (<i>Cleonis</i> Dej., Meg, Fisch)	
	Typus: <i>Curc. sulcirostris</i> Auct. . . .	37
	Subgenus <i>Bothynoderes</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. albidus</i> Auct.	15
	Genus 76. <i>Chrysolopus</i> Germ.	
	Typus: <i>Curc. spectabilis</i> Fabr.	1
	Genus 77. <i>Rhytideres</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. plicatus</i> Oliv.	1
**)	Genus 78. <i>Hypsonotus</i> Germ.	
	Typus: <i>Hypson. clavulus</i> Germ. . . .	16
	Subgenus A. <i>Eurylobus</i> nob.	
	Typus: <i>Hypson. cingulatus</i> Germ. . . .	2
	Subgenus B. <i>Lordops</i> nob.	
	Typus: <i>Hypson. principalis</i> Germ. . . .	6
	Subgenus C. <i>Lasiopus</i> nob.	
	Typus: <i>Lasiop. cilipes</i> Sahlb.	1
	Genus 79. <i>Lepropus</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. lateralis</i> Fabr.	1
***)	Genus 80. <i>Aterpus</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. cultratus et bi-crista- tus</i> Fabr.	1
	Genus 81. <i>Gronops</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. lunatus</i> Fabr.	1
	Genus 82. <i>Listroderes</i> nob.	
	Typus: <i>Listrod. costirostris</i> Gyll. in litt.	1
	<i>Subdivisio</i> 2a. Corpus semper apterum.	
****)	Genus 83. <i>Liophloeus</i> Germ.	
	Typus: <i>Curc. nubilus</i> Fabr.	2

14 TABULA SYNOPTICA.

		Sp.nob. cognit.
Genus 84. <i>Geophilus</i> nob.	Typus: <i>Curc. 8-tuberculatus</i> Fabr. .	4
*****) Genus 85. <i>Rhytirrhinus</i> nob.	Typus: <i>Curc. inaequalis</i> Fabr. . .	3
Genus 86. <i>Minyops</i> nob.	Typus: <i>Liparus carinatus</i> Oliv. vel <i>Curc. variolosus</i> Fabr.	1
*****) Genus 87. <i>Barynotus</i> Germ.	Typus: <i>Curc. obscurus</i> Fabr. . . .	7
Genus 88. <i>Alolphus</i> nob.	Typus: <i>Curc. 3-guttatus</i> Fabr. . . .	2
(Divisio 5a. <i>Molytides</i> : Rostrum longius, de- flexum, subcylindricum, paullo arcuatum, plerumque minus crassum.)		
<i>Subdivisio</i> 1 ^{ma} . Tibiae omnes apice unco valido intus armatae.		
<i>Cohors</i> 1 ^{ma} . Corpus alatum.		
*) Genus 89. <i>Lepyrus</i> Germ.	Typus: <i>Rhynchaen. Colon.</i> Fabr. . .	2
Genus 90. <i>Tanysphyrus</i> Germ.	Typus: <i>Rhynch. Lemnae</i> Fabr. . . .	1
***) Genus 91. <i>Hylobius</i> Germ. olim.	Typus: <i>Rhynch. Pineti</i> Auct. . . .	10
<i>Cohors</i> 2 ^{da} . Corpus apterum. Elytra antice sem- per junctum introrsum emarginata.		
Genus 92. <i>Molytes</i> nob. (<i>Liparus</i> Oliv. Germ.)	Typus: <i>Curcul. germanus</i> Linn. . . .	6
Genus 93. <i>Plinthus</i> Germ.	Typus: <i>Curc. Megerlei</i> Fabr.	7
<i>Subdivisio</i> 2 ^{da} . Tibiae omnes apice muticae. Cor- pus saepissime alatum.		
****) Genus 94. <i>Phytonomus</i> nob. (<i>Hypera</i> Germ.)	Typus: <i>Rhynch. Polygoni</i> Auct. . .	37
Genus 95. <i>Coniatus</i> Germ. olim.	Typus: <i>Curc. Tamarisci</i> Fabr. . . .	3

<i>Phalanx</i> 2da. Canalicula antennalis seu scroba sub- recta, versus medium oculi adscendens.		Species nobis cognit.
(Divisio 6a. <i>Phyllobides</i> : Rostrum breve, subhorizontale, crassiusculum, saepius teretiusculum, nonnunquam aliquantulum incrassatum, interdum quo- que supra planum. Corpus elongatum, alatum; humeri obtusè angulati.)		
<i>Subdivisio</i> 1a. Thorax pone oculos non lobatus.		
*) Genus 96. <i>Mylocerus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. curvicornis</i> Fabr. . . .	6	
Genus 97. <i>Macrocorynus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. discoideus</i> Oliv. . . .	1	
***) Genus 98. <i>Phyllobius</i> nob. Germ.		
Typus: <i>Curc. Pyri</i> Auct.	30	
<i>Subdivisio</i> 2da. Thorax pone oculos lobis productis.		
*** Genus 99. <i>Cyphicerus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. orbitalis</i> Wiedem. . . .	2	
Genus 100. <i>Amblyrhinus</i> nob.		
Typus: <i>Amblyrh. poricollis</i> nob. . .	1	
(Divisio 7a. <i>Cyclomides</i> : Rostrum breve, plus minusue crassum, subhorizontale l. subdeflexum, lineare, saepius teretiusculum, nonnunquam apicem versus subangustatum. Corpus brevius, l. subovatum, plerumque apterum; humeri rotundati l. obtusi.)		
*) Genus 101. <i>Episomus</i> nob.		
Typus: <i>Curc. Lacerta</i> Oliv. l. C. avarus Fabr.	4	
***) Genus 102. <i>Pholicodes</i> nob.		
Typus: <i>Pholic. plebejus</i> nob. . . .	2	
Genus 103. <i>Ptochus</i> nob.		
Typus: <i>Ptoch. porcellus</i> nob. . . .	3	
Genus 104. <i>Stomodes</i> nob.		
Typus: <i>Stom. tolutarius</i> nob. . . .	1	
Genus 105. <i>Trachyphloeus</i> Germ.		
Typus: <i>Curc. scabrieulus</i> Auct. . .	6	
Genus 106. <i>Ombias</i> Germ. olim.		
Typus: <i>Curc. rotundatus</i> Fabr. . . .	10	

	Sp.nob. cognit.
Genus 107. <i>Peritélus</i> Germ.	3
Typus: <i>Perit. sphaeroides</i> Germ. . .	
Subgenus A. <i>Holcorhinus</i> nob.	
Typus: <i>Perit. (Holcorh.) hispidus</i> nob.	2
Subgenus B. <i>Pyctoderes</i> nob.	
Typus: <i>Curc. Gallina</i> Sparrm. <i>Act. Holm.</i>	1
Subgenus C. <i>Oosomus</i> nob.	
Typus: <i>Perit. (Oosomus) Hariolus</i> nob.	2
Subgenus D. <i>Phlyctinus</i> nob.	
Typus: <i>Phlyct. callosus</i> nob.	1
Genus 108. <i>Cosmorhinus</i> nob.	
Typus: <i>Cosmorh. cristirostris</i> nob.	1
Genus 109. <i>Sciobius</i> nob.	
Typus: <i>Curc. Tottus</i> , <i>a.</i> Sparrm. <i>Act. Holm.</i>	2
***) Genus 110. <i>Cyclomus</i> nob.	
Typus: <i>Curc. inquinatus</i> nob. .	3
Subgenus <i>Epichthonius</i> nob.	
Typus: <i>Curc. Simus</i> Wiedem. in litt.	1
Genus 111. <i>Eremnus</i> nob.	
Typus: <i>Eremn. exaratus</i> nob. . . .	5
****) Genus 112. <i>Amycterus</i> Dalm.	
Typus: <i>Curc. mirabilis</i> Kirby. .	1
(Divisio 8a. <i>Otiorhynchides</i> : Rostrum breviusculum, crassiusculum, subhorizontale, apice dilatatum et incrassatum, supra subplanum, pterygiis apicalibus divaricatis; scapus antennarum semper pone oculos sese extendens.)	
Subdivisio 1a. Thorax pone oculos non lobatus. Corpus apterum.	
*) Genus 113. <i>Otiorhynchus</i> Germ. (<i>Loborhynchus</i> nob. olim.	
Typus: <i>Curc. clavipes</i> Oliv. l. <i>tenebricosus</i> Gyll.	102
Genus 114. <i>Tyloderes</i> nob.	
Typus: <i>Curc. chrysops</i> Herbst. . .	1

TABULA SYNOPTICA.

17

		Sp.nob. cognit.
Genus 115. Hyphantus Germ.	Typus: Hyph. baecifer Germ. . . .	1
** Genus 116. Élytrodon nob.	Typus: Curc. bidentatus Stev. in litt.	2
<i>Subdivisio 2da.</i> Thorax pone oculos lobatus. Corpus alatum.		
Genus 117. Phytoscaphus nob.	Typus: Phyt. lixabundus nob. . . .	1
Subgenus Chloëbius nob.	Typus: Phyt. (Chloëb.) immeritus nob.	1
<i>(Divisio 9a.</i> Tanyrhynchides: Rostrum perpendiculare, elongatum, sublineare. Scapus antennarum semper supra oculos extensus.		
*) Genus 118. Tanyrhynchus nob.	Typus: Tanyrh. terrenus nob. . .	1
** Genus 119. Myorhinus nob.	Typus: Myorh. Stevenii nob. . .	1
<i>Legio 2a.</i> Mecorhynchi. (Rhynchaenides Fabr.) Rostrum cylindricum l. filiforme, plus minusve elongatum, raro thorace brevius. Antennae ante l. prope medium rostri, nec juxta sinum oris insertae.		
<i>Sectio 1ma.</i> Antennae articulis 11, 12, clava 4-articulata.		
<i>(Divisio 1ma.</i> Erirhinides: Pedes antici basi approximati.)		
<i>Subdivisio 1ma.</i> Scutellum plus minusve distinctum. Alati.		
*) Genus 120. Lixus Auct.	Typus: Lix. paraplecticus Auct. .	43
Genus 121. Pacholenus nob.	Typus: Pachol. pellicens nob. . .	2
Genus 122. Brachypus nob.	Typus: Brach. Lixoides nob. . . .	1
Genus 123. Larinus Germ.	Typus: Rhynch. Cynarae Fabr. . . .	21

		Sp. nob. cognit.
Subgenus <i>Ileomus</i> nob.		3
Typus: <i>Lix. pulverulentus</i> Oliv.		
**)	Genus 124. <i>Heilipus</i> Germ.	
	Typus: <i>Heil. lactarius</i> Germ. . . .	42
	Genus 125. <i>Orthorhinus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. cylindrirostris</i> Fabr.	1
	Genus 126. <i>Parameecops</i> nob.	
	Typus: <i>Curc. farinosus</i> Wiedem. . .	1
	Genus 127. <i>Pissodes</i> Germ.	
	Typus: <i>Rhynch. Pini</i> Auct.	6
	Genus 128. <i>Penestes</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. Tigris</i> Fabr. . . .	1
	Genus 129. <i>Euderes</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. lineicollis</i> Wiedem.	1
	Genus 130. <i>Erirhinus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. aethiops</i> Auct. . .	23
Subgenus <i>Grypidius</i> nob.		
Typus: <i>Rhynch. Equiseti</i> Auct. . .		4
	Genus 131. <i>Hydronomus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. Alismatis</i> Gyll. . .	1
	Genus 132. <i>Brachonyx</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. indigena</i> Gyll. . .	1
	Genus 133. <i>Bradybatus</i> Germ.	
	Typus: <i>Bradyb. Creutzeri</i> Germ. . .	1
	Genus 134. <i>Derelomus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. Chamaeropsis</i> Fabr.	2
	Genus 135. <i>Anthonomus</i> Germ.	
	Typus: <i>Rhynch. druparum</i> Auct. . .	18
***)	Genus 136. <i>Erodiscus</i> nob.	
	Typus: <i>Lixus attenuatus</i> Fabr. . .	2
****)	Genus 137. <i>Balaninus</i> Germ.	
	Typus: <i>Rhynch. nucum.</i> Auct. . .	3
	Genus 138. <i>Amalus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. Scortillum</i> Gyll. .	1
	Genus 139. <i>Coryssomerus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. Capucinus</i> Beck. . .	1
	Genus 140. <i>Hydaticus</i> nob.	
	Typus: <i>Rhynch. velatus</i> Beck. . . .	9

TABULA SYNOPTICA.

19

		Sp.nob. cognit.
Genus 141. <i>Anoplus</i> Schüpp.	Typus: <i>Rhynch. plantaris</i> Gyll. . . .	1
Genus 142. <i>Tychius</i> Germ.	Typus: <i>Rhynch. 5-punctatus</i> Auct.	10
Subgenus <i>Miccotrogus</i> nob.	Typus: <i>Curc. cuprifer</i> Panz. . . .	2
Genus 143. <i>Sibynes</i> nob. (<i>Sibinia</i> Germ.)	Typus: <i>Rhynch. Viscariae</i> Auct. . . .	8
Genus 144. <i>Acallopiatus</i> nob.	Typus: <i>Acallop. vellicosus</i> Gyll. n. sp.	1
Genus 145. <i>Endaeus</i> nob.	Typus: <i>End. castus</i> nob.	1
*****) Genus 146. <i>Sternechus</i> nob.	Typus: <i>Orobitis trachyptomus</i> Germ.	1
Genus 147. <i>Tylomus</i> nob.	Typus: <i>Orobit. gonopteris</i> Germ.	1
*****) Genus 148. <i>Orchestes</i> Illig. (<i>Salus</i> Germ.)	Typus: <i>Orchest. viminalis</i> Auct.	14
Subgenus <i>Tachyerges</i> nob.	Typus: <i>Rhynch. Salicia</i> Fabr. Gyll.	4
<i>Subdivisio 2da. Exscutellati. Apteri.</i>		
*) Genus 149. <i>Solenorhinus</i> nob.	Typus: <i>Curc. porifer</i> Sparrm. Act. Holm.	1
Genus 150. <i>Anchonus</i> nob.	Typus: <i>Rhynch. suillus</i> Fabr.	2
***) Genus 151. <i>Styphlus</i> nob.	Typus: <i>Styphl. penicillus</i> nob.	1
Genus 152. <i>Trachodes</i> Schüpp., Germ.	Typus: <i>Curc. hispidus</i> Linn. l. <i>Rhynch.</i> <i>squamifer</i> Gyll.	5
<i>(Divisio 2a. Cholidēs: Pedes antici basi distantes, inter quos pectus planum, plus minusve im- mittitur.)</i>		

*) Genus 153. <i>Rhinastus</i> nob.		Species nobis cognit.
Typus: <i>Rhin. pertusus</i> Dalm. —		
congen. <i>Cholus sternalicornis</i>		
Germ.		2
Genus 154. <i>Cholus</i> Germ.		
Typus: <i>Chol. albicinctus</i> Germ. . .		5
Subgenus <i>Callinotus</i> nob.		
Typus: <i>Cholus</i> (<i>Callin.</i>) <i>prae-</i>		
<i>fectus</i> nob.		2
Genus 155. <i>Dionychus</i> Germ.		
Typus: <i>Dion. parallelogrammus</i>		
Germ.		5
Subgenus <i>Homalinotus</i> nob., Sahlb.		
Typus: <i>Dion. (Homal.) circum-</i>		
<i>datum</i> Germ.		4
Genus 156. <i>Amerhinus</i> nob., Sahlb.		
Typus: <i>Rhynch. Dufresnii</i> Kirby. l.		
<i>Rh. Pardalis</i> Dalm.		7
Genus 157. <i>Solenopus</i> nob.		
Typus: <i>Odontoderes Cacicus</i> Sahlb.		
l. <i>Dionych. granicollis</i> Germ. .		1
Genus 158. <i>Nettarhinus</i> nob.		
Typus: <i>Nettarh. anthribiformis</i> .		1
**) Genus 159. <i>Alcides</i> Dahlm., Sahlb.		
Typus: <i>Lixus trilobus</i> Fabr. . .		11
***) Genus 160. <i>Platyonyx</i> nob.		
Typus: <i>Baris ornatus</i> Dej. . . .		1
Genus 161. <i>Madarus</i> nob.		
Typus: <i>Calandra corvina</i> Fabr. . .		2
Genus 162. <i>Baridius</i> nob. (<i>Baris</i> Germ.)		
Typus: <i>Calandra nitens</i> Fabr. . .		19
Subgenus A. <i>Cyphirhinus</i> nob.		
Typus: <i>Barid. (Cyphirhin.) un-</i>		
<i>cinatus</i> Gyll.		1
Subgenus B. <i>Solenosternus</i> nob.		
Typus: <i>Baridius (Solenost.)</i>		
<i>puncticollis</i> nob.		2

(*Divisio* 3a. Cryptorhynchides: Rostrum inflexum, in canaliculam pectoralem, plus minusve distincte profundam, applicandum. Pedes antici bari saepissime distantes.

	Species nobis cognit.
*) Genus 163. Cratosomus nob. Typus: Rhynch. herculeanus Dalm.	5
Subgenus Gorgus nob. Typus: Lixus dubius Fabr.	8
Genus 164. Cryptorhynchus Illig., Germ. Typus: Cryptorh. Lapathi Auct.	54
Subgenus A. Mecocorynus nob. Typus: Cryptorhynch. varipes. Wiedem.	1
Subgenus B. Camptorhinus nob. Typus: Rhynch. pilipes Fabr.	4
Subgenus C. Coelosternus nob. Typus: Cryptorh. asperatus Dej. Cat.	8
Genus 165. Macromerus nob. Typus: Poecilma crinitarse Germ.	4
Genus 166. Arthrostenus nob. Typus: Rhynchaen. Fullo Boeb. in litter.	3
** Genus 167. Lyprus nob. Typus: Rhynch. cylindrus Gyllenh.	1
Genus 168. Bagous Germ. Typus: Rhynch. bi-nodulus Gyll.	8
Genus 169. Scleropterus nob. Typus: Cryptorh. serratus Eschsch., Germ.	1
Genus 170. Tapeinotus nob. Typus: Tapein. ephippiger nob.	1
Genus 171. Ulosomus nob. Typus: Ulosom. Erinaceus nob.	2
Genus 172. Tylodes nob.; Sahlb. Typus: Tylodes Armadillo Sahlb.	3

		Sp.nob. cognit.
Subgenus Acalles nob.		
Typus: Rhynch. Camelus Fabr. .		5
***) Genus 173. Centorhynchus Germ.		
Typus: Rhynch. Quercus Auct. .		80
Genus 174. Mononychus Schüpp., Germ.		
Typus: Rhynch. Pseudacori Auct. .		4
****) Genus 175. Zygops nob.		
Typus: Poecilma Wiedii Germ. .		10
Subgenus A. Coptorus nob.		
Typus: Poecilma papaveratum Germ.		5
Subgenus B. Piaxorus nob.		
Typus: Rhynch. pleuronectes Fabr.		5
Subgenus C. Coryssopus nob.		
Typus: Zygops (Coryssop.) hexastichus nob.		1
Genus 176. Mecopus nob.		
Typus: Rhynch. bi-spinosus Fabr. .		1
Genus 177. Lechriops nob.		
Typus: Rhynch. Sciurus? Fabr. . .		1
Genus 178. Pinarus nob.		
Typus: Cryptorh. squalidus Dej. .		1
*****) Genus 179. Centrinus nob.		
Typus: Baris bi-cuspis Germ. .		21
Subgenus Cyliandrocerus nob.		
Typus: Centrin. (Cylindr.) Comma nob.		1
Genus 180. Diorymerus nob.		
Typus: Orobis. altus Germ.		6
Genus 181. Eurhinus nob. — (Eurhin. Illig., Germ.)		
Typus: Eurhin. cupratus Illig. . .		3
*****) Genus 182. Orobitis Germ.)		
Typus: Attelab. globosus Fabr. l.		
Rhynchaen. id. Gyll.		1

TABULA SYNOPTICA. 23

	Sp.nob. cognit.
Genus 183. <i>Cleogonus</i> nob. Typus: Rhynch. rubetra Fabr. . . .	1
Genus 184. <i>Oeladius</i> nob. , Typus: Rhynch. Salicerniae Oliv. .	3
<i>Sectio 2da.</i> Antennae articulis 10 vel 9. (Funiculus semper 5-articulatus.)	
(<i>Divisio 4a.</i> <i>Cionides</i> : Antennae breviusculae, funiculus 5-articulatus; clava 3 l. 4-articulata.)	
Genus 185. <i>Cionus</i> Clairv. Germ. Typus: Cion. Scrophulariae Auct. .	15
Genus 186. <i>Gymnaetron</i> nob. Typus: Rhynch. Beccabungae Fabr.	20
Genus 187. <i>Mecinus</i> Germ. Typus: <i>Mecinus</i> Pyrastrae Germ. . .	4
Genus 188. <i>Nanodes</i> nob. Typus: Rhynch. Lythri Auct. . . .	6
<i>Sectio 3a.</i> Antennae articulis 10, 9, 8, 7. (Funiculus variat numero articulorum: 6, 7 et 4.)	
(<i>Divisio 5a.</i> <i>Calandraeides</i> : Antennae me- diocres; funiculus 6-articulatus; clava aut bi-articu- lata, aut indistincte articulata, subsolida. Rostrum aut deflexum aut porrectum.)	
<i>Subdivisio 1ma.</i> (Cryptopygi.) Pygidium elytra tegunt.	
Genus 189. <i>Rhina</i> Latr., Illig., Oliv. Typus: <i>Rhina</i> barbirostris Latr., Oliv.	1
Genus 190. <i>Sipalus</i> nob. Typus: <i>Calandra</i> granulata. Fabr. .	3
<i>Subdivisio 2da.</i> (Gymnopygi.) Pygidium nu- dum, seu ab elytris non tectum.	
Genus 191. <i>Rhynchophorus</i> Herbst. — (Calan- dra Auct.) Typus: <i>Calandra</i> Palmarum Auct. .	34
Subgenus <i>Calandra</i> Auct. Typus: <i>Calandra</i> granaria Auct.	6

(*Divisio 6^a. Cossonides: Antennae breves; funiculus 7 - articulatus; clava aut bi - articulata; aut subsolida. Rostrum subdeflexum. Pygidium ab elytris tectum.*)

Genus 192. *Amorphocerus* nob.

Typus: *Amorph. Talpa* nob.

1

Genus 193. *Cossonus* nob.

Typus: *Cosson. Linearis* Auct. . .

12

Subgenus *Rhyncholus* Creutz.

Typus: *Cossonus chloropus* Gyll.

9

(*Divisio 7^a. Dryophthorides: Antennae breves; funiculus 4 - articulatus. Rostrum subdeflexum. Pygidium ab elytris tectum.*)

Genus 194. *Dryophthorus* Schüpp.

Typus: *Lixus Lymexylon* Fabr. —

Cossonus id. Gyll.

1

DESCRIPTIONES GENERUM
AD
FAMILIAM
CURCULIONIDUM
PERTINENTIU M.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text suggests that organizations should implement robust systems to track and document every aspect of their operations, from procurement to sales.

2. The second part of the document addresses the challenges of data management in a rapidly changing environment. It highlights the need for flexible and scalable solutions that can adapt to evolving requirements. The author argues that investing in modern data infrastructure is crucial for ensuring that organizations can effectively analyze and utilize their data for strategic decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in enhancing operational efficiency. It explores various digital tools and platforms that can streamline processes, reduce errors, and improve overall productivity. The text encourages organizations to embrace innovation and continuously evaluate their technology stack to stay competitive in the market.

4. The fourth part of the document discusses the importance of collaboration and communication within an organization. It stresses that effective teamwork and clear communication channels are vital for achieving common goals and overcoming challenges. The author suggests that organizations should foster a culture of openness and transparency, where team members feel comfortable sharing ideas and feedback.

5. The fifth part of the document touches upon the importance of staying up-to-date with industry trends and regulations. It advises organizations to regularly monitor market developments and regulatory changes to ensure compliance and maintain a competitive edge. The text also mentions the value of networking and participating in industry conferences to gain insights from peers and experts.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the importance of a proactive and strategic approach to business management. It encourages organizations to continuously improve and adapt to the ever-changing business landscape. The author ends with a call to action, urging readers to take the steps necessary to implement the strategies outlined in the document.

CURCULIONIDES. *)

TARSI QUADRI-ARTICULATI. — CAPUT PLUS MINUSVE
ROSTRATUM; OS APICALE; MANDIBULAE SAEPISSIME PAR-
VAE, VALIDAE; PALPI CETERAEQUE PARTES MINUTAE,
OCCULTATAE. — ANTENNAE ROSTRO INSERTAE, SAEPISS-
SIME APICE CLAVATAE. — CORPUS IN PLERISQUE
DURUM.

Ordo 1^{us}. ORTHOCERI.

Antennae non fractae, h. e. ad articulum secundum haud
geniculatae; scapus (articulus basilaris) non valde elongatus.

Sectio 1^{ma}. Antennae articulis 11, 12.

(*Divisio 1^{ma}. Bruchides*: Rostrum latum, de-
flexum. Antennae sensim crassiores, serratae aut pectinatae, in
paucis clavatae, 11-articulatae. Tarsi distincte 4-articulati,
articulo penultimo bilobo.)

Genus 1. *Bruchus* Linn., Fabr., Gyllenh., Latr., Oliv.
et multi alii. — *Mylabris* Geoffr., Gronov.,
Fourcr. — *Laria* Scop.

Character generis: — Antennae validae, extror-
sum sensim crassiores, saepius serratae, in non nullis pecti-
natae, longitudine dimidii corporis l. ultra, in sinu oculorum
insertae.

*) Romani per vocem *Curculionis* l. *Gureulionis* a Graeco
κλῶν, (larva *Calandrae granariae* Auctor.) vermiculum quen-
dam, in granis consumendis vitam degentem intellexerunt; quae vero
vox, quamvis ab Immort. *Linne* generi sit addita, hic mihi, ad to-
tam hanc familiam denominandam, optima visa.

Caput exsertum, deflexum, postice in collum angustatum.

Oculi lunati l. emarginati, prominuli.

Elytra oblongo - quadrata, abdomine breviora, supra parum convexa.

Femora postica plerumque incrassata, saepe dentata.

Descriptio: — *Corpus* breviter l. oblongo - ovatum, crassum, antice declive, alatum. — *Antennae* arcuatae, validae, pari vel dimidia corporis longitudine, extrorsum sensim crassiores, compressae; saepius serratae, in nonnullis pectinatae, 11-articulatae, in sinu oculorum insertae; articulo 1^{mo} crassiore, 2^{do}, 3^o interdum etiam 4^o minoribus, reliquis iterum majoribus. — *Caput* exsertum, productum, anterieus angustatum, vix vero rostratum, thorace angustius, deflexum, postice angustatum, collum formans. — *Oculi* lunati l. emarginati, prominuli. — *Thorax* aut brevior semicirculari - trapeziformis, aut subconicus, antice angustatus, postice latior, bi - sinuatus l. lobatus; supra modice convexus. — *Scutellum* oblongo - quadratum. — *Elytra* oblongo - quadrata, thorace latiora et mox juxta basin multo magis dilatata, apice obtuse rotundata, abdomine breviora, supra parum convexa. — *Pygidium* nudum, rotundatum l. subtruncatum. — *Pedes* validi, antici approximati; femora postica saepius dentata et anterioribus multo robustiora; tibiae teretes, posticae saepissime spinis apicalibus, in nonnullis longis, in aliis obsoletis armatae; tarsi tibiis paullo breviores, anteriores articulis duobus basalibus subtrigonis, penultimo plus minusve latiore, cordato, bilobo, subtus spongioso, ultimo clavato, biunguiculato; tarsis posticis magis elongatis, articulo 1^{mo} longo, aut subcylindrico, aut clavato, subarcuato.

Stirps 1^{ma}. Thorax antice coarctatus, capite subangustior, postice sinuatus, lobo scutellari. Elytra subplana. Pygidium magnum, subcordatum, descendens.

Manipulus 1^s. — Femora dentata.

Typus: Bruch. difformis Oliv. — 4-maculatus et podagricus Fabr. — Theobromatis Linn. et plures aliae.

Manip. 2s. — Femora mutica.

Typus: — Bruch. marginellus, villosus et minutus Fabr. — biguttatus Oliv. — fulvipennis Dej. et Germ. — et multo plures.

Stirps 2a. — Thorax transversus, subtrapeziformis, angulis anticis rotundatis, postice truncatus, lobo scutellari. Pygidium magnum, rotundatum, descendens.

Manip. 1s. Femora dentata.

Typus: — Bruch. Pisi et granarius Auctorum, et multae aliae.

Manip. 2s. — Femora mutica.

Huc adnumerantur: Br. 4-guttatus nob. — Mimosae, Cisti? et Seminarius? Fabr. — pusillus et sericatus Germ.

Stirps 3a. — Thorax transversus, angulis anticis deflexis, postice sinuatus, lobo scutellari lato, rotundato. Scutellum triangulatum. Pygidium rotundatum, subconvexum, minus descendens. Femora mutica.

Huc pertinent: — Br. Cardui Steven. — latithorax — latus et ater Bohem. in Litter.

Stirps 4a. — Corpus magis elongatum atque convexum. Thorax antice angustior, postice sinuatus, angulis rotundatis. Elytra latitudine duplo longiora, pygidii basin obtegentia. Pygidium angustius, parum descendens, basi oblecta. (Genus sub nomine Caryedon. Stev. in litteris.)

Manip. 1s. Femora dentata.

Huc pertinent: Br. Gonagtha Fabr. — serripes Hoffmans: — serratus Oliv.

Manip. 2s. Femora mutica.

Huc pertinent: Br. Robiniae Fabr. — Cistellinus Hoffmans:

Βροῦχος et *Βροῦχος* a *βρύχω* edo, voro.

Observ. — Ob vivendi modum corporisque formam hocce genus ad hanc familiam pertinere mihi videtur.

Genus 2. *Rhaebus*. Fisch.

Character generis: — Antennae longiusculae, validiusculae, subfiliformes, extrorsum paullo crassiores, infra sinum oculorum insertae.

Caput exsertum, deflexum.

Oculi emarginati.

Thorax subconicus, postice rotundatus, supra parum convexus.

Elytra flexibilia, elongata, sublinearia, apice singulatim rotundata.

Pedes longiusculi; femora postica compressa.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, molliusculum, colore metallicum, alatum, minoris magnitudinis. — *Caput* exsertum, thoracis latitudine, convexum, deflexum, antèrius productum, angustatum, vix vero rostratum. *) *Antennae* rectae, subflexae, longitudine dimidii corporis, validiusculae, subfiliformes, basi subtenuēs, extrorsum paullo latiores, subcompressae. *Oculi* laterales, emarginati, modice prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine vix longior, basi lateribusque rotundatus, antice truncatus, antorsum paullo angustior, subconicus, supra parum convexus. — *Scutellum* minutum, trigonum. — *Elytra* flexibilia, thorace paullo latiora, sed illo quadruplo longiora, sublinearia, versus apicem sensim nonnihil angustata, supra modice convexa, apice singulatim rotundata, pygidium haud tegentia. — *Pedes* longiusculi, praesertim postici; femoribus muticis, in medio incrassatis, posticis compressis, in altero sexu clavatis; tibiis subcompressis, basi subtenuibus, incurvis, deinde rectis, versus apicem sensim latioribus, posticis ad apicem spina minuta, deflexa, armatis; tarsi tibiis parum breviores, articulo basali subcylindrico, 2º subobconico, 3º brevi; paullo latiore, bifido, subtus spongioso, ultimo parum clavato, biunguiculato.

*) Labrum subquadratum. Mandibulae fortes, elongatae, apice bidentatae. Maxillae membranaceae, compressae, ciliatae. — Palpi breves, filiformes, ultimo articulo fusiformi. — Labium subconicum, parum emarginatum. *Fischer de Waldheim.*

Typus: — *Rhaebus Gebleri* Fisch. — nec plures species vidi.

A *ῥαιβὸς* cruribus incurvis.

Observatio: Quamvis in granis seminibusque vitam degit et metamorphosin subit hoc Insectum; tamen vix ad familiam Bruchidum pertinere videtur; forma enim capitis, rostri elytrorumque ut et color metallicus corpusque molliusculum nimis discrepant. Anne potius ad familiam Chrysomelinarum referendum?

Genus 3. *Urodon* nob. — *Bruchus* Fabr., Oliv. — *Anthribus* Fabr., Latr., Germ., Oken. — *Bruchela* Megerle, Dejean. — *Clerus* Geoffr.

Character generis: — Antennae subcrassae, breviusculae, infra oculos insertae, extrorsum sensim crassiores; articulis 3 ultimis magnis, subperfoliatis.

Rostrum breve, latum, apice subtruncatum.

Oculi laterales, integri, rotundati.

Elytra oblongo-subquadrata, abdomine breviora.

Mas: pygidio emarginato, lobis lateralibus productis.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, crassum, minoris magnitudinis, alatum. — *Antennae* rectae, subcrassae, thorace breviores, infra oculos insertae; articulis duobus basalibus crassiusculis, 3-5 subobconicis, 6-8 brevioribus transversis, 9 et 10 magnis, latis, compressis, subperfoliatis, truncatis, ultimo apice subrotundato. — *Rastrum* breve, latum, deflexum, apice subtruncatum. — *Oculi* laterales, magni, integri, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* elongato-trapeziformis, antice rotundatus, angulis compressis, lateribus subrotundatus, postice latior, in medio lobatus. — *Scutellum* minutissimum. — *Elytra* thorace latiora et duplo longiora, ad latera recta apice singulatim rotundata, supra paullo convexa. — *Pygidium* nudum, trigonum, planum; in mare subincurvum, late quadrangulater emarginatum, lobis lateralibus productis; pygidium feminae rotundatum, integrum. — *Pedes* breves, validi, mutici; femoribus crassis; tarsis articulis 4 distinctis, penultimo latiusculo, bilobo; ultimo clavato, bi-unguiculato.

Typus: — *Anthr. sericens* Fabr. — Duae species mihi cognitae: *Anthr. sericens* Fabr., *rufipes* Latr., *Bruch. rufipes* Fabr. Oliv. — et *Bruch. suturalis* Fabr., Oliv.

Ab οὐραῖ anus, ὀδὼς dens.

Observ. — Genus hocce Anthribidibus valde propinquum, sed articulus tarsorum tertius praecedentibus aequalis, unde Bruchidibus associandum.

(*Divisio* 2a. *Anthribides*: Rostrum latum, deflexum. Antennae clavatae, 11-articulatae. Elytra anum haud occultantia. Tarsi indistincte 4-articulati, articulo secundo plerumque tertium subincludente.)

**Cohors* 1ma. — Clava antennarum angusta, subincrassata; articulo ultimo acuto.

Genus 4. *Anthribus* Fabr., Gyllenh., Germ., Latr. — *Anthrodus* Megerle. — *Amblycerus* Thunb. — *Macrocephalus* Oliv. — *Platyrhinus* Billb. — *Circulio* Linn., Degeer et plures alii.

Character generis: — Antennae infra sinum oculorum insertae, pro sexu forma diversae: maris corpore longiores, articulo ultimo elongato acuto; feminae breviores, extrorsum magis incrassatae; articulo ultimo brevissimo, acuto.

Rostrum breve, latum, deflexum, apice profunde emarginatum.

Oculi laterales, prominuli, anterieus emarginati.

Thorax antice angustior, postice subtruncatus, basi lateribusque posticis elevato-marginatus.

Elytra oblonga, subcylindrica, pygidium haud occultantia.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, convexum, alatum. — *Antennae* rectae, longitudine thoracis l. ultra, ante sinum oculorum insertae; articulo 1mo et 2do brevibus, 3-8 longioribus, sub-obconicis, subaequalibus; ultimis tribus latiusculis, compressis, clavam elongato-ovatum, acuminatam formantibus; forma jam in Diagnosi indicata. — *Rostrum*

breve, latum, deflexum, apice profunde emarginatum. — *Oculi* laterales, prominuli, sub-ovati, anterieus emarginati. — *Thorax* amplius, antice multo angustior, angulis compressis, supra convexus, basi subtruncatus, elevato-marginatus, lateribus nonnihil rotundatus, posterius marginatus. — *Scutellum* minutum; subrotundatum. — *Elytra* elongata, subcylindrica, convexa, latitudine thoracis, quo vix triplo longiora, antice truncata, apice rotundata, ad latera subrecta, anum fere tegentia. — *Pygidium* minutum, semicrotundatum. — *Pedes* validi, omnino mutici; femoribus clavatis; tarsi elongati, tibiis paullo breviores, sub-angustati, articulo 1mo longiusculo, subconico, penultimo spongioso, distincto, bilobo, subdilato, tertium vix includente, ultimo clavato, biungulato.

Typus: — Anthribus Albinus Auctor. — congenericus: Anthr. alternans Wiedem.

Ab ἄνθος flos, τριβω tero, contero, contractum.

Subgenus A. Phloeotragus nob. — Anthribus Fabr.

Adumbratio: — *Antennae* in masculis saepe corpus totum longitudine superantes, in aliis capite cum thorace paullo longiores, infra oculos insertae; articulis 1-3 aut elongatis, subfiliformibus, aut obconicis, crassiusculis, subaequalibus, tribus ultimis arcte connexis, vix crassioribus, clavam elongatam, acuminatam formantibus. — *Rostrum* subporrectum, apice emarginatum, aut capite duplo longius, apice ampliatum, aut breve, latum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* oblongus, antice posticeque, truncatus, supra depressus, ante basin striga elevata, transversa, subrecta, in medio interrupta, ad latera anteriora continuata. — *Scutellum* minutissimum, rotundatum. — *Elytra* elongata, sublinearia, supra convexa, dorsi disco subdepressa. — *Corpus* elongatum, sublineare, robustum.

Typus: — Anthr. Heros Fabr. — congenerici: Anthr. (Phloeotr.) Westermanni et lanugicornis nob.

A φλοιός cortex, τράγος hircus, caper.

Observ. — Rostrum subporrectum, striga elevata transversa ante basin thoracis, hoc subgenus facile ab Anthri-

bidibus genuinis distinguit. Clava antennarum angusta, impedit a conjunctione subgeneris *Ptychoderis*, cui praeterea est simillimum.

**Cohors* 2a. Clava antennarum abrupto - incrassata, subcompressa, articulis subapproximatis.

Subgenus B. *Ptychoderes* nob. — *Macrocephalus* Oliv.

Adumbratio: — *Antennae* longae, in masculis longissimae, in medio lateris rostri insertae; articulis 1-8 elongatis, subobconicis; clava elongata, articulis subremotis, 9 et 10 cordato-ovatis, ultimo subacuminato, subcompresso. — *Rostrum* subdeflexum, capitis longitudine, crassiusculum, versus apicem dilatatum, supra carinatum, apice profunde rotundato-emarginatum. — *Mandibulae* validae, arcuatae, corneae, intus obtuse bidentatae. — *Palpi* filiformes, subaequales, articularis setosis. — *Oculi* laterales rotundati, prominuli. — *Thorax* oblongus, lateribus paullo ampliatus, rotundatus, supra depressus, ante basin striga elevata, transversa, subrecta, in medio interrupta, cum margine laterali anterieus reflexo-connexa. — *Scutellum* mediocre, transversum. — *Elytra* elongata, sublinearia, antice elevato-marginata, supra convexa, dorsi disco subdepressa. — *Corpus* elongatum, sublineare.

Typus: — *Anthr. elongatus* Germ. — ejusdem generis est: *Anthr. (Ptychod.) viridans*, nob. e Brasil.

Α πύξ πlica, δέση collum.

Observ. Vide comparationem hujus cum subgenere praecedenti.

Subgenus C. *Platyrhinus* Clairv., Billb. — *Macrocephalus* Oliv. — *Anthr. Fabr.*, Gyllenh., Germ., Latr. pluresque alii. — *Curculio* Linn. — Scop. De Geer.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, medio rostri subtus insertae, articulis 1, 2 brevibus crassis, 3, 4 longioribus, obconicis, 5-8 subrotundatis, ultimis tribus magnis, compressis, subremotis, clavam distinctam formantibus. —

Rostrum perpendiculare, latum, oblongo-quadratum, subtruncatum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* subquadratus, antice paullo angustior, lateribus juxta medium in lobum sub-bidentatum dilatatus, intra basin linea elevato-carinata, subtransversa, in medio interrupta notatus. — *Scutellum* minutum, subrotundatum. — *Elytra* oblonga, linearis, supra dorso depressa, anum quoad partem tegentia.

Typus: — Anthrib. latirostris Auct. — nec plures species vidi.

Α πλάτος, ὅλν̄ nasus.

Subgenus D. Tropideres. Anthribus Fabr., Gyll., Germ., Thunb. — Amblycerus Thunb. — Macrocephal: Oliv. — Platyrhinus Billb.

Adumbratio: — *Antennae* tenues, longiusculae, in medio laterum rostri insertae; articulis 3-8 elongatis, obconicis; clava elongata, distincta, subcompressa. — *Rostrum* perpendiculare, latum, planum; apice plus minusve dilatatum, subtruncatum. — *Oculi* magni, integri, subdepressi, in fronte saepius subapproximati. — *Thorax* antice multo angustior, lateribus oblique subrectis, postice subbisinuatus, paullo ante basin striga elevata, transversa, integra notatus. — *Scutellum* punctiforme. — *Elytra* thoracis basi parum latiora, quo vix etiam triplo longiora, apice rotundata, ad latera recta, supra mediocriter convexa. — *Corpus* oblongum.

Stirps 1a. Rostrum elongatum, apice dilatatum. Oculi sub-approximati.

Typus: — Anthr. albirostris Fabr. — congenetici: Anthrib. dorsalis Gyllenb. — undulatus Panz. — aculeatus et longicornis Fabr.? —

Stirps 2a. Rostrum breve, apice parum dilatatum. Oculi interdum minus approximati.

Typus: — Anthr. niveirostris Fabr. — congenetici. A. sepicola Fabr. — cinctus Gyll.

Α τρέσις carina, δέση collum.

Observatio: — Antennarum articulorum, rostri et oculorum formae differentia hocce subgenus praecipue a Pla-

tyrhis distinguatur, quodque etiam aliis subgeneribus minus est associatum. Nihilo tamen minus hoc subgenus, praesertim stirps 2^{da}, mihi dubium occurrit.

Subgenus E. Euparius nob.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, subtenues, infra sinum oculorum insertae; articulo 1^o et 2^o paullo crassioribus, sequentibus sex paullo longioribus, subobconicis, exterioribus sensim brevioribus, tribus ultimis magnis, latis compressis, ultimo apice rotundato. — *Rostrum* breve, latum, deflexum, apice leviter emarginatum. — *Mandibulae* breves, validiusculae, arcuatae, corneae, intus concavae, apice bifidae dentibus validis, in medio dente obsoleto, obtuso, saepius armatis. — *Labrum* corneum, fornicatum, rotundatum. — *Palpi* filiformes, subaequales; articulis ultimis setosis. — *Oculi* laterales, subprominali, haud emarginati. — *Thorax* antice angustior, ante basin lateribusque postice elevato-marginatus. — *Sternum* interdum acuminatum, porrectum. — *Elytra* oblonga, sublinearia, convexa, apice obtuse rotundata. — *Corpus* oblongo ovatum.

Typus: — Anthr. (Eupar.) Tigris nob. — congenerici: Anthr. albifrons Melsheim. et spec. 5 indesscriptae.

Ab *eu* bene, *παρὰ* bucca.

Observ. — Subgenus quoad habitum Phloeobis proximum, sed oculi haud emarginati, mandibularumque structurae magna differentia est.

Subgenus F. Phlocobius nob. — Anthribus Fabr., Oliv. —

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, subtenues, infra sinum oculorum insertae; articulo basali brevi, crasso, 2-8 paullo longioribus, subcylindricis, tribus ultimis magnis, latis, compressis, paullo remotis, clavam elongatam apice obtusam formantibus. — *Rostrum* breve, latum, deflexum, apice profunde emarginatum. — *Mandibulae* validae, arcuatae, acutae, corneae, intus basi obsolete unidentatae. — *Oculi* laterales, prominuli, profunde emarginati. — *Thorax* amplius, antice angustior, postice truncatus, ante basin lateribusque postice elevato-marginatus. — *Scutellum* minutum,

punctiforme. — *Elytra* elongata, subcylindrica, convexa, apice rotundata, anum fere tegentia. — *Pygidium* minutum, semi-rotundatum. — *Tarsi* subangustati, articulo tertio parvo, bilobo, a praecedente fere occultato. — *Corpus* oblongo-ovatum.

Typus: — Anthr. griseus Fabr. — congenerici: Anthr. compressicornis Fabr.

Α φλοιός cortex, βίω vivo.

Observ. — Generi Anthribi genuini valde affine; differt imprimis forma antennarum, tarsorumque; praeterea major est subgeneris Euparii similitudo; mandibulae tamen omnino dissimillimae oculique profunde emarginati.

Subgenus G. Phaenithon nob.

Adumbratio: — *Antennae* breves, subtennes, infra oculos insertae; articulis subobconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava lata, oblongo-ovata, compressa, apice oblique truncata, subacuminata, articulis sub-connexis. — *Rostrum* breve, latiusculum, deflexum, supra planum, apice rotundato-emarginatum. — *Oculi* magni, laterales, subrotundati, prominuli, leviter emarginati. — *Thorax* subconicus, postice sub-bisinuatus, paullo ante basin striga elevata, transversa, integra, ad medium marginem lateralem continuata. — *Scutellum* distinctum, triangulare. — *Elytra* oblonga, sublinearia, supra convexa, dorso saepe subdepressa, apice sinulatim rotundata.

Stirps 1^{ma}. Corpus elongatum. Pygidium magnum, oblongum, subporrectum.

Typus: — Anthr. costatus Dej. hujus subgeneris sex species indscriptae mihi notae.

Stirps 2^a. Corpus breviter ovatum. Pygidium mediocre, semirotundatum, subdeflexum.

Α φαίω ostendo, ἰδών podex.

Observ. — *Antennae* breves, pygidium magnum et scutellum triangulare, perspicuam exhibent dissimilitudinem subgeneris Phloeobii, cui praeterea est simillimum.

Subgenus H. Gymnognathus nob.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, subtennes, in medio lateris rostri insertae; articulo 1mo et 2do paullo crassioribus, 3 - 8 magis tenuibus, exterioribus sensim brevioribus, omnibus subobconicis; clava magna, oblongo-ovata, compressa, apice obtusa, subacuminata, articulis subconnexis. — *Rostrum* elongatum, deflexum, subrectum juxta basin paullo angustatum, apice late emarginatum, supra subplanum. — *Oculi* magni, laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* subconicus, basi bisinuatus, et ante basin et lateribus posticis elevato-marginatus. — *Scutellum* distinctum, rotundatum. — *Elytra* elongata, sublinearia, basi rotundato-dilatata, convexa, dorso subdepressa. — *Pygidium* subquadratum, apice bidentatum. — *Corpus* elongatum.

Typus: — Anthr. Ancora Germ. — congenericus: Anthr. (Gymnogn.) signatus nob.

A γυμνός nudus, γνάθος maxilla.

Observ. — Subgeneri Phaenithonis proximum, sed forma antennarum, rostri aliarumque partium valde diversa.

Subgenus I. Brachytarsus nob. — Paropes Meg. — Anthribus Auct. ceteror.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, validiusculae, infra oculos insertae; articulis duobus basalibus majusculis, 3 - 8 brevissime obconicis, ultimis tribus magnis, clavam compressam, obtusam formantibus. — *Rostrum* breve, latum deflexum, apice subtruncatum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli, magni. — *Thorax* brevis, transversus; postice lator, bisinuatus, elevato-marginatus, angulis posticis acuminatus, supra valde convexus, lateribus rotundatus, angulis anticis compressus. — *Elytra* oblongo-quadrata, apice obtuse rotundata, supra valde convexa. — *Pedes* breves; tarsi breviusculi, validi, articulo penultimo bilobo, secundo tertium subincludente. — *Corpus* breviter-ovatum, crassum.

Typus: — Anthr. varius Auct. — congenerici: Anthr. scabrosus Fabr. — tessellatus Bohem. vel Anthr. nebulosus Dej.

A βραχύς brevis, ταρσός tarsus.

Observ. — Anguli postici thoracis subacuminati et tarsi breviusculi sunt praeter alios plures characteres, notae hujus subgeneris cognitae. Cum ad hoc subgenus pertinentium specierum vita larvalis a caeterarum, huic Familiae adscriptarum omnino abhorreat, credo equidem ex his proprium et determinatum constituendum esse genus. Dom. L. R. N. Dalman Scient. Act. Holm. anno 1824 pag. 388 singularem et insignem illam nobis exposuit observationem, has esse parasitas, et larvas quidem Anthribi varii in feminis Coccorum, quae in Betulis et Populis morantur, existere (Coccus cypraeola Dalm.) ex quibus excluduntur. Ex his quoque Cocci feminis Anthribum scabrosum, qui huic subgeneri etiam competit, Dom. Profess. S. W. Dalman ipse exclusit.

**Cohors* 3a. Clava antennarum abrupto - incrassata, articulis valde remotis.

Subgenus K. *Stenocerus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, teutissimae, extrorsum pilosae, in medio rostri insertae; articulo basali brevissimo, tertio elongato, reliquis decrecentibus; clava valde elongata, articulis remotis, duobus basalibus cordato-ovatis, ultimo acuminato, compresso. — *Rostrum* elongatum, latiusculum, basi coarctatum, apice valde dilatatum, complanatum. — *Oculi* laterales, suboblongi, paullo prominuli. — *Thorax* transversus, antice multo angustior, basi bisinuatus, ante basin striga transversa, elevata, flexuosa cum margine laterali reflexo, sinuato-connexa, notatus. — *Elytra* thoracis basi parum latiora, sed illo triplo longiora, apice subtruncata, supra in dorsum anticum depressa. — *Pygidium* nudum, semi-rotundatum. — *Corpus* oblongo-ovatum, supra subdepressum.

Typus: — Anthr. fulvitarsis Germ. — congenericus: — Anthr. (*Stenocerus*) frontalis nob.

Α στενός angustus, κέρας cornu.

Observ. — Corpus supra subdepressum, rostrum elongatum, basi coarctatum hoc maxime distinguit a ceteris hujus Cohortis subgeneribus.

Subgenus L. *Corrhecerus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, maxime tenues, infra sinum oculorum sub latere rostri insertae, extorsum pilis longis, raris adpersae; articulis 1mo et 2do brevibus, oblongis, crassis, 3 - 8 elongatis, subfiliformibus, exterioribus sensim brevioribus; clava valde elongata, angusta, articulis oblongis, remotis. — *Rostrum* brevissimum, latum, deflexum, apice late emarginatum. — *Oculi* majusculi, subapproximati, parum emarginati, depressi. — *Thorax* transversus, antice angustior, angulis compressus, postice bisinuatus, angulis subacutus, supra convexus, et ante basin et lateribus elevato-marginatus. — *Elytra* elongata, sublinearia, supra mediocriter convexa. — *Pygidium* minutum, triangulare. — *Corpus* oblongo-ovatum, convexus.

Typus: — *Anthr. mixtus* Germ. — plures species non vidi.

A κόρυς crinis, κέρα cornu.

Observ. — Forma clavae antennarum hoc subgenus praecipue a *Phloeobio* distinguitur; illa antennarum insertio et aliarum partium diversa structura, aegre conjunctionem cum alio quodam subgenere hujus cohortis pati mihi videtur.

Subgenus M. *Araeccrus* nob. — *Anthribus* et *Bruchus* Fabr.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, tenues, sub oculos insertae; articulis duobus basalibus crassis, reliquis subobconicis, tenuibus; clava elongata, angusta, articulis remotis. — *Rostrum* breve, latum, deflexum, apice subtruncatum. — *Oculi* majusculi, laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* brevis, transversus, postice latior, bisinuatus, elevato-marginatus, angulis posticis subacuminatis. — *Elytra* thorace paullo latiora et illo triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra mediocriter convexa. — *Pygidium* nudum, semi-rotundatum, planum. — *Pedes* validiusculi; tarsis elongatis, articulo 1mo longo, basi tenui, secundo dimidio breviori, subtus obsolete spongioso, tertium minutum, bilobum

subincludente. — *Corpus* breviter sub-ovatum, crassum, convexum.

Typus: — Anthr. Coffeae Fabr. Oliv. — congenericus: Anthr. (Araec.) guttatus nob.

Ab ἀραιὸς tenuis, κέρας cornu.

Observ. — Hoc subgenus in multis cum genere Brachytarsō convenit, forma vero antennarum tarsorumque valde differt.

Genus 5. Eucorynus nob. — Anthribus Fabr.

Character generis: — Antennae longiusculae, in medio rostri insertae; clava elongata, compressa, apice rotundata, 4-articulata.

Caput convexum.

Rostrum breve, subtransversum.

Oculi laterales, rotundati, prominuli.

Thorax subconicus, ante basin striga elevata, transversa, cum margine laterali connexa, insignitus.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-elongatum, alatum. — *Antennae* rectae, thorace longiores, in medio rostri insertae, validae, parce pilosae; articulo 1^{mo} et 2^{do} brevibus, 3 et 4^o longioribus, obconicis, 5 - 7 iterum brevibus, quatuor ultimis magnis, latis, compressis, clavam elongatam, apice rotundatam formantibus. — *Caput* convexum. — *Rostrum* breve, subtransversum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* subconicus, antice et postice truncatus, lateribus juxta medium angulisque posticis rotundatus, paullo ante basin striga elevata transversa, cum margine laterali reflexo versus medium continuata, instructus. — *Scutellum* minutum, punctiforme. — *Elytra* elongata, convexa, thorace vix latiora, sed illo triplo longiora, antice truncata, apice rotundata, ad latera subrecta. — *Pygidium* minutum, nudum, semirotundatum. — *Pedes* validi, omnino mutici; femoribus clavatis; tarsis breviusculis, articulo penultimo brevissimo, bilobo.

Typus: — Anthrib. crassicornis Fabr. — nec plures vidi.

Ab εὖ bene, κορυφή clava.

Observ. — Clava antennarum 4-articulata, praeter alios characteres, hocce genus distinguitur. — Statura et facies fere ut in subgenere *Scythropi* (n. 70.).

(*Divisio* 3a. *Attelabides*: Rostrum subcylindricum, deflexum, saepe filiforme vel saepius apice dilatatum. Caput pone oculos elongatum. Antennae clavatae, 11, 12, articulatae. Elytra elongato-subquadrata. Pygidium nudum.)

Genus 6. *Apoderus* Oliv., Billb., Germ. in litt., Dejean. — *Attelabus* Linn., Fabr., Germ., Gyll. et multi alii. — *Curculio* De Geer.

Character generis: — Antennae 12-articulatae, quorum quatuor ultimi connexi, clavam formantes.

Rostrum capite brevius, crassum, apice vix dilatatum.

Caput oblongum, posterius valde angustatum, collo tenui, thoraci adnexum.

Descriptio: — *Corpus* ovato-subquadratum, alatum. — *Antennae* rectae, validae, in medio rostri superne insertae, capite parum longiores; articulo 1^o crassiori, obconico, 2^o brevi nodoso, 3-8 obconicis, sensim paullo crassioribus, 9-12 connexis, clavam cylindrico-ovalem formantibus, articulo ultimo minuto, retracto, acuminato. — *Rostrum* capite brevius, crassum, vix apice dilatatum. — *Caput* oblongum, posterius valde angustatum, sub-obconicum, collo tenui thoraci adnexum. — *Oculi* laterales, globosi, prominuli. — *Thorax* subconicus l. triangularis, antice valde angustatus, emarginatus et intra apicem constrictus, basi truncatus, supra parum convexus. — *Scutellum* semi-orbiculatum. — *Elytra* thorace fere duplo latiora et illo triplo longiora, oblongo-quadrata, antice truncata, apice singulatim rotundato dehiscentia, ad latera subrecta, supra convexa, ante medium dorsi impressa; humeris angulato-elevatis. — *Pygidium* nudum. — *Pedes* longi, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis apice unco uno valido intus armatis; tarsis longiusculis, articulis 1 et 2 trigonis, illo

basi subtenui, penultimo latiore bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Attelab. Coryli* Fabr.

Species mihi cognitae et huc etiam pertinentes: *Attelab. intermedius* Illig. — *rufus* — *gemmaus* — *fuscicornis* — *spinosus* — *nigripennis* — *cygneus* et *Hystrix* Fabr. — *melanopterus* Wiedem. — *collaris* Gyllenh. n. sp.

Apoderes: quia ἄπο in compositione nunc perfectionem quandam, nunc continuationem, nunc confirmationem significat, et δέση collum.

Genus 7. *Attelabus* Fabr., Gyllenh. et multi alii. —

Rhynchites Illig. — *Curculio* De Geer. —

Chyphus Thunb. — *Rhinomacer* Laichart.

Character generis: — *Antennae* 11 - articolatae, quorum tres ultimi connexi, perfoliati, clavamque formantes.

Rostrum capite brevius, apice valde incrassatum.

Caput oblongum, posterius non angustatum, absque collo distincto; thoraci insertum.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, subquadratum, alatum. — *Antennae* rectae, validae, in rostri medio superne insertae, capite paullo longiores; articulo 1o longiore, crassiore, sequentibus septem brevibus, subobconicis, ultimis tribus connexis, perfoliatis, clavam cylindrico-ovalem, acutam formantibus. — *Rostrum* capite paullo brevius, deflexum; crassum, apice dilatatum, arcuatum. — *Caput* oblongum, subcylindricum, posterius non angustatum, absque distincto collo thoraci insertum. — *Oculi* sublaterales, globosi, prominuli. — *Thorax* subquadratus, antice tamen paullo angustior, basi et apice truncatus, supra mediocriter convexus. — *Scutellum* magnum, rotundato-subquadratum. — *Elytra* thoracis basi vix dimidio latiora, quo triplo longiora, subquadrata, antice truncata, apice singulatum rotundata, dehiscencia, ad latera subrecta, supra convexa; humeris angulato-elevatis. — *Pygidium* nudum. — *Pedes* longi; femoribus clavatis, tibiis intus denticulatis, apice unco duplici

intus armatis; tarsorum articulo penultimo lato, spongioso, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Attel. curculionoïdes* Fabr. — species, quas vidi, sunt: *Attel. analis* Illig. — *bipustulatus* Fabr. — *nitidus* Fabr. — *Rhois* nob. — *longimanus* Fabr. — *brachiatus* nob. — *dentipes* et *variolosus* Fabr. — *bispinosus* Gyllenh. — *ignitus* nob. — *melancoryphus* Germ.

ἀτελέλαβος, subsiliendo prehensens, quod ab *ἀγρῶν* subsilire et *λαβή* prehensio athletarum. — *Cicadula*, Jonst. 87.

Genus 8. *Rhynchites* Herbst., Gyllenh., Latr., Oliv., Germ. Dejean, Thunb., Billb. — *Attelabus* Fabr. — *Mechoris* Billb. — *Rhinomacer* Laich., Clairv. — *Curculio* Linn., De Geer, et alii.

Character generis: — Antennae 11-articulatae, quorum tres ultimi remoti, subperfoliati, clavam formantes.

Rostrum elongatum, filiforme l. deplanatum, ad apicem dilatatum.

Caput elongatum, postice vero non angustatum; collo crasso thoraci insertum.

Descriptio: — *Corpus* elongato-subquadratum, alatum. — *Antennae* rectae, in medio rostri laterum superne insertae, 11-articulatae: articulis basalibus longiusculis, subcylindricis, mediis aut sub-obconicis, aut subrotundatis, tribus apicalibus remotis, crassis, clavam ovalem, subperfoliatam formantibus, 9o et 10o nempe subturbinatis, ultimo nempe ovato. — *Rostrum* deflexum, varium, plus minusve elongatum, aut filiforme, arcuatum, aut rectum, ad apicem dilatatum; canalicula antennalis, seu scrobs in medio rostri incipiens, recta, ad oculos protracta. — *Caput* juxta oculos elongatum, non vero angustatum, collo crasso thoraci connexum. — *Oculi* laterales, interdum subapproximati, rotundi; modice prominuli. — *Thorax* conico-cylindricus, basim apiceque truncatus, antice angustior, in eo, quem puto unispinosum, sexu saepius utrinque unispinosus. — *Scutellum* rotundatum, subtransversum. — *Elytra* thoracis basi fere dimidia

lteriora, quo fere triplo longiora, apice singulatim rotundata, supra convexa, dorso antico saepius depressa; humeris obtuse angulatis. — *Pygidium* nudum, semi-rotundatum. — *Pedes* robusti; antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice truncatis, muticis; tarsorum articulo penultimo spongioso, lato, bilobo, unguibus validis.

Species mihi cognitae et huc pertinentes: *Rhynchit. azureus* Oliv. l. *javanicus* Thunb. — *Attel. hungaricus* — *coeruleocephalus* — *aequatus* — *cupreus* — *bicolor* — *Bacchus* — *Populi* — *Betuleti* — *pubescens* — *Alliariae* et *Betulae* Fabr. Rh. *exaratus* — *aeneus* et *politus* nob. — Rh. *sericeus* et *minutus* Herbst. — *rugosus* Gebl. in litt. — *nanus* Gyllenh. — *Fragariae* Steven.

A *ῥυγχίον* rostellum.

Observatio: — Species hujus generis inter se maxime differunt, quoad formam rostri; sed quamvis summam diligentiam adhibuerim, non potui distinctas detegere notas, quoniam rostrum longissimum, filiforme, tam paulatim in rostrum breve, deplanatum, ad apicem dilatatum transgreditur, sine ullo fine determinato; itaque invenire non potui tales characteres, quibus formae tam dissimiles, quam in *Rhynch. Hungarico* et *Betulae*, transferri potuerunt ad genera diversa, quamvis partes quaedam, separatim visae, maximam praebeant dissimilitudinem. —

(*Divisio 4^a. Rhinomacerides*: Rostrum elongatum, apice saepius dilatatum, rarius subcylindricum. Caput breve, transversum. Antennae clavatae, 11-articulatae. Elytra oblonga, sublinearia. *Pygidium* subtectum.)

Genus 9. *Rhinomacer* Fabr., Oliv., Dej., Billb. — *Rhynchites* Gyllenh., Germar. — *Anthrabus* Latr., Oliv., Payk., Oken.

Character generis: — Antennae longae, in medio laterum rostri insertae; articulis tribus ultimis crassioribus, valde remotis, clavam angustam formantibus.

Rostrum basi angustum, teres; apice rotundato - dilatatum.

Elytra elongata, sublinearia; supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, sublineare, molliusculum, alatum. — *Antennae* longitudine fere dimidii corporis, in medio laterum rostri superne insertae, tenues, arcuatae; articulis 11: inferis magis elongatis, obconicis, ultimis tribus crassioribus, valde remotis, clavam angustam formantibus. — *Rostrum* elongatum, capite duplo longius, basi angustum, teres, apice rotundato-dilatatum. — *Caput* breve, transversum, latitudine fere thoracis. — *Oculi* magni, laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* oblongus, angustus, subcylindricus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus. — *Scutellum* parvum, rotundatum. — *Elytra* molliuscula, supra modice convexa; thorace dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, sublinearia, apice singulatim rotundata, anum fere obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pygidium* vix observandum. — *Pedes* tenues, mediocres, omnino mutici; femoribus incrassatis; tibiis teretibus, tarsi tibiis parum breviores, articulo penultimo latiore, cordato, bilobo, ungui brevi, biunguiculato.

Typus: — *Rhinom. attelaboïdes* Fabr. — congenericus: *Rhinom. Lepturoïdes* Fabr.

A ϕ iv nasus, $\mu\alpha\chi\rho\acute{o}s$ longus.

Observatio: — Cum *Rhynchitidis* genere in multis convenit; sed structura clavae antennarum, capite brevi transverso, tarsis longiusculis et corpore molliusculo ejusque diversa forma, praecipue distinguitur.

Genus 10. *Auletes* nob. — *Tubicenus* Dejean.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, prope basim laterum rostri insertae; clava elongata, lineari, distincta; articulis parum remotis.

Rostrum rectum, subcylindricum.

Elytra oblonga, convexa.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, alatum, minoris magnitudinis. — *Antennae* rectae, capite thoraceque longio-

res, prope basin laterum rostri insertae; articulo 1^o et 2^o ovatis, crassioribus, 3^o - 8^o brevioribus, subobconicis; clava elongata, lineari, distincta, 3-articulata, articulis subperfoliatis, parum remotis. — *Rostrum* subcylindricum, omnino rectum. — *Caput* breve, transversum, latitudine fere thoracis. — *Oculi* laterales rotundati, magni, valde prominuli. — *Thorax* oblongus, subcylindricus, ad latera, praesertim posterius, parum rotundatus, basi apiceque truncatus, supra aliquantulum convexus. — *Scutellum* distinctum, triangulare. — *Elytra* thorace dimidio latiora et vix illo triplo longiora, sublinearia, supra convexa, apice rotundata, anum occultantia; humeris obtuse-angulatis. — *Pedes* omnino mutici, minus tenues; tibiis teretibus, basi angustatis, apice truncatis; femoribus vix incrassatis; tarsis longiusculis, articulo penultimo valde latiore, cordato, bilobo, subtus spongioso, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Auletes Tubicen* nob. l. *Tubicen* *rhynchitoïdes* Dej. Catalog pag. 79.

. Ab ἀνλητής, tibicen.

Observ. — Cum *Rhinomacero* et *Rhynchitide* in multis hoc genus convenit, sed antennae in basin rostri insertae, articuli clavae antennarum parum remoti, et rostrum rectum, subcylindricum; unde videtur mihi hoc genus debere definiri quasi proprium. — Unam tantum speciem e Dalmatia vidi, quae magnitudinem *Rhynchit.* nani vix attingit.

(*Divisio* 5a. *Apionides*: nob. *Rostrum* subporrectum, cylindricum l. filiforme, in paucis basi crassum, apice subulatum. *Antennae* clavatae, 11-articulatae, versus medium l. ad basin rostri insertae. *Caput* pone oculos elongatum. *Elytra* anum tegentia.)

Genus 11. *Apion*. Herbst., Germ., Gyllenh., Kirby, Thunb. — *Apus* Billb. — *Attelabus* Fabr. Payk. — *Curculio* Linn., De Geer. — *Rhinomacer* Laichart., Clairv. — *Oxystoma* Dumér.

Character generis: — Antennae sub capite inflexae, versus medium vel ad basin rostri insertae; articulis tribus ultimis arcte connexis, clavam ovalem, acutam formantibus.

Rostrum in plerisque tenue, cylindricum, arcuatum; longitudine variat.

Caput postice elongatum.

Elytra ovata, fornicata.

Descriptio: — *Corpus* ob-pyriforme, antcrius valde attenuatum alatum. — *Antennae* rectae, saepe arcuatae et sub capite inflexae l. versus medium l. ad basin rostri insertae; articulis undecim, 1o clavato, magis elongato, 2o sub-obconicis, sequentibus sex brevissimis, aequalibus, conico-rotundatis aut subturbinatis, tribus ultimis arcte connexis, clavam ovalem, acutam formantibus. — *Rostrum* saepius subporrectum, in plerisque tenue, cylindricum, in paucis basi crassum, apice subulatum, arcuatum, longitudine variat, in masculis plerumque brevius et crassius. — *Caput* postice elongatum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* basi apiceque truncatus, conicus l. subcylindricus. — *Scutellum* minutum, punctiforme. — *Elytra* ovata, antice truncata, thorace fere duplo latiora, fornicata, pone medium ampliata, anum tegentia. — *Pedes* elongati, mutici; femoribus clavatis; tibiis teretibus, a basi sensim crassioribus; tarsis elongatis, subtus spongiosis; articulis duobus basalibus subobconicis, penultimo latiore, cordato, bifido, ultimo clavato, biungiculato.

Stirps 1^{ma}. Rostrum apice subulatum.

Ad hanc stirpem referendi sunt:

Ap. Pomonae Auct. — subulatum Germ. — Craccae Germ., Gyllenh. — Attelabus Crotalariae Fabr.

Stirps 2^a. Rostrum cylindricum l. filiforme.

Huc adnumerantur: — Ap. vicinum Germ. l.

Loti Gyll. — Malvae Auct. — apricans Germ. — et plures aliae.

Ab ἀνιός l. ἄπιον, pyrus.

(*Divisio* 6^{ta}. *Rhamphides*: Rostrum elongatum, inflexum. Antennae clavatae, 11-articulatae, in sinciput insertae. Pedes postici saltatorii.)

Genus 12. *Rhamphus* Clairv., Oliv., Latr., Germ., Billb. — *Rhynchaenus* Gyllen. — *Curculio* Herbst, Payk., Marsh. —

Character generis: — Antennae tenues, breves, in sinciput intus infra oculis insertae.

Rostrum lineare, depressum, semper inflexum et pectori arcte applicatum.

Oculi in fronte conniventes.

Pedes saltatorii.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* rectae, tenues, longitudine thoracis, in sincipite intus infra oculos insertae; articulis undecim: duo priores, secundus praesertim, sequentibus multo crassiores, 3-7 fere globosi, ultimi quatuor arcte connexi, clavam ovalem, acutam formantes. — *Rostrum* longitudine thoracis, arcuatum, lineare, depressum, semper inflexum et pectori arcte applicatum. — *Oculi* in fronte conniventes, magni, rotundati, depressi. — *Thorax* brevis, lateribus rotundatus, antrosum valde angustatus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus. — *Scutellum* minutum, apice rotundatum. — *Elytra* obovata, antice truncata, thoracis basi paullo latiora, posterius ampliata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, apice subrotundata, l. potius subtruncata, anum suboccultantia. — *Pedes* mediocres, omnino mutici, postici saltatorii; femoribus valde incrassatis; tarsorum spongiis distinctis, subdilatis, articulo ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhamphus flavicornis* auctorum.

Huc quoque referri posse opinor *Ramph. tomentosus* Oliv., *Rh. subaeneus* Illig.

A ῥάμφος rostrum avium.

Observ. — Genus hujus familiae species forte minutissimas amplectens.

(*Divisio 7a. Thamnophilides*: Rostrum elongatum, cylindricum, deflexum. Antennae arcuatae, clavatae, 12-articulatae, versus medium rostri, in canaliculam insertae. Caput pone oculos non elongatum s. Pygidium nudum.)

Genus 13. *Laemosaccus* nob. — *Rhynchaenus* Fabr. — *Rhina* Oliv. — *Curculio* Herbst.

Character generis: — Antennae arcuatae, breves, ante medium rostri insertae; clava magna, ovalis.

Rostrum cylindricum, crassiusculum, rectum, sat breve; canalicula antennalis brevissima, obliqua.

Oculi subapproximati:

Elytra oblongo-subquadrata, sublinearia; abdomine breviora.

Pedes robusti, breves; tibiae apice extus unco valido deflexo armatae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, apice subtruncatum, alatum; *Antennae* arcuatae, breves, ante medium rostri insertae, 12-articulatae: articulo 1^o et 2^o oblongis, 3—8 brevissimis, coarctatis; 8^o multo crassiore, clavam incipiente; clava magna, ovali, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* deflexum, teres l. cylindricum, crassiusculum, rectum, sat breve; scrobe l. canalicula antennali brevissima, obliqua. — *Oculi* subapproximati, rotundati, magni, prominuli. — *Gula* valde inflata, globosa, emarginaturam anticam pectoris implens. — *Thorax* pulvinatus, antice coarctatus, truncatus, lateribus rotundatus, postice latior, trilobus. — *Scutellum* mediocre, apice rotundatum. — *Elytra* brevia, thoracis basi paullo latiora, et illo duplo longiora, apice fere truncata, supra modice convexa, lateribus subrectis; singulorum elytrorum basis lobum rotundatum, scutello propiorem et thoracis basin incumbentem, emittit. — *Pygidium* magnum, nudum. — *Pedes* breves, robusti; femoribus crassis, anterioribus praesertim acute dentatis; tibiis latis, compressis, subcurvatis, apice extus unco valido deflexo armatis; tarsis breviusculis, subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo gracili, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaenus plagiatus* Fabr. l. *Curcul. Nephela* Herbsl. — nec plures species vidi.

Α λαιμός gula σάκκος saccus.

Observatio: — Diagnosis indicat, hoc genus valde esse distinctum, cum a generibus ceteris, tum a *Thamno-philo*, cui praeterea aliquantisper est simile.

Genus 10. *Thamnophilus* nob. — *Magdalis* Germ., *Rhinodes* Dej. — *Rhina* Oliv. Meg. — *Rhynchaenus* Fabr., Gyllenh. — *Curculio* reliquorum.

Character generis: — Antennae mediocres, arcuatae, non vero fractae, etsi scapus oculos attingit, in medio rostri insertae; clava brevior; oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum cylindricum, in plerisque elongatum, arcuatum, in nonnullis breviusculum, subrectum.

Oculi magni, subapproximati.

Elytra subcylindrica, convexa.

Tibiae apice unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, cylindricum, alatum. — *Antennae* arcuatae, non fractae, thoracis medium non superantes, in medio rostri insertae, validiusculae, 12-articulatae: scapo seu articulo 1^o elongato, oculos attingente, clavato, plerumque sub-arcuato; 2^o brevi, crassiusculo, obconico, 3^o minore, etiam obconico, 4-8, brevibus, coarctatis, cyathi-formibus, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava 4-articulata, oblongo-ovata, acuminata, crassiuscula. — *Rostrum* deflexum, cylindricum, in plerisque, praesertim in foeminis, capite duplo longius, arcuatum, in masculis brevius et crassius; in paucis vero capite vix longius, fere rectum; scrobe infra-oculari, curvata. *Oculi* majusculi, oblongi, transversae positi, modice prominuli, fronte subapproximati. — *Thorax* anterieus angustior, basi in plerisque profunde bi-sinuatus, angulis acuminatis, supra parum convexus, in aliis basi vix sinuatus, fere truncatus. *Scutellum* distinctum, oblongum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi latiora, et illo triplo vel quadruplo longiora, con-

vexa, sub-cylindrica; vel in quibusdam posterius paullo latiora, in plerisque antice singulatim rotundato-producta, thoracis basin sub-obtegentia; vel in aliis basi subtruncata, humeris obtuse angulatis; apice ipso obtuse singulatim rotundata. *Pygidium* transversim-ovatum, ab elytris vix tectum. — *Pedes* mediocres; validi; femoribus in plerisque dentatis; tibiis omnibus apice intus unco valido sub-inflexo armatis; tarsis elongatis, crassis, articulo penultimo latiore, bilobo, ciliato, unguiculari mediocri, clavato, biunguiculato.

Stirps 1ma. Rostrum capite duplo longius, arcuatum. Thorax postice bi-sinuatus. Elytra antice singulatim rotundato-producta, thoracis basin sub-obtegentia.

Typus: — *Rhynchaen. violaceus* Fabr., Gyllenb., Oliv. — congenerici *Rhynch. phlegmaticus*, Cerasi et stygius Gyll. — *Magdal. duplicata* Germ. — et plures aliae.

Stirps 2a — (*Edo* Germ. olim.) Rostrum vix capite longius, subrectum. Thorax postice et elytra antice subtruncata.

Typus: — *Rhynchaen. Pruni* Fabr., Gyllenb. — Huc quoque pertinent: *Thamnophil. trifoveolatus* Bohem. l. *Rhina bi-punctata* Megerle in litt.

Α θάμνος frutex, φιλέω diligo.

Observat. — Quod a Germar, illustrissimo illo viro huic generi antea impositum est nomen *Magdalim* mutare ausus sum, partim, quod vitam in fructicibus suam agit, et hoc nomen forte a *μαγδαλία* (pulpa mollior ex pane) originem suam trahit, partim, quod nomen ipsum generis est feminini.

Subgenus. — *Panus.* nob. —

Adumbratio: — Antennae arcuatae, non fractae, longitudine capitis una cum thorace, crassiusculae; scapo s. articulo 1o oculos attingente, clavato, subarcuato, 2o brevi, crasso, suborbiculato, 3o minore, obconico, 4-7 brevissimis, valde coarctatis, subaequalibus, 8o etiam brevi, sed multo latiore, perfoliato: clava maxima, dimidiam totius antennae longitudinem superante, crassa, subcylindrica, apice

subacuminata, articulis quatuor arote junctis, aegre discernendis. —

Rostrum longitudine capitis, crassiusculum, parum arcuatum. —

Oculi magni subapproximati. — Elytra subcylindrica, convexa, basi apiceque singulatim rotundata.

Typus: — Rhynchaen. Rhinæ; var. β . Gyllenh. Ins. sv. nec plures species vidi. —

Denominatio subgenerica a forma clavae antennarum derivata.

Observ. — Statura et facies eadem ac in *Thamnoph. Pruni*, antennarum vero structuram valde diversa,

Divisio 8^a. — *Ithycerides*: Rostrum breve, aut teres, aut subangulatum. Antennae breves, clavatae, 12-articulatae.

Genus 15. *Chlorophanus*. Dalm. — Germ. Insect. Sp. nov. I. p. 440. — *Chlorima* Dejean. — *Curtulio* Linn., Fabr., Gyllenh. — *Platyrhynchus* Megerle. — *Brachyrhinus* Latr., Billb.

Character generis: — Antennae breves, versus apicem rostri insertae; scapus elongatus, articulis funiculi obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava ovata acuminata.

Rostrum breve, in medio carinula longitudinali, elevata notatum, apice profunde emarginatum.

Oculi rotundati, mediocriter prominuli.

Thorax oblongus, anterieus angustior, basi bisinuatus.

Scutellum parvum, triangulare.

Elytra ovata, apice mucrone parvo, piloso-armata.

Tibiae anteriores intus curvatae, apice unco inflexo saepius instructae.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, saepius viridi-pollinosum, alatum. — *Antennae* infractae, ad thoracis medium pertingentes, versus apicem rostri insertae, sub-

tenuēs, articulis 12: 1o oculos vix attingente, clavato, 2 - 8 obconicis, gradatim brevioribus; clava oblongo-ovata, acuminata, 4.-articulata. — *Rostrum* breve subhorizontale, crassum, capite angustius, superne in medio carinula elevata, ad frontem usque producta, apice triangulariter emarginatum, ore piloso; scrobe curvata, laevi, ante oculum abbreviata. — *Oculi* parvi, rotundati, subprominuli. — *Thorax* latitudine baseos paullo longior, antrorsum paullo angustior, truncatus, lateribus vix rotundatus, basi leviter bisinuatus, supra modice convexus, subtus pone gulam in aliis integer, in aliis late sed parum emarginatus, margine tunc paullo reflexo. — *Scutellum* parvum, triangulare, distinctum. — *Elytra* magna, thoracis postici dimidio latiora, sed illo quintuplo longiora, humeris obtuse angulatis; apicem versus attenuata, apice ipso mucrone parvo, piloso, recto armata, supra mediocriter convexa, regulariter punctato-striata, anum occultantia. — *Pedes* elongati, antici paullo longiores, subtenues; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis subteretibus, anterioribus intus curvatis, apice intus unco, praesertim in altero sexu magno, inflexo, armatis; tarsis articulis duobus basilibus subtrigonis, primo elongato, penultimo lato, bilobo, subtus spongioso, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a Clava antennarum oblongo-ovata. Tibiae anteriores apice saepius unco valido armatae.

Typus: — *Curculio viridis* Auctorum. — Species mihi cognitae et huc pertinentes: *Curculio flavescens* - pollinosus et sellatus Fabr. — *Chloroph. submarginalis* nob.

Stirps 2a — Clava antennarum ovata, brevissima, subconica. Mandibulae exsertae, rectae, corneae, acuminatae. Tibiae anteriores apice unco parvo armatae. (*Phaenodes* nob. olim.)

Typus: — *Curculio fallax* Illig. et Germ. - nec plures vidi.

A *χλωρός* viridis, *γανός* lucidus.

Quamvis habitu magnam exhibeat similitudinem cum legione *Brachyrhynchorum* et divisione *Brachyde-*

ridum, hoc tamen genus huic loco, quoniam antennae non sunt fractae, applicare coactus sum.

Genus 16. *Ithycerus* — Dalm. — *Rhynchites* Herbst.
— *Curculio* Fabr., Oliv., — *Chlorima* Germ.

Character generis: — Antennae breves, versus apicem rostri insertae; articulis obconicis, gradatim brevibus, remotis; clava sub-ovata, minuta.

Rostrum breve, apice incrassatum.

Thorax oblongus, subcylindricus basi apiceque truncatus.

Scutellum majusculum, triangulare.

Elytra oblongo-ovata, supra convexa, versus apicem declivia, subcallosa; humeri rectangulati.

Pygidium nudum, minutum.

Tibiae rectae, apice truncatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum alatum, facies fere generis *Hylobii*. — *Antennae* rectae, breves, validae, versus apicem rostri insertae, 12-articulatae: articulo 1^o anclavato, brevi, oculum haud tangente, 2-8 obconicis, exterioribus sensim brevioribus, remotis; clava minuta, ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breve, subhorizontale, sed paullo nutans, carinatum, apice incrassatum, erosum; canalicula antennalis fere nulla. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, elytris multo angustior; basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* majusculum, triangulare. — *Elytra* oblonga, antice thorace duplo latiora, supra convexa, versus apicem declivia, sub-callosa, apice ipso singulatim rotundata; humeris rectangulatis. — *Pygidium* nudum, minutum. — *Pedes* validi; femoribus muticis; tibiis rectis, apice truncatis, anticis apice intus spina horizontali minutissima armatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1,2 trigonis, subaequalibus, 3^o reliquis vix latiore, bilobo, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Typus. — *Rhynchites curculionoides* Herbst. — nec plures vidi.

Ab Ἰδύς rectus, κίρας cornu.

Observ. — Rostrum apice erosum haud triangulariter emarginatum, scapus brevissimus, thorax postice truncatus, scutellum majusculum, elytra apice singulatim rotundata et rectae tibiae, antice ad apicem spina horizontali minutissima intus armatae, hoc genus a Chlorophano bene distinguunt.

Genus 17. Mecaspis nob. — Lixus Oliv. — Cleonis Dejean. —

Character generis: — *Antennae* breves, validiusculae; scapus oculos vix attingens, articulis primis funiculi longiusculis, subobconicis, reliquis brevissimis, transversis, coarctatis; clava oblonga, ovalis. —

Rostrum capite longius, crassiusculum, subarcuatum, in medio carinatum.

Oculi ovati, depressi.

Thorax subconicus, antice emarginatus, basi bi-sinuatus, supra parum convexus, in medio baseos fovea longitudinali profunde impressus.

Scutellum valde elongatum, triangulare, acuminatum.

Elytra sublinearia, antice singulatim rotundata, supra parum convexa, versus apicem callosa.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* ad medium thoracis pertingentes, infra medium rostri insertae, validiusculae, haud visibiliter fractae, 12 - articulatae: articulo 1o oculos vix attingente, apice incrassato, 2 et 3 longiusculis, subobconicis, 4 - 8 brevissimis, transversis, coarctatis, subaequalibus; clava oblonga, ovali, acuminata, 4 - articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* capite longius, crassiusculum, subdeflexum, subarcuatum, supra subplanum, in medio carinatum; scrobe valde curvata, subtus flexa, ad basin rostri subtus definente. — *Oculi* laterales, ovati, depressi, oblique positi. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus angustior, subconicus, apice late emarginatus, ad latera lobis rotundatis versus oculos productis instructis, basi bisinuatus, ante scutellum prominenter lobatus, lateribus vix rotundatus, supra parum convexus, in medio baseos fovea longitudinali profunde impressus, subtus pone gulam lev-

viter emarginatus. — *Scutellum* magnum, valde elongatum, triangulare, angustum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, et illo fere quintuplo longiora, sublinearia, humeris subrotundatis; antice singulatim rotundata, sinibus thoracis basalibus applicata, supra parum convexa, versus apicem callosa, apice ipso singulatim rotundata, pygidium tegentia. — *Pedes* mediocres, basi approximati; femoribus muticis, in medio incrassatis; tibiae teretes, apice unco parva, subhorizontali intus armatae; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulis 1, 2 subtrigonis, 3^o latiore, bilobo, ultimo elongato, valido biunguiculato.

Typus: — *Lixus palmatus* Oliv. — Nullam speciem aliam vidi.

Α μήκος longitudo, ἀντλ. scutellum.

Observ. — Habitus *Lixi*. — Generi *Cleoni* valde associatum; differt imprimis antennis haud fractis, nec articulo octavo adeo incrassato, nec cum clava coadunato, scutellum valde elongatum.

Genus 18. *Pachycerus* Gyllenh. — *Lixus* Oliv. —

Curculio Herbst. — *Cleonis* Dejean.

Character generis: — Antennae brevissimae, crassae versus apicem rostri insertae; articulis 2-8 brevibus, coarctatis, clava fusiformis.

Rostrum breve, crassum, angulatum, supra impressum, inaequale. —

Oculi ovales, immersi.

Thorax oblongus, antice coarctatus, lobis ocularibus distinctis, basi sub-bisinuatus.

Scutellum vix observandum.

Elytra elongata, convexa, versus apicem angustata, humeri subrotundati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* brevissimae, rectae, crassae, versus apicem rostri insertae; articulis 12: 1^o elongato clavato, oculos non attingente, 2^o et 3^o brevissime obconicis 4^o-8^o transversis, coarctatis; clava fusiformi, angustata acuminata, 4-articu-

lata, articulis arctissime connexis. — *Rostrum*. breve, crassum, angulatum, subdeflexum, supra impressum, carinatum, inaequale, apice incrassatum; scrobs profunda, infra-oculari, curvata. — *Oculi* laterales, ovales, immersi, transversim positi. — *Thorax* latitudine longior, antice coarctatus, truncatus, pone oculos lobatus, lateribus rotundatus, basi subsinuatus, supra modice convexus. — *Scutellum* minutissimum, vix conspicuum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, sed illo fere quadruplo longiora, versus apicem angustata, apice ipso singulatim subrotundata, supra modice convexa, postice declivia, subcallosa; humeris subrotundatis. — *Pedes* fortes; femoribus clavatis, muticis; tibiae teretes, versus apicem spina et in apice ipso unco horizontali intus armatae; tarsis elongatis, articulis tribus basalibus subtus spongiosis, latitudine subaequalibus, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Lixus madidus* Oliv. l. *Curc. varius* Herbst. nec plures species vidi.

A παχὺς crassus, *κέρας* cornu.

Observ. — Hoc genus in limite est Gonatocerorum, et certe valde assimile *Cleona* nob. (*Lixus* Oliv. — *Cleonia* Dej.), sed antennae crassiores et rectae, mihi haud visibiliter fractae, praeter plures characteres, minus tamen essentielles, mihi hoc diversum genus formandi causam dederunt.

Genus 19. *Rhinocyllus* Germ. n. Wetter. *Annal.*, Billb. — *Lixus* Oliv. Latr. Illig. — *Curculio* Herbst., Rossi et plures. — *Rhinobatus* Dejean.

Character generis: — Antennae brevissimae, crassae; articulis transversis, subperfoliatis, subcoarctatis, crassitudine crescentibus; clava ovata.

Rostrum breve, crassum, angulatum, deflexum.

Oculi ovales, inferne angustati.

Scutellum minutissimum.

Thorax subconicus, postice profunde bi-sinuatus.

Elytra oblonga, sublinearia, convexa, basi singulatim rotundata.

Descriptio. — *Corpus* oblongum, capitis, thoracis, elytrorumque latitudinem sensim adaequat, unde facies subaequalis; alatum. — *Antennae* rectae, subarcuatae, brevissimae, in medio rostri insertae, crassae, 12-articulatae: articulo 1o longiore, obconico; oculos subattingente, reliquis brevibus, transversis, subperfoliatis, subcoarctatis, gradatim paullo latioribus; clava ovata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breve, crassum, angulatum, deflexum, subarcuatum; scrobe infra-oculari, curvata. — *Oculi* laterales, ovoides, inferne angustati, convexiusculi. — *Thorax* subconicus, antice truncatus, ad basin profunde-bisinuatus, in medio lobatus, subtus pone gulam late, non vero profunde emarginatus. — *Scutellum* minutissimum, vix conspicuum. — *Elytra* oblonga, sublinearia, basi singulatim rotundato-producta, thoracis parte postica vix latiora, versus apicem subcallosa, apice ipso obtuse rotundata. — *Pedes* validi; tibiis apice unco minuto intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, bilinguiculato, unguibus brevibus.

Typus. — *Curcul. thaumaturgus* Ross. l. Lix. antidontalgicus Illig. — Species mihi cognitae et huc etiam pertinentes: *Rhinocyllus carinatus* Megerle l. Lix. latirostris Latr. Lix. morosus Oliv. — *Rhinoc. Olivierii* Megerle, l. Lix. odontalgicus Oliv. — *Rhinobat. planifrons* Dej.

Α ῥίπν nasus, κλλός curvus.

Observ. — Hoc ab illustrissimo illo viro Germaro, genus primo constructum, deinde ab illo cum genere *Larini* conjunctum, a quo tamen abunde differt antennarum et rostri forma.

Genus 20. *Lachnaeus* nob.

Character generis. — *Antennae* breves, deflexae, validiusculae; articulo 1o elongato, clavato, 2o brevi; subnodoso, 3o-8o brevissimis, subrotundatis, clava ovata, crassiuscula.

Rostrum subbreve, crassiusculum, subteres.

Oculi ovati, parum prominuli.

Thorax longitudine latior, antèrius valde angustior, postice bisinuatus.

Elytra ovata, basi singulatim rotundato-producta, supra modice convexa; humeri subrotundati.

Descriptio: — *Carpus* breviter-ovatum, pilosum, alatum, minoris magnitudinis. — *Antennae* thoracis medium attingentes, in medio rostri insertae, deflexae, arcuatae, non fractae, validiusculae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculos subattingente, 2^o brevi, subnodoso, 3-8 brevissimis, lenticularibus, subaequalibus; clava ovata, crassiuscula, apice acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius, deflexum, crassiusculum, subtiles; scrobe infra-oculari curvata. — *Oculi* laterales, ovati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latior, antèrius multo angustior, antice late subemarginatus, lateribus paullo rotundatus, postice bisinuatus, in medio lobatus, supra parum convexus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* ovata, thoracis basi paullo latiora, sed illo triplo longiora, posterius angustiora, basi singulatim rotundato-producta, humeris subrotundatis; supra modice convexa, versus apicem subcallosa. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus in medio crassioribus; tibiae rectae, omnes apice unco horizontali intus armatae; tarsis parum dilatatis, articulo penultimo latiore, cordato, bilobo, subtus obsolete spongioso, unguiculari, crasso, biunguiculato.

Typus: Lachn. crinitus nob. e Caucaso-hanc unam vidi speciem.

A λαχναῖος pilosus, hirsutus.

Observ. — Statura et facies eadem fere, ac generis Larini, a quo tamen ceterum abunde differt structura antennarum, forma rostri etc. — Simile etiam generi Rhinocyllo, sed differt, antennarum maiore tenuitate aliterque constructarum, forma corporis brevioris et latioris.

Genus 21. *Nerthops* nob. — *Rhynchites* Wiedem.

Character generis: — *Antennae* brevissimae, crassiusculae, in rostri medio insertae; articulis funiculi trans-

versis, coarctatis, crassitudine crescentibus; clava ovata, acuminatâ.

Rostrum breviusculum, nutans, teres, subarcuatum.

Oculi laterales, maximi, infra caput fere connexi.

Elytra oblongo-subquadrata, parum convexa.

Pygidium nudum, semicirculare.

Descriptio: — *Corpus* ovato-subquadratum, parum convexum, alatum. — *Antennae* rectae, brevissimae, capite paullo longiores, crassiusculae, in rostri medio insertae, articulis 12: 1^o breviusculo, subobconico, 2^o brevi, nodoso, 3-8 brevissimis, transversis, valde coarctatis, sensim paullo crassioribus, 8^o clavam incipiente; clava 4-articulata, ovata, articulo ultimo minutissimo, acuminato. — *Rostrum* teres, nutans, capitis longitudine, crassiusculum, subarcuatum; scrobis profunde impressa, ad latera ante apicem incipiente, sensim subtus tendente, et in inferiore parte rostri baseos desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, maximi, infra caput fere connexi, paullulum prominuli. — *Thorax* transversus, antice paullo angustior, truncatus, lateribus valde rotundatus, postice leviter bisinuatus, supra parum convexus. — *Scutellum* sat magnum, triangulare. — *Elytra* oblongo-subquadrata, thorace dimidio latiora ejusque latitudine sesqui longiora, antice et postice singulatim rotundata, supra parum convexa; humeris obtuse-angulatis. — *Pygidium* nudum, semirotundatum. — *Pedes* robusti; femoribus incrassatis, anterioribus subdentatis; tibiae teretes intus curvatae, bisinuatae, apice unco valido subflexo armatae; tarsis breviusculis, articulo penultimo latiore, bilobo, spongioso, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — *Rhynchites multiguttatus* Wiedem. — nec plures vidi. —

A νεροει infra ὤψιν oculus.

Observ. — Antennis brevissimis, articulis nodosis coarctatis, oculis infra caput fere connexis, pygidio nudo, corpore ovato-subquadrato, parum convexo, hoc genus facile distinguitur.

Genus 22. *Oxyops* Dalm.

Character generis: — Antennae longiusculae, minus tenues; scapus sensim incrassatus, oculorum medium attingens; articulo basali funiculi brevissimo, 2-7 longioribus, omnibus subobconicis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum capite paullo longius, lineare, teretiusculum.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax anteriùs angustior, truncatus, postice bisinuatus.

Elytra oblongo-ovata, antice singulatim rotundato-producta, thoracis basin obtegentia, latera subrecta.

Sternum porrectum, apice acuminatum.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-subovatum, alatum. — *Antennae* ad thoracis basin pertingentes, minus tenues, in medio rostri insertae, vix perspicue fractae, 12 articulae: articulo 1^o incrassato, oculorum medium attingente, 2^o brevissimo, 3-8 sub-obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* deflexum, capite paullo longius, teretiusculum, lineare, apice rotundatum, in medio linea longitudinali elevatum; scrobe lineari, infra-oculari, curvata, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* sublaterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* basi profunde bisinuatus, lateribus nonnihil rotundatus, anteriùs angustior, truncatus, supra parum convexus, subtus pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* elongatum, sublineare, distinctum. — *Elytra* magna, oblongo-ovata, thoracis basi fere duplo latiora, et illo quadruplo longiora, antice singulatim rotundata, lobata, thoracis basin obtegentia, humeris obtuse angulatis, lateribus subrectis; apice rotundata, intra acumine parvo prominulo, supra convexa, ad suturam planiuscula, versus apicem callosa, anum obtegentia. — *Sternum* inter media coarum paria porrectum, crassum, breve, apice acuminatum. — *Pedes* mediocres, antici basi approximati; femoribus sublinearibus, muticis; tibiis rectis, subcompressis, intus crenulatis, apice omnino muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo.

Typus: — *Oxyop. clathratus* Dalm. — Insectum singulare e Brasilia. Una sola species mihi cognita, asservatur in Mus. Reg. Acad. Scient. Holm.

Ab $\sigma\delta$ acutus, $\omega\psi$ oculus.

Genus 23. *Tanaos* nob. — *Apion* Thunb.

Character generis: — Antennae brevissimae, arcuatae, in medio rostri insertae, articulis subrotundatis, subaequalibus; clava ovata.

Caput elongatum, porrectum, subconicum.

Rostrum breve, cylindricum, porrectum.

Oculi rotundati, subdepressi.

Thorax subconicus.

Elytra elongata, supra mediocriter convexa, versus apicem attenuata, pygidium obtegentia.

Pedes breves, validi.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, porrectum, durum, alatum. — *Antennae* rectae l. subarcuatae, capite vix longiores, validiusculae, in rostri medio insertae, articulis 12: 1^o reliquis longiore, clavato, arcuato, 2^o brevi, turbinato, crassiusculo, 3-8 lenticularibus, subaequalibus, sensim perparum crescentibus; clava ovata, acuminata, 4-articulata, articulis distinctis. — *Rostrum* longitudine capitis, crassiusculum, cylindricum, porrectum; scrobes subrectae, obliquae, versus basin rostri subtilius conniventes. — *Caput* porrectum, elongatum, subconicum. — *Oculi* laterales, rotundati, subdepressi. — *Thorax* latitudine fere longior, subconicus, antice posticeque truncatus, supra modice convexus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* elongata, oblongo-ovata, antice thoracis basi vix latiora, sed illo fere quintuplo longiora, pone medium latiora, numeris obtuse angulatis; supra modice convexa, apice obtuse rotundata, pygidium obtegentia. — *Pedes* brevissimi, validi; femoribus in-crassatis; tibiis subrectis, crassiusculis, apice muticis; tarsis latis, subtilius spongiosis, articulo 1^o basi subrotundato, 2^o trigono, penultimo latiore, bilobo, ultimo brevi, biunguiculato.

Typus: — *Tanaos sanguineus* Dalm. Apion idem. Thunb. — ex India orientali; e Museo. Illustrissimi Dom. Thunberg, benigne mecum communicatus; nec plures species vidi.

A tanaos extensus, porrectus.

Observ. — Hoc genus faciem fere eandem habet ac *Cylas*, forma vero aliena est et singularis, valde elongata, porrecta. —

Genus 24. *Stenocorynus* nob. — *Curculio* Fabr.

Character generis: — Antennae breviusculae; minus tenues; articulo 1^o oculos subattingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, subturbinatis; clava valde elongata, articulo 1^o angusto, longissimo.

Rostrum breviusculum, crassiusculum, subteres, supra carinatum.

Oculi ovati, subdepressi.

Thorax anterie angustior, pone oculos lobatus, supra convexus.

Scutellum nullum.

Elytra oblongo-ovata, convexa.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, apterum. —

Antennae thoracis medium vix longitudine superantes, versus apicem rostri insertae, infractae, minus tenues, parce rigide-pilosae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2 et 3^o longiusculis, obconicis, sequentibus quinque brevibus, subturbinatis; clava elongata, 4-articulata, articulo 1^o angusto, longissimo, subcylindrico. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, subteres, supra subplanum; in medio carinatum, apice triangulariter emarginatum. paullulum incrassatum; scrobe curvata, sensim subtus flexa, pone canthum inferum oculi evanescente. — *Oculi* laterales, ovati, subdepressi. — *Thorax* antice late emarginatus, postice truncatus, anterie angustior, lateribus aliquantulum rotundatus, supra convexus, subtus pone gulam profunde emarginatus, juxta oculos eminenter lobatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* oblonga, antice subtruncata,

thoracis basi paullo latiora, sed illo quadruplo longiora, supra valde convexa, apice subacuminata, pygidium tegentia; humeris rotundatis, antrorsum paullo prominulis. — *Pedes* validi, longitudine subaequales; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis teretibus, anterioribus intus paullo arcuatis, apice angulato-dentatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 latiusculis, subtrigonis, penultimo paullo latiore, bilobo, ultimo clavato valido, biunguiculato.

Typus: — *Curc. crenulatus* Fabr. — Hujus generis unam tantum speciem vidi.

Α στενός angustus, κορυφή clava.

Observatio: — Statura fere eadem ac generis *Cleoni*, a quo tamen abunde differt: antennis haud fractis, clava antennarum singulari, articulo 1o angusto, longissimo, nullo scutello, corpore aptero.

(*Divisio* 9a. *Cryptopsides*: Rostrum breve, crassum, subinflexum. Antennae breves, tenues, arcuatae, clavatae, 12-articulatae. Thorax subtus pro receptione rostri profunde canaliculatus. Scutellum nullum. Tarsi angustati, setosi.)

Genus 25. *Cryptops*: nob. — *Brachycerus* Wiedem.

Character generis: — Antennae breves, tenues, arcuatae; articulo 1o oculos non attingente, 2o et 3o longiusculis, obconicis, 4-8 brevissimis, subrotundatis; clava magna, breviter ovata, acuminata.

Rostrum breve, crassum, subangulatum, apice late emarginatum, anguli saepius tanquam cornua porrecta, nuda, obtusa, producti.

Oculi ovati l. subangulati, immersi; superior arcus callosus.

Thorax oblongo-quadratus, subtus profunde canaliculatus.

Elytra rigida, inaequalia, apice subretusa.

Tarsi crassi, setosi, spongiis nullis.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, crassum, durum, tuberculatum vel inaequale, apterum. — *Antennae* arcuatae, non fractae, capite rostroque vix longiores, infra medium rostri insertae; scapo valde clavato, oculos subattingente; funiculo; 7 - articulato, articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevissimis, subrotundatis; clava magna, distincta, breviter ovata, acuminata, 4 - articulata, articulo ultimo minuto. — *Caput* latum, oculorum arcu superiore calloso, prominulo eosque tegente. — *Rostrum* subinflexum, thorace paullo brevius, crassum, subangulatum, apice late emarginatum, anguli saepius, ut cornua apice obtusa, producti; ore amplo. — *Oculi* ovati l. subangulati, immersi. — *Thorax* latitudine longior, saepius subquadratus, interdum etiam subrotundatus, antice sinuato-emarginatus, in medio productus, pone oculos eminentissime lobatus, postice truncatus, supra modice convexus, subtus inter pedes anticos manifesto et profunde canaliculatus (ut in divisione *Cryptorhynchorum*). — *Scutellum* nullum. — *Elytra* oblonga, subquadrata, thorace fere dimidio latiora et illo fere triplo longiora, inaequalia, supra paullo depressa, versus apicem valde convexa, apice subretusa; humeris obtusis, non rectangulatis. — *Pedes* validiusculi, antiqui approximati; femoribus subcylindricis, muticis; tibiae omnes rectae, anteriores extus dente subobtusos, deflexos, intus unco acuto subinflexo, apice armatae; tarsis compressis, crassis, validis, rigide setosis, articulo ultimo elongato, subcylindrico, unguiculis longis, arcuatis, distantibus.

Typus: — *Crypt. Buccellarius* nob. — Huc quoque pertinent: *Brachycer. quadratus* et *spinicollis* Wiedem., atque praeterea plures species e Cap. bon. spei et Bengalia; quas conspexi in Musaeo pulcherrimo Dom. Westermanni, Havniae.

Α κρύπτω abscondo, ὤψ oculus.

Observatio: — Statura et facies eadem, ac in genere *Brachyceri*, antennae vero aliter constructae atque tenuiores sunt. A generibus praecedentibus praecipue distinctum red-

ditur thorace subtus profunde canaliculato, tarsis setosis, spongiis nullis.

(*Divisio* 10^a. Antliarhinides: Rostrum porrectum. Antennae clavatae, 11-articulatae; clava angusta, tri-articulata. Scutellum distinctum. Corpus deplanatum.)

Genus 26. Antliarhinus: nob. — Antliarhis Billb. — Rhynchaenus Fabr., Oliv. — Curculio Thunb., Herbst.

Character generis: — Antennae mediocres; clava elongata, 3-articulata.

Rostrum in uno sexu longissimum, arcuatum, subcapillare; in altero sexu breve, rectum, versus apicem sensim attenuatum.

Thorax suborbiculatus, deplanatus.

Elytra oblonga, deplanata; humeris rectangulis.

Descriptio: — Corpus oblongum, complanatum, durum, alatum. — *Antennae* rectae, capite thoraceque paullo longiores, subtenues, 11-articulatae: articulo 1^o longo, obconico, 2 - 6 fere cylindricis, 7 et 8 brevissime obconicis, ultimis tribus paullo crassioribus, clavam oblongam, acuminatam formantibus. — *Caput* minimum, thorace multo angustius; in uno sexu collo lato, in altero sexu collo coarctato. — *Rostrum* ejus, quam opinor feminam, filiforme, porrectum, corpore triplo longius, subcapillare; ejus vero, quem opinor esse masculum, breve, longitudine thoracis, ad basin latum, sensim ad apicem attenuatum, fere subulatum. — *Oculi* laterales, globosi, prominuli. — *Thorax* elytris dimidio angustior, suborbicularis, dilatato-rotundatus, deplanatus, antice truncatus, postice marginatus, leviter bi-sinuatus. — *Scutellum* mediocre, triangulare. — *Elytra* oblonga, sublinearia, thorace fere duplo latiora, sed illo quadruplo longiora, humeris rectangulatis, subelevatis; supra deplanata, apice rotundata, pygidium vix obtegentia. — *Abdomen* deplanatum, segmentis duobus basalibus longissimis, arctissime conjunctis, 3 et 4 brevibus, transversis, ultimo aut semi-circulari aut

triangulato. — *Pygidium* nudum, minutum subrotundatum. — *Pedes* validi, artici basi approximati; femoribus compressis, in medio valde dilatatis; tibiis teretibus, inermibus; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato, unguibus brevibus.

Typus: — *Curculio Zamiae* Thunb., Herbst. — Huc quoque referri posse: *Rhynchaen. haustellatus* Fabr. et Oliv., *Curculio* idem Herbst. An. eadem species? *Antennae fractae* (!) teste Dom. Oliv.

A *avilia* haustrium, *qly* nasus.

(*Divisio* 11^a. *Brenthides*: Rostrum porrectum. Antennae non clavatae, 11-articulatae. Collum distinctum; Scutellum non observandum. Abdomen segmento 1^o et 2^o longissimis, arcte junctis, aegre discernendis, 3^o et 4^o brevissimis, transversis, instructum, ultimo breviusculo, semicirculari. Corpus durum, subcylindricum, elongatum.)

Genus 27. *Brenthus*. Fabr. et Auctorum. — *Curculio* Linn.

Character generis: — Antennae breviusculae, extrorsum paullo crassiores; articulis brevibus, subobconicis, apice truncatis, ultimo oblongo-ovato.

Rostrum porrectum, saepius longissimum.

Caput elongatum, antice posticeque angustatum, collo infixum.

Thorax plerumque elongato-ovatus.

Elytra elongata, linearia.

Tarsi subdilatati, spongiosi.

Descriptio: — Corpus longissimum, subcylindricum antice angustius, porrectum, rigidum, alatum. — *Antennae* rectae, in mare prope medium, in femina juxta basin rostri insertae, vix rostro una cum capite longiores, extrorsum paullo crassiores, validiusculae, 11-articulatae: articulo 1^o majore, obconico, reliquis brevibus, subobconicis, apice truncatis, ultimo oblongo-ovato. — *Rostrum* porrectum, saepe

longissimum; in uno sexu, (quem opinor esse masculum) plerumque longius, extrorsum attenuatum, apice iterum nonnihil dilatatum; in altero sexu, seu in femina, brevius, subulatum. — *Caput* porrectum, elongatum, antice et plerumque etiam postice attenuatum, collo distincto. — *Oculi* parvi, laterales, rotundati, plus minusve prominuli. — *Thorax* antice et postice truncatus, saepe longissimus, angustus, in aliis elongato-ovatus, in aliis conicus, lateribus leviter rotundatus, supra in plerisque sulco dorsali profundo impressus, in nonnullis modice convexus, integer. — *Scutellum* nullum l. potius haud distinctum. — *Elytra* elongata, linearia, thorace haud latiora; paullulum vero longiora, dorso saepius depresso, apice interdum in masculis maxime attenuata l. appendiculata. — *Pedes* elongati, validi, antice longiores; femoribus clavatis, interdum dentatis, ante apicem subtus emarginatis; tibiis anticis in plerisque uncis duobus apice armatis; tarsis subtus evidenter spongiosis, articulo penultimo paullo latiore, bifido, ultimo elongato, clavato, valido, biunguiculato.

Stirps 1^a. — Caput juxta oculos plus minusve elongatum, obconicum l. posterius maxime angustatum.

Manip. 1^a. Femora mutica.

Typus: — Br. sesqui-striatus nob. — obtusus Fabr.

Manip. 2^a. Femora dentata.

Typus: — Br. canaliculatus Fabr. — congenerici: Br. anchora, volvulus et bidentatus Fabr. — Br. signatus Dalm. Anal.

Stirps 2^a. — Caput conicum l. posterius parum angustatum.

Manip. 1^a. Femora mutica.

Typus: — Br. assimilis Fabr. — monilis Fabr. — sulcirostris nob.

Manip. 2^a. Femora dentata.

Typus: — Br. planicollis nob.

A *βρένθος* avis, verisimiliter *Tringa pugnax*.

Observatio: — „Genus *Brenthus Curculionides* cum genere *Lycto* conjungit.“ Germ. — Habitat, ni fallor, sub cortice arborum.

Subgenus A. *Hormocerus* nob. — *Brenthus* Auctor.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, in mare prope medium, in femina juxta basin rostri insertae, moniliformes, extrorsum vix l. parum crassiores; articulo ultimo breviter ovato. — *Rostrum* elongatum, cylindricum, porrectum, in masculo nonnunquam brevissimum, dilatatum; mandibulis exsertis, arcuatis. — *Caput* postice latius, mox pone oculos tamquam caesurato truncatus. — *Thorax* elongato-ovatus, supra saepius sulco dorsali profundo instructus. — *Elytra* elongata, linearia, apice obtuse rotundata. — *Tarsi* subcylindrici, subtus haud spongiosi, articulo penultimo bilobo, reliquis haud latiore.

Typus: — Br. *reticulatus* Fabr. — congenerici: Br. *bisulcatus* Fabr. — Br. *coronatus* Germ.

A *ὄρεος* monile, *κέρας* cornu.

Observ. — Generi *Brenthi* valde affine, caput vero postice latius, mox pone oculos abrupte truncatum, et tarsi haud spongiosi. Subgeneri *Arrhenodis* etiam propinquum, antennae autem moniliformes et tarsi cylindrici, differentias pro constituendo proprio subgenere praebent evidentes.

Subgenus B. *Arrhenodes* Steven.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, infra basin rostri insertae, subfiliformes, subtenues, articulis inferioribus obconicis subaequalibus, exterioribus saepissime subcylindricis, raro oblongo-ovatis, ultimo elongato, subacuminato. — *Rostrum* porrectum, in masculis brevissimum, difforme, dilatatum, mandibulis validis, exsertis; in feminis elongatum, filiforme. — *Caput* breve, postice latiusculum, saepius mox juxta oculos abrupte excisum; collo distincto, brevi. — *Elytra* elongata, subcylindrica, convexa, versus apicem paullo angustiora, in plerisque apice subtruncata, dente minuto,

acuto, producto, in paucis apice inermia. — *Tarsis* subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, unguibus validis.

Typus: — *Br. septemtrionis* Herbst. — congenerici: *Br. dispar* Auct. — *Br. anomaliceps* Herbst. — *maxillosus* Oliv. — *mandibularis* et *truncatus* nob.

Ab ἀρρενωπίας virilis, fortis.

Observ. — Masculorum rostrum breve, mandibulae prominentes et forma antennarum aliquantisper dissimilis, nec non structura totius corporis paullo robustior, hoc subgenus a caeteris distinguit. — Cfr. observationem ad subgenus *Hormocerus*.

Subgenus C. *Nemorhinus* Stev.

Adumbratio: — *Antennae* longae, tenues; articulis plerisque subaequalibus, inferioribus subobconicis, exterioribus cylindricis, in masculo versus apicem, in femina juxta basin rostri insertae. — *Rostrum* porrectum, saepe longissimum, subfiliforme, in masculis ad insertionem antennarum arcuatum, in feminis vero rectum, at in quibusdam thorace vix longius. — *Caput* subconicum, collo elevato adnexum. — *Thorax* oblongo-ovalus, supra convexus, in plerisque laevis, in paucis sulco dorsali instructus. — *Elytra* elongata, linearia, cylindrica, in quibusdam apice subtruncata, dente valido, recurvo, in aliis apice obtusa, dente nullo, in aliis spina recta, acuminata armata. — *Pedes* elongati, validi, antici longiores, robustiores; tibiis anticis interdum intus in medio dente obtuso-armatis; tarsis longis, spongiis distinctis, articulo penultimo bilobo.

Typus: — *Br. myrmecophaga* Herbst. — Ejusdem subgeneris sunt: *Br. laevis* et *duplicatus* Germ. — *Br. militaris* Oliv. — *Br. cylindricornis* Fabr. — *Br. (Nemorh.) nanus*, *gracilis* et *filicornis* nob.

Manip. 1^a. Femora mutica.

Manip. 2^a. Femora dentata.

A νῆμα filum, ῥίς nasus.

Observ. — Antennae longae, filiformes, characterem evidenter distinctum a ceteris cognatis praebent.

Genus 28. *Taphroderes* nob. — *Brenthus* Fabr., Lund, Dumér.

Character generis: — Antennae breviusculae, extorsum paullulum crassiores; articulis brevibus, apice truncatis, ultimo oblongo, obtuso.

Rostrum breviusculum, porrectum.

Caput valde elongatum, anterius angustatum.

Thorax valde elongatus, anterius angustior, in utroque latere fovea magna, lata, profunde impressus.

Elytra elongata, cylindrica, apice introrsum singulatim oblique truncata.

Tibiae brevissimae, compressae.

Tarsi compressi, haud spongiosi.

Descriptio: — *Corpus* valde elongatum, cylindricum, porrectum, durum, alatum. — *Antennae* rectae, longitudine capitis una cum rostro, prope basin rostri insertae, in femina, quam puto, validae; (marem enim haud vidi) articulo 1^o majore breviter obconico, 2-10 brevibus, nodosis, apice truncatis, exterioribus gradatim perparum crassioribus, praesertim tribus ultimis, 11^o oblongo, obtuso. — *Rostrum* longitudine capitis, porrectum, subteres, nonnihil arcuatum, mandibulae breves, arcuatae, corneae, intus uni-dentatae. — *Caput* porrectum, anterius elongatum, angustatum, postice sub-emarginatum, collo distincto, elevato-affixum. — *Oculi* mediocres, sub-rotundati, depressi. — *Thorax* valde elongatus, anterius angustior, basi apiceque truncatus, supra convexus, in utroque latere fovea magna, lata, oblonga, pro receptione femorum anticorum impressus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* thoracis basi haud latiora et illo paullo longiora, convexa, cylindrica, apice introrsum singulatim oblique truncata. — *Abdomen* subtus versus apicem subretusum, lateribus impressum, ad recipienda femora intermedia et postica. — *Pedes* breviusculi, validi, antici longiores; femoribus clavatis, compressis, muticis; tibiis brevissimis, latius-

culis; tarsis elongatis, crassis, compressis, haud spongiosis, unguibus validis.

Typus: — *Taphroderes brevipes* nob. — congenericus: *Brenth. foveatus* Fabr.

A τάφρος fossa, δέση collum.

Observ. — Structura aliena capitis, thoracis atque pedum hoc genus a genere *Brenthi* distinguere videtur.

(*Divisio* 12. *Belides*: Rostrum subporrectum. Antennae non clavatae, 11-articulatae. — Collum indistinctum. Scutellum manifestum. Abdomen segmentis quinque subaequalibus instructum. Corpus minus durum, angustum, naviculare.)

Genus 29. *Belus* nob. — *Lixus* Fabr., Oliv. —

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues, extrorsum paullo crassiores; articulis distantibus, ultimo acuto.

Rostrum subtenue, cylindricum, paullulum arcuatum.

Oculi sub-rotundati, magni, prominuli.

Scutellum breve, transversum.

Elytra longissima, sublinearia, apice acuminata, recurvata.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* rectae, subarcuatae, mediocres, in medio rostri insertae, capite simul cum thorace fere longiores, subtenues, articulis 11, omnibus remotis: 1^o longiusculo, subclavato, oculos non attingente, 2^o brevissimo, subrotundato, 3^o et 4^o longioribus obconicis, 5-10 brevioribus, sensim crassioribus, ultimo longiore, subovato, acuminato. — *Caput* postice elongatum. — *Rostrum* subporrectum, cylindricum, subtenue, parum arcuatum. — *Oculi* laterales, sub-rotundati, magni, maxime prominuli. — *Thorax* parvus, latitudine longior, antice angustior, truncatus, postice bisinuatus, lobo scutellari paullulum producto, lateribus vix rotundatus, supra convexus, dorso postice longitrorsum impresso. — *Scutellum*

breve, transversum. — *Elytra* longissima, sublinearia, semicylindrica, antice singulatim angulato-producta, thoracis basin fere obtegentia; versus apicem angustata, acuminata, recurvata, supra convexa, dorsi disco longitudinaliter impressa. — *Pedes* mediocres; femoribus incrassatis; tibiis teretibus, rectis, apice truncatis, sub-muticis; tarsi tibiis paullo breviores, subtus spongiosi, articulo 1^o oblongo, subobconico, 2^o subtrigono, 3^o paullo latiore, bilobo, ultimo valde elongato, valido, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Lixus semipunctatus* Fabr., Oliv. Hujus generis unam tantum speciem vidi.

A βέλος sagitta, ensis.

Observ. — Statura fere *Lixi*. *A Brentho* et *Cylade* mox dignoscitur *Belus* thorace minus elongato, nec remoto, nec postice constricto l. bi-partito.

Sectio 2^{da}. Antennae articulis 9, 10.

(*Divisio 13^a. Cylades*: Rostrum porrectum. Antennae clavatae, 10-articulatae; clava longissima, linearis, uni-articulata.)

Genus 30. *Cylas* Latr., Oliv., Germ., Billb. — *Brenthus* Fabr., Herbst.

Character generis: — Antennae pone medium rostri insertae; articulo ultimo longissimo, clavam maxime elongatam linearem formante.

Rostrum subporrectum, teres, validum.

Caput postice elongatum.

Oculi approximati, globosi magni.

Elytra oblongo-ovata, fornicata.

Pedes longiusculi, subtenues.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, convexum, alatum. — *Antennae* porrectae, validae, pone medium rostri insertae; capite una cum thorace fere longiores, 10-articulatae: 9 intimis brevissimis, transversis, coarctatis, ultimo

longissimo, piloso, clavam lineari - elongatam, cylindricam praecedentibus simul sumtis duplo longiorem formante. — *Rostrum* subporrectum, teres, vix longitudine thoracis, validum, parum arcuatum. — *Caput* postice elongatum, conico-cylindricum. — *Oculi* approximati, globosi, prominuli, magni. — *Thorax* elongatus, pone medium profunde contractus, binodosus, nodo antico multo majore, ovato, valde convexo, postico parvo, subcylindrico. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* oblongo-ovata, fornicata, antice thoracis basi duplo latiora et illo duplo longiora, apice rotundata, anum occultantia; humeris oblique angulatis, callo elevato. — *Abdomen* ovatum, segmentis duobus basalibus latis, sub-inflatis, 3 et 4 brevissimis, transversis, planis, ultimo semi-circulari. — *Pedes* longi, subtenuis; femoribus versus apicem valde clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice muticis; tarsis elongatis, sub-angustatis, articulo penultimo bilobis, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Cylas formicarius* Oliv.

An ab *κῆλα* cavitas oculorum, quae palpebris subest?

Observ. (*Cyl. formicar.* Oliv.? — Species sub hoc nomine in Museis occurrens, elytra coerulescentia gerit, sed verus *Cyl. formicarius*, secundum descriptiones auctorum, elytra obscure castanea habet, quare diversam credo. *Maris* antennae clava ovali, obtusa, *feminae* clava elongata, cylindrica — Germ.)

(*Divisio* 14^a. *Ulocerides*: *Rostrum* porrectum, sub-subulatum. *Antennae* breves, crassae, 9-articulatae; clava parva, subsolida. *Corpus* subcylindricum, angustum.)

Genus 31. *Ulocerus* nob. — Dalm. — *Brenthus* Dej.

Character generis: — *Antennae* breves, crassae, deformes, squamatae, clava parva, subsolida.

Rostrum breve, porrectum, sub-subulatum.

Caput ante et pone oculos elongatum.

Thorax elongatus, subcylindricus.

Elytra longissima, linearia.

Descriptio: — *Corpus* valde elongatum, subcylindricum, squamatum, alatum; statura generis Brenthi. — *Antennae* longitudine capitis una cum rostro, versus apicem rostri insertae, rectae, crassae, squamatae, interdum etiam deformes; articulis saepe dilatatis, irregularibus: articulo 1^o subobconico, 2^o brevi, transverso, 3^o duplo longiore, 4 - 8 brevibus; clava minuta, ovata, subsolida. — *Caput* porrectum, valde elongatum, subcylindricum. — *Rostrum* porrectum, aut obtuse subulatum, teres aut cylindricum. — *Oculi* minuti, laterales, rotundati, sub-prominuli. — *Thorax* longus, subcylindricus, antice angustior, truncatus, et intra apicem constrictus, postice profunde sinuatus, angulis productis, rotundatis. — *Scutellum* haud distinctum. — *Elytra* longissima, linearia, cylindrica, versus apicem supra tuberculata, ipsa apice subtruncata, erosa, angulis productis, squamosis. — *Pedes* elongati, validi; femoribus muticis, subclavatis, interdum sub-linearibus; tibiis saepe compressis, apice muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo cordato, bilobo, unguibus validis.

Typus: — *Ulocerus lacerosus* Dalm. — congenerici: *Uloc. immundus* et *squalidus* Dalm.

Ab οὔλος crispus, κέρας cornu.

Observ. — Genus quoad habitum Brentho simillimum, sed antennae tantum 9-articulatae, quorum ultimus claviculari inarticulatam constituere videtur; indumentum Uloceri omnino alienum. —

(*Divisio* 15^a. *Oxyrhynchides*:*) *Rostrum* elongatum, deflexum, filiforme. *Antennae* brevès, porrectae,

*) *Oxyrhynchum* potius forsitan ex ratione linguae Graecae, duas in syllabas ϕ connectendum non nolui; at vero, cum vulgo uno tantum ϕ connexi sint *Brachyrhynchus*, *Pachyrhynchus*, *Otiiorhynchus*, *Cryptorhynchus*, hanc redupplicationem, ne confusionis cujusdam causa esset, omisi.

validae, articulis 7 ante clavam; clava subsolida, apice spongiosa, forte articulos indistinctos includens. Tarsi latiusculi, spongiosi. Corpus oblongum, durum.)

Genus 32. *Oxyrhynchus* nob. — Calandra Fabr.

Character generis: — Antennae porrectae, breviusculae, validae; articulis 1 - 7 breviter - obconicis, subaequalibus, 8o et 9o clavam formantibus; articulo basali magno, oblongo, scyphiformi, ultimo minuto, spongioso, retractili.

Rostrum elongatum, subfiliforme, arcuatum.

Oculi laterales, sub capite fere connexi.

Thorax oblongo-ovatus, basi bisinuatus.

Scutellum elongatum.

Elytra oblongo-ovata, convexa, versus apicem callosa.

Descriptio: — Corpus elongatum, subcylindricum, durum, alatum. — *Antennae* porrectae, longitudine rostri, validae, extrorsum perparum crassiores, ad apicem capitis juxta rostri basin insertae; 9 - articulatae, setulis brevibus adspersae; articulis plurimis subnodiformibus, apice obtusatis, 1o 3tioque longioribus, obconicis; clava minuta, biarticulata, articulo 1o rigido, oblongo-subcylindrico l. scyphiformi, 2o minuo, spongioso, obtuso, retractili. — *Rostrum* longitudine thoracis una cum capitis, ante antennarum insertionem crassius, deinde cylindricum, subfiliforme, arcuatum, deflexum. — *Oculi* laterales, magni sub capite fere conniventes, subdepressi. — *Thorax* oblongus, anterieus angustior, subcoarctatus, lateribus paullo rotundatus, antice truncatus, lobis ocularibus exiguis, postice bi-sinuatus, supra parum convexus, subtus integer. — *Scutellum* oblongo subovatum. — *Elytra* elongata, thorace fere latiora et illo triplo longiora, convexa, sublinearia, versus apicem callosa, ipso apice rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* graciles, antice reliquis longiores, validi, basi approximati; femoribus subcylindricis; tibiae teretes, ad apicem inflexae, interno unco valido, horizontali, corneo, armatae; tarsis subtus spongiosis; arti-

culo penultimo latiori, bilobo, ultimo valido, biunguiculato, unguibus brevibus, gracilibus.

Typus: — *Calandra discors* Fabr. — unica species mihi visa.

Ab ὀρθόκερος acutum habens rostrum.

Observ. — Hocce genus generi *Sipali* maxime affine; antennae vero non fractae, scutellum elongatum, tarsi latiores et subtus spongiosi.

(*Divisio* 16a. *Brachycerides*: Rostrum breve, crassum, plerumque deflexum, in paucis porrectum. Antennae breves, validae, articulis 7 l. 8 ante clavam; clava parva, subsolida, apice spongiosa, forte articulos indistinctos includens. Tarsi angustati, setosi, haud spongiosi. Corpus breviter ovatum, durum, apterum.)

Genus 33. *Episus* Billb. — *Brachycerus* Fabr., Oliv., Thunb., Herbst.

Character generis: — Antennae porrectae, breves, rigidae, in apice rostri insertae; articulis 8 et 9 clavam minutam, angustam formantibus.

Rostrum porrectum, breviusculum.

Oculi parvi, subdepressi.

Thorax elongatus, sublinearis.

Elytra elongato-subquadrata, apice retusa.

Descriptio: — *Corpus* exasperatum, elongatum, postice obtusatum, antrorsum sensim angustatum, apterum. — *Antennae* apici rostri insertae, porrectae, breves, lineares, crassiusculae, hirtae, capite haud longiores; articulis novem tantum conspicuis: 1^o subturbinato, ad basin nudo, coarctato, 2^o et 3^o brevissime sub-obconicis, 4 - 7 multo brevioribus, transversis, sub-perfoliatis; clava minuta, angusta, articulo basali cylindrico, rigido, ultimo arcte connexo, brevissime turbinato, sub-spongioso. — *Rostrum* porrectum, capite paullo longius, crassum, supra deplanatum, apice vix incrassatum, profunde et late emarginatum. — *Caput* porrectum,

elongatum, subcylindricum. — *Oculi* laterales, oblongi, longitudinaliter positi, subdepressi, parvi. — *Thorax* elongatus, sublinearis, basi apiceque truncatus, supra inaequalis. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* connata, rigida, maxime inaequalia, antice thoracis basi paullo latiora, posterius paulatim ampliata, sed illo vix triplo longiora, elongato-subquadrata, apice obtusa, retusa, anum occultantia. — *Abdomen* subtus planum. — *Pedes* breves, validi, antichi approximati, postici maxime remoti; femoribus vix incrassatis; tibiis subteretibus, apice muticis; tarsis subcompressis, setosis, haud spongiosis.

Typus: — *Brachyc. rostratus* Fabr., Oliv., Herbst, Thunb.

Huc quoque adnumeratur: *Episus mendosus* nob.

Ab *Entao* aequalis.

Observ. — Hujus generis, quod a Dom. Billberg primo tam prospere constructum, tota forma corporis alia est, ac *Brachyceri*. Rostrum et antennae porrectae, non in canalicula rostrali insertae.

Genus 34. *Brachycerus* Fabr. plurimumque Auctor. — *Curculio* Linn., Dé Geer, Rossi, Drury.

Character generis: — Antennae arcuatae, in medio rostri in canaliculam arcuatam insertae; clava minuta, subsolida, apice obtusa, sub-acuminata.

Rostrum crassum, deflexum, apice valde incrassatum.

Oculi oblongo-ovati, immersi.

Elytra magna, connata, rigida, fornicata.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, crassum, gibbum, saepissime asperum aut variatim rugosum, inaequale, apterum. — *Antennae* arcuatae, crassiusculae, extrorsum sensim paullo crassiores, pone medium rostri insertae, capite haud longiores, setosae; articulis tantum novem conspicuis: basilarum longiore, obconico, 2-8 brevissimis, transversis, contractis, 9o magno clavam ovato-obconicam, externe oblique truncatam, subacuminatam formante, (articulos 10o et 11o forsitan includente?). — *Rostrum* breve, valde crassum, de-

flexum, arcuatum, extrorsum valde incrassatum, supra saepius deplanatum, plerumque inaequale; scrobe versus apicem rostri incipiente, profunda, arcuata, ad basin inferam rostri flexa. — *Oculi* laterales, perpendiculares, oblongo-ovati, immersi. — *Thorax* transversus, basi truncatus, apice in medio productus, pone oculos saepius lobatus, in aliis dorso canaliculatus, aut exsculptus, lateribus in spinam angulumve dilatatus, in aliis muticus, lateribus rotundatus, supra modice convexus, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* connata, rigida, fornicata, magna, subgloboso-ovata, in nonnullis ovato-subquadrata, subtus usque ad pedum initium inflexa. — *Pedes* robusti; femoribus vix incrassatis; tibiae angulis duobus apicalibus productae; tarsis validis, compressis, haud spongiosis, articulo ultimo elongato, sublineari, valido, infra saepius concavo, biunguiculato.

Typus: — *Brachycerus obesus* Auctor. et plures aliae, ad hoc genus pertinentes, jam ante cognitae species.

Α βραχὺς brevis, *κέφας* cornu.

Ordo 2^s. GONATOCERI.

Antennae geniculatae; scapus (articulus basilaris) valde elongatus, saepius in canalicula ad latera rostri insertus. Antennae in omnibus clavatae; articuli clavae saepissime arcte connexi.

Legio 1^a. *Brachyrhynchi*. (Curculiones Fabr.) Rostrum plus minusve crassum et deforme, breviusculum, parum arcuatum. Antennae prope apicem rostri saepe juxta sinum oris insertae, 12-articulatae.

Phalanx 1^a. Canalicula antennalis seu scrobe infra-ocularis, curvata l. obliqua.

(*Divisio* 1^a. *Entimides*: Rostrum breviusculum, deflexum, teretiusculum, crassissimum, extrorsum valde incrassatum.)

Subdivisio 1a. Corpus brevius, alatum. Humeri angulati, prominuli. Thorax semper pone oculos lobatus.

Genus 35. *Rhigus* Dalm., Germ. — *Curculio* Pallas, Herbst.

Character generis: — Antennae mediocres, parum fractae; articulis funiculi sub-obconicis; clava oblongo-ovalis.

Rostrum breve, valde incrassatum, apice profunde emarginatum, scrobs quam maxime curvata.

Oculi ovati, subdepressi.

Thorax elytris dimidio angustior, subcylindricus.

Elytra ampla; humeri elevato-angulati, prominuli.

Tibiae anticae saepius intus curvatae, apice dente valido acuto armatae.

Descriptio: — Corpus suboblongo-ovatum, crassum, durum, majoris magnitudinis, alatum. — *Antennae* thoracis medio vix longiores, pone medium rostri insertae, subtenues, subfractae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos attingente, 2-8 fere aequalibus, subobconicis, apice rotundatis; clava elongata, ovali, subfusiformi, 4-articulata. — *Rostrum* breve, crassum, deflexum, valde incrassatum, apice profunde emarginatum; scrobe subangulata, abrupte subtus flexa. — *Oculi* sublaterales, ovati, subdepressi. — *Thorax* latitudine longior, elytris dimidio angustior, subcylindricus, inaequalis, ad laterum apicem coarctatus, basi bisinuatus, antice in medio late emarginatus, infra pone gulam profunde emarginatus, pone oculos eminenter lobatus. — *Scutellum* breve, subrotundatum, in plerisque subelevatum. — *Elytra* ampla, thorace quadruplo longiora, subovata, convexa, rigida, saepius valde tuberculata, apice breviter mucronata, abdomen obtegentia; humeris valde prominulis, elevato-angulatis. — *Pedes* longiusculi, validi, antici basi approximati; femoribus muticis; in medio incrassatis; tibiae anticae intus curvatae, apice in plerisque unco valido acuto armatae, in aliis subrectae, unco apicali vix perspicuo (estue varietas sexus?),

posteriores rectae, nec apice armatae; tarsi subtus spongiosis, articulo basali subelongato, 2o trigono, penultimo dilatato, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curc. tribuloïdes* Pall. Herbst. Eiusdem generis sunt: *Rhig. Schüppelii* et *atrox* Germ. — *Rhig. horridus*, *aesopus*, *melanozugos*, *aranei-formis* et *tesserulatus* nob.

A *ῥίγος* rigor.

Observ. — Hoc genus Entimo propinquum; oculis vero differt obovatis depressis, atque tibiis anticis intus saepius curvatis, ad apicem intus dente acuto armatis. Antennae in generibus *Rhigus* atque *Polydus* sunt quidem minus distincte fractae, in parte tamen specierum eorum, signa fere perspicua huiusmodi fractionis inter scapum funiculumque videntur. Tum hoc, cum etiam cetera similitudine generis Entimi haec genera primum initium huius ordinis ingredi debere putavi, quo tamquam seriem inter *Orthoceros* et *Gonatoceros* efficiant.

Genus 36. *Polydus* Germ.

Character generis: — Antennae longae, subfractae; articulis funiculi obconicis, subaequalibus; clava valde elongata, angusta.

Rostrum breve, crassum, teretiusculum.

Oculi subrotundati, maxime prominuli.

Thorax elytris multo angustior, subquadratus, antice juxta apicem valde constrictus.

Elytra magna, valde convexa, humeri valde prominuli, angulati.

Descriptio: — *Corpus* breviusculum, crassum, durum, alatum. — *Antennae* thoracis basin longitudine superantes, parum fractae, subtenues, juxta medium rostri insertae; 12-articulatae: articulo 1o elongato, clavato, oculos attingente; 2-8 obconicis, subaequalibus, exterioribus sensim paullo brevioribus; clava 4-articulata, elongata, angusta, subcylindrica, apice sub-acuminata, articulis arcte junctis, ultimo aegre discernendo. — *Caput* breve; latum, convexum,

puncto frontali profunde impresso. — *Rostrum* longitudine capitis, subhorizontale, crassiusculum, teretiusculum, apice minus incrassatum, maxime emarginatum, pilis longis, rigidis, ciliatum; scrobe subangulata, lineari, basi rostri pone oculos desinente. — *Oculi* subrotundati, maxime prominuli. — *Thorax* longitudine latior, elytris dimidio angustior, subquadratus, antice juxta apicem valde constrictus, angulis deinde rotundatis, sub - prominulis; basi bisinuatus, supra medio-criter convexus, infra pone gulam late, non vero profunde emarginatus, lobis pone oculos exiguis, subangulatis, non rotundatis. — *Scutellum* triangulatum, acuminatum, depressum. — *Elytra* magna, thoracis basi duplo latiora, subtriangularia, valde convexa, basi singulatim obtuse rotundata, margine laterali in medio sinuato, apice acuminata, abdomen obtegentia; humeris valde prominulis, angulatis, elevatis, subacuminatis. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus muticis, in medio paullo incrassatis; tibiis teretibus, rectis, apice non uncinatis; tarsis subtus spongiosis, dilatatis, articulo ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Polydus Stevenii* nob. e Brasilia. Una tantum species mihi cognita.

Α πολὺ-διός generosus, divus.

Observ. — Cum Entimo in multis hoc genus convenit, sed antennis longioribus et clava elongata, subcylindrica, rostro thoraceque supra non canaliculatis praecipue differt.

Genus 87. *Entimus* Germ., Dejean, Billb. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae mediocres, funiculo 7-articulato, articuli primi insequentibus paullo longiores, subobconici; clava elongata, sub-conica.

Rostrum breve, crassum, angulatum, apice incrassatum.

Oculi subrotundati, aliquantulum prominuli.

Thorax oblongus, elytris multo angustior, supra canaliculatus.

Elytra ampla, subtriangularia; humeri acutangulati, prominuli.

Tibiae subcylindricae, rectae, apice muticae.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, crassum, postice attenuatum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis thoracisque, versus apicem rostri insertae, fractae, subtenues, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculos subattingente, 2^o et 3^o interdum etiam 4^o longiusculis, subobconicis, 4-8 brevibus, apice truncatis, subturbatis, sensim extrorsum paullo crassioribus; clava elongata, subconica, 4-articulata. — *Rostrum* breve, crassum, angulatum, deflexum, supra in medio canaliculatum, apice valde incrassatum, late et profunde emarginatum, pilis rigidis ciliatum, canalicula dimidiata ab oculis ad medium rostri ducta, utrinque profunde exaratum; scrobe valde curvata, basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, nonnihil prominuli, minuti. — *Thorax* latitudine longior, elytris multo angustior, subcylindricus, anterieus subangustior et ad latera apicis nonnihil coarctatus, basi leviter bisinuatus, pone oculos prolixe lobatus, supra convexus, in medio canaliculatus, subtus juxta gulam emarginatus. — *Scutellum* subelongatum, apice rotundatum. — *Elytra* magna, subtriangularia, convexa, versus apicem paullatim declivia, apice ipso interdum spinulosa, anum occultantia; humeris valde prominulis, elevatis, acut-angulatis. — *Pedes* longiusculi, robusti, antici approximati; femoribus muticis, in medio paullo incrassatis; tibiis teretibus, rectis, apice muticis; tarsis latiusculis, ciliatis, subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore bilobo, ultimo clavato, biunguiculato. (Nonne pedes in uno sexu pilosi, in altero hirsuti?)

Typus: — *Curc. Imperialis* Fabr. — Species mihi accuratius cognitae et huc pertinentes: *Curc. splendidus* Fabr. — *nobilis* Oliv. — *granulatus* Linn. *l. sumptuosus* Fabr.

Ab *έντιμος* spectabilis.

Observ. — Genus habitu satis distinctum, species amplectens maximas et splendidissimas.

Subdivisio 2a. Corpus oblongum, apterum; humeri subrotundati.

Genus 38. *Hipporhinus* Billb. — *Bronchus* Germ. Dejean. — *Curculio* Auct. reliquorum.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, tenues; funiculo 7-articulato, articuli duo basales insequentibus paullo longiores, subobconici, clava ovalis.

Rostrum subelongatum, apice crassius.

Oculi ovati, depressi.

Thorax lateribus aut rotundatus, aut utrinque spinosus, supra modice convexus, tuberculatus, pone oculos lobatus.

Elytra oblongo-ovata, coadunata, rigida, scabra.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, scabrosum, saepius tuberculatum l. spinosum, obscurum, apterum. — *Antennae* ad thoracis basin pertingentes, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, parce setosae, 12-articulatae: articulo 1o elongato, clavato, oculos vix attingente, 2 et 3 longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus apice rotundatis; clava parva, oblongo-ovali, 4-articulata. — *Rostrum* thorace paullo longius, crassum, supra planiusculum, in medio sulcatum l. carinatum, subarcuatum, deflexum, apice subtruncatum, erosum, valde incrassatum, ad basin interdum constrictum, quasi abscissum; scrobe ad apicem incipiente, profunda, parum curvata, in basin rostri subtus exeunte. — *Oculi* laterales, ovati, depressi. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, lateribus in plerisque rotundatus, in aliis utrinque spinosus, supra mediocriter convexus, tuberculis plurimis obtusis adpersus, in medio canaliculatus, antice late emarginatus, postice truncatus, subtus juxta gulam emarginatus, pone oculos lobatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* coadunata, oblongo-ovata, thorace quadruplo longiora, rigida, saepius tuberculata, spinosa l. exsculpta, apice saepe acuminata, subreflexa, interdum rotundata, abdomine haud breviora; humeris subrotundatis. — *Pedes* longiusculi, subaequales, validi; femoribus muticis, clavatis; tibiis teretibus, anticis paullo arcuatis, intus angulato-dentatis, posticis rectis, submuticis (NB. in *Broncho verrucoso* in

uno sexu tibiae postice intus valde curvatae). — Tarsorum spongiae distinctae, ciliatae, articulo ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. Rostrum ad basin non abscissum.

Typus: — *Curc. pillularius* Fabr., Oliv.

Species huc pertinentes: *Curc. spectrum* Fabr. — *nubilosus* Billb. — *globifer* Fabr. — *globulifer* nob. — *nodulosus* Fabr. — *tribulus* Fabr. — *spinifer* Sparrm. — *seriespinosus* Billb. — *6-vittatus* et *rubifer* Fabr. — *notonchus* Wiedem. — *albovittis*, *mamillatus*, *misumenus*, *infacetus* et *turpis* nob.

Stirps 2a. Rostrum ad basin quasi abscissum.

Huc adnumerantur: *Curc. verrucosus* Fabr. — *Capensis* Fabr. — *Hottentottus* nob. — *Caffer* Thunb. Act. Ups. — *rugulosus* et *crispatus* Billb. — *gradulosus* Wiedem.

Ab *Ἰππός* equus, *ὄλν* nasus.

Genus 39. *Epirrhynchus* nob. — *Curculio* Sparrm.

Character generis: — Antennae breves; funiculo crassiusculo, articulo basali, obconico, 2-6 brevissimis, perfoliatis, coarctatis, 7o latiore clavam incipiente; clava subovata.

Rostrum subelongatum, curvatum, crassum, sulcatum.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax transversus, subquadratus, supra modice convexus, juxta oculos lobatus.

Scutellum minutum, apice bifidum.

Elytra oblongo-ovata, inaequalia, apice singulatim obtusae subacuminata, supra convexa.

Unguiculo tarsorum uni-unguiculato.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, inaequale, apterum. — *Antennae* ad thoracis medium non pertingentes, versus apicem rostri insertae, fractae, crassiusculae, 12-articulatae: articulo 1o clavato, oculos non attingente, valido, 2 obconico, 3-7 brevibus, transversis, perfoliatis, coarcta-

tis, gradatim paullo latioribus, 8o multo latiore, clavae adnEXO; clava subovata, acuminata, 4-articulata: articulis arcte conjunctis. — *Rostrum* subelongatum, curvatum, crassum, supra sulcatum, versus apicem incrassatum, apice in medio subemarginatum; scrobe profunda, curvata, in basi rostri subtus conjuncta. — *Oculi* laterales, oblongi, immersi. — *Thorax* longitudine fere latior, subquadratus, antice late et profunde emarginatus, postice truncatus, lateribus subrectis, versus apicem jam mox angustior, subcoarctatus, pone oculos valde lobatus, supra perparum convexus. — *Scutellum* minutum, apice bifidum. — *Elytra* oblongo-ovata, antice thoracis basi paullo latiora, versus medium ampliata, thorace quadruplo longiora, apice ipso singulatim obtuse sub-acuminata, subreflexa, supra convexa, praesertim in medio. — *Pedes* validi, antici approximati; femoribus muticis, vix incrassatis; tibiis teretibus, rectis, apice truncatis, anterioribus unco horizontali, minuto intus instructis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo bilobo, ultimo clavato, crasso, uni-unguiculato.

Typus: — CURC. Argus Sparrm. Act. Holm. unam solummodo speciem vidi.

Ab *ἐπιπύγχις* curvitas rostri in avibus rapacibus.

Observ. — Antennae crassiusculae, breves, quarum funiculus articulis perfoliatis constat et unguiculo tarserum uni-unguiculato, hoc genus ab Hipporrhino distinguunt, cui praeterea aliquantisper simile est.

Genus 40. *Prypnus* nob.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; scapus oculos longitudine superans, tenuis, subclavatus; articulis funiculi obconicis; clava elongata, ovalis.

Rostrum breviusculum, crassum, subteres, supra sulcatum; scrobs infraocularis, flexuosa.

Oculi subrotundati, paullo prominuli.

Thorax oblongus, basi apiceque truncatus, lateribus modice rotundatus.

Elytra elongato-ovata, supra convexa, praesertim posterius, humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, obscurum, apterum. — *Antennae* capite thoraceque longiores, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1o supra oculos sese extendente tenui, subclavato, 2 et 3 longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava elongata, angustata, ovali, distincte 4-articulata. — *Rostrum* capite longius, crassum, subdeflexum, supra sulcatum, versus apicem nonnihil incrassatum, subtruncatum; scrobe flexuosa, lineari, non profunda, pone canthum inferum oculorum exeunte. — *Oculi* laterales, aut subrotundati, aut ovati, aliquantulum prominuli. — *Thorax* latitudine longior, antice posticeque truncatus, anterieus perparum angustior, lateribus in medio aequaliter rotundatus, supra parum convexus, in medio leviter canaliculatus, juxta oculos non lobatus, subtus integer. — *Scutellum* parvum, triangulatum. — *Elytra* coadunata, elongato-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo quadruplo longiora, basi introrsum conjunctim leviter emarginata, supra parum convexa, posterius declivia, apice aut singulatim obtuse acuminata, aut rotundata; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longi, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anticis intus crenulatis, ad apicem incurvis, unco inflexo, minuto armatis, posterioribus rectis, muticis; tarsis subtus spongiosis, ciliatis, articulo ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Prypna* 5-nodosus nob. e Nov. Hollandia: congenericus: *Curc. porculus* Sparrm. Act. Holm.

A *πρυνος* tristis, odiosus.

Observ. — Quaedam est similitudo *Hipporhini*, sed antennae longiores et magis tenues, thorax pone oculos non lobatus, scutellum parvum, sed distinctum.

(*Divisio* 2a. **Pachyrhynchides**: Rostrum brevissimum, crassum, deflexum, saepius angulatum, apice vix incrassatum. Humeri non angulati. Corpus apterum.)

Cohors 1a. Thorax pone oculos lobis productis.

Genus 41. *Cherrus* Dalm. — *Psapharus* nob. olim. —
Curculio Oliv.

Character generis: — Antennae longiusculae, sub-
 tenues; scapus capite longior, sublinearis, articulis funiculi
 sub-obconicis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum breve, crassum, subangulatum, sulcatum.

Oculi subovati, depressi.

Thorax transversus, subpulvinatus.

Elytra subovata, juxta basin coarctata.

Descriptio: — *Corpus* breve, crassum, rigidum,
 scabrosum, obscurum, apterum. — *Antennae* thoracis basin
 attingentes, pone medium rostri insertae, fractae, subtenues,
 12-articulatae: articulo 1o capite longiore, sublineari, extror-
 sum sensim perparum incrassato, 2 et 3 longiusculis, 4-8
 brevibus, omnibus aut subclavatis, aut subobconicis; clava
 elongata, angustata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum*
 breve, crassum, subangulatum, canaliculatum; linea elevata,
 glabra, apice lata et in medio canalis sita, apice ipso trunca-
 tum, emarginatum; scrobe curvata in apice incipiente, ex-
 trorsum lata, in oculos protensa. — *Oculi* laterales, sub-
 ovati, depressi. — *Thorax* longitudine latior, basi truncatus,
 antice late subemarginatus, pone oculos lobatus, anterieus
 angustior, lateribus rotundatus, supra mediocriter convexus,
 subpulvinatus, granulatus, subtus pone gulam late emargina-
 tus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ovata, rigida, thorace
 duplo longiora vel magis, supra convexa, antice latitudine
 baseos thoracis, eique prope adaequata, mox vero juxta basin
 transversim constricta et coarctata, dein latiora, apice decli-
 via, attenuata, rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* an-
 tici reliquis longiores atque robustiores; femoribus clavatis,
 muticis; tibiis teretibus, anticis versus apicem curvatis, intus
 spinulosis, apice uno horizontali intus instructis; tarsis subtus
 spongiosis, latiusculis, articulo penultimo bilobo, ultimo cla-
 vato, biungiculato.

Typus: — *Curc. infaustus?* Oliv. — congenerici:
Curc. plebejus Oliv. — *Cherrus opatrinus* nob. e
 nov. Hollandia.

A χεῖρῶν asper, incultus.

Observ. — Antennae longiusculae, scapus sublinearis capite longior, rostrum canaliculatum, lineaque elevata, glabra, apicē lata et in medio canalis posita, thorax pulvinatus hoc genus cum a Pachyrhyncho, tam a Deracantho distinguunt.

Genus 42. *Deracanthus* nob. — *Carenlio* Fabr., Oliv., Pallas.

Character generis: — Antennae breves, validae; articulo funiculi basali oblongo, reliquis brevibus, transversis, subcarctatis, crassitudine crescentibus; clava ovata, articulis arctissime connexis.

Rostrum breve, crassum, angulatum, supra subplanum, inaequale.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax transversus, utrinque spinosus.

Elytra breviter ovata; humeri rotundati.

Tarsi elongati, angustati, setosi.

Descriptio: — *Corpus* breve, subovatum, apterum. — *Antennae* ad thoracis medium non perlingentes, pone medium rostri insertae, fractae, validiusculae, parce rigide-pilosae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos non attingente, 2^o crassiusculo, basi tenui, subobconico, 3-7 brevibus, transversis, aequalibus, subcoarctatis, 3^o crassiori, clavae arcte adnexo, basin mentiente; clava ovata, 4-articulata, articulis aegre discernendis. — *Rostrum* breve, vix capite longius, crassum, angulatum, apicē subtruncatum, supra subplanum, canaliculatum; scrobs angusta, arcuata, in medio rostri subtus evanescente. — *Oculi* laterales, oblongi, depressi. — *Thorax* longitudine latior, basi truncatus, apicē late emarginatus, lobis ocularibus exstantibus, lateribus spina valida armatus, supra parum convexus, subtus pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* triangulare, distinctum. — *Elytra* breviter ovata, antice thoracis basi haud latiora, illo vero quadruplo longiora, angulis humeralibus atque lateribus usque ad apicem rotundata, medio latiora, supra mediocriter

convexa, praesertim posterius, apice subrotundata, anum occultantia. — *Pedae* breves, validi; femoribus muticis, clavatis; tibiis teretibus, extus carinatis, subrectis, anterioribus versus apicem extus dentatis, intus unco minuto, acuto armatis; tarsi tibiis paullo breviores, angustati, setosi, spinosi, subtus haud spongiosi, articulis duobus basalibus longiusculis, subobconicis, penultimo brevi, non bilobo, ultimo clavato, binnguiculato.

Typus. — *Curc. spinifex* Fabr., l. *Curc. indeniensis* Pall., Oliv. — nec plures species vidi.

A *δέλη* collum, *ἀκάρθα* spina.

Observ. — Antennae breves, rostrum angulatum, supra subplanum, inaequale, thorax transversus, utrinque spinosus, scutellum distinctum et tarsi angustati, haud spongiosi, sunt, quae praecipue hoc genus a *Cherro* et *Thylacito* distinguunt.

Cohors 2a. Thorax juxta oculos non lobatus.

Genus 43. Pachyrhynchus Germ. — *Somatodes* olim. nob.

Character generis: — Antennae breves, validae; articulis duobus basalibus funiculi breviusculis, obconicis, reliquis brevibus, subrotundatis, gradatim crassitudine crescentibus; clava ovata.

Rostrum breve, crassum, angulatum, supra planum.

Oculi rotundati, subprominuli.

Thorax oblongus, convexus, lateribus rotundatus.

Elytra connata, ovato-globosa, valde convexa.

Descriptio. — *Corpus* ovatum, durum, crassum, apterum. — *Antennae* thoracis medium longitudine non superantes, pone medium rostri insertae, validae, 12-articulatae: articulo 1o longo, clavato, oculos attingente, 2o et 3o breviusculis, obconicis, 4 - 8 brevibus, subrotundatis, apice truncatis, exterioribus sensim crassioribus; clava breviter ovata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum*

longitudine capitis et illo paullo angustius, crassum, angulatum, nonnihil incrassatum, supra planum, in medio impressum, apice ipso subtruncatum, in medio paullo emarginatum; scrobe profunda, arcuata, versus apicem incipiente, jam mox subtus flexa, in basin rostri pone gulam exeunte. — *Caput* exsertum, convexum. — *Oculi* laterales, magni, rotundati, prominuli. — *Thorax* oblongus, antice posticeque truncatus; lateribus aequaliter rotundatus, supra modice convexus, margine postico elevato. — *Scutellum* minutissimum, trigonum. — *Elytra* ampla, connata, ovato-globosa, antice thoracis basi vix latiora, in medio autem valde ampliata, thorace vix triplo longiora, supra valde convexa, apice ipso sub-obtusacuminata, anum occultantia. — *Pedes* longiusculi, robusti; femoribus clavatis, muticis; tibiis subcompressis, apice intus angulatis, unco minuto, valido armatis; tarsis subtus spongiosis, articulis duobus basalibus trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Pachyrhynchus moniliferus* Germ. — unicam speciem conspexi.

A *παχὺς* crassus, *ὀύγχος* rostrum.

Observ. — Corpus ovatum, convexum, durum, crassum, rostrum brevissimum, supra planum, tibiae subcompressae, primo adpectu proprium indicant hoc esse genus et ab aliis distinctum.

Genus 44. *Psolidium* Illig., Germ., Dejean. — *Curculio* Fabr., Oliv. Herbst.

Character generis: — Antennae mediocres, subcrassae, clava ovata.

Rostrum crassum, subangulatum; per incisuram transverso-arcuatam a fronte subdistinctum.

Mandibulae exsertae, arcuatae, apice subacuminatae; sinistra intus versus basin dilatata.

Thorax oblongo-subovatus, basi apiceque truncatus, supra mediocriter convexus.

Elytra ovata, convexa.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, duriusculum, apterum. — *Antennae* thoracis medium vix attingentes, ne medium rostri insertae, crassiusculae, parce rigide pilosae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o clavato, crasso, ulorum marginem superiorem attingente, 2^o longiusculo, 3^o etiam, 3^o paullo minore, obconicis, 4-8 brevibus biperfoliatis, apice truncatis; clava ovata, 4-articulata. — *Rostrum* deflexum, breve, crassum, subangulatum, apice bemarkinatum, ciliatum, per incisuram transversam arcuatum a fronte subdistinctum; mandibulis exsertis, arcuatis, apice subacuminatis; sinistra intus versus basin dilatata; rostre subangulata, profunda, subtus flexa. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine fere major, subovatus, antice posticeque truncatus, supra mediocriter convexus, pone oculos non lobatus, subtus integer. — *Petathorax* magnus, nudus, valde conspicuus. — *Scutellum* minutum: triangulare, depressum. — *Elytra* ovata, latitudine duplo longiora, humeris rotundatis, supra convexa, ab omen obtegentia. — *Pedes* robusti, longitudine subaequales, tibiis approximatis; femoribus clavatis, muticis; tibiis apice latatis, subtruncatis, non uncinatis; tarsis subtus sponiosis, pilosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ungue unguiculato.

Typus: — *Curcul. maxillosus* Fabr. Una solum species mihi cognita.

A *ψαλίδιον* forficula.

Genus 45. *Syzygops* nob.

Character generis: — *Antennae* mediocres, subites; scapus clavatus, oculos longitudine superans; articulis basalibus funiculi longiusculis, obconicis, 1^o crassiusculo, reliquis brevibus, subnodosis; clava oblongo-ovata.

Rostrum breve, crassum, subteres, margine apicali callo, reflexo.

Oculi subrotundati, in medio frontis locati, fere connexi.

Thorax oblongus, lateribus rotundatus, convexus.

Elytra breviter ovata, versus apicem subattenuata.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, subovatum, apterum. — *Antennae* thoracis basin attingentes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12 articolatae: articulo 1o clavato, oculos superante, 2o et 3o longiusculis, obconicis, illo crassiusculo, 4 et 5 brevibus, subovatis, 6-8 multo brevioribus, subrotundatis l. nodosis; clava oblongo-ovata, 4-articulata, crassiuscula. — *Rostrum* deflexum, longitudine capitis, crassum, subteres, margine apicis calloso, reflexo; scrobe statim subtus flexa, in medio rostri subtus connivente. — *Oculi* majusculi, subrotundati, prominuli, in medio frontis fere connexi. — *Thorax* latitudine fere longior, antice posticeque truncatus, lateribus rotundatus, supra mediocriter convexus, subtus integer. — *Scutellum* hand observari potest. — *Elytra* breviter ovata, in medio basi thoracis plus duplo latiora et illo triplo longiora, supra valde convexa, versus apicem subattenuata, apice ipso rotundata, pygidium tegentia. — *Pedes* mediocres, validi, antiqui approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anterioribus intus paullo curvatis, apice submuticis, tarsis subtus evidenter spongiosis, articulo penultimo cordato, bilobo, ciliato, ultimo mediocri, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Syzygops Cyclops* nob. ex Ins. Bourbon, plures hand vidi.

A σύζυγος conjunctus, ὦψ oculus.

Observ. — Situs oculorum valde insolitus praeter alias differentias peculiare esse Genus indicat.

(*Divisio* 3a. *Brachyderides*: Rostrum subhorizontale, latitudine fere capitis eique contiguum, supra saepius planiusculum, raro teretiusculum, in plerisque breve vel brevissimum, in aliis vero magis elongatum.)

Subdivisio 1a. *Corpus* saepius brevius, in paucis ovatum l. oblongo-ovatum, apterum; humeri rotundati l. obtusi, non prominuli.

*) Genus 46. *Thylacites* Germ.; Dejean. *Cycloderes* nob. olim. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae mediocres, validiusculae, rigido-pilosae; articulis funiculi duobus basalibus conicis, reliquis lenticularibus; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, supra planiusculum.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax transversus, suborbiculatus, basi apiceque truncatus.

Elytra oblongo-ovata, convexa.

Pedes simplices, tibiae subrectae.

Descriptio: — Corpus oblongo-ovatum, plerumque losum, apterum. — Antennae ad thoracis basin vix pergentes in apicem rostri insertae, validiusculae, rigide pilosae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos attingente, 2^o et 3^o obconicis, illo longiusculo, 4-8 brevibus, lenticularibus, subaequalibus; clava oblongo-ovata, acuminata, 3-articulata, articulis arcte connexis. — Rostrum capite brevius, subdeflexum, crassum, supra subplanum, nonnunquam angulatum, apice subangustius, vix emarginatum; fronte interdum planiuscula, plerumque convexiuscula; scrobe infraoculari, curvata. — Oculi laterales, rotundati, prominuli. — Thorax latitudine media haud longior, plerumque suborbiculatus, convexus, antice posticeque truncatus, pone oculos non lobatus, subtus integer. — Scutellum vix conspicuum. — Elytra oblongo-ovata, antice thoracis basi latiora et illo quadruplo vel etiam quintuplo longiora, modice convexa, apice rotundata, abdomen obtegentia; humeris rotundatis — Pedes validi, mediocres, intermedii subbreves; femoribus incrassatis, muticis; tibiis teretibus, subrectis, apice latioribus, uncinatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, setosis, articulis duobus basalibus subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Stirps 1ma — Rostrum supra planum, subangulatum; antice planiuscula. Oculi valde prominuli.

Typus: — *Cycloderes cataractus* Sahlb. — consp. Curc. Mus. Hoffm. in litt.

Stirps 2da — Rostrum supra subplanum; frons convexuscula. Oculi modice prominuli.

A *θύλακος* saccus et *ἔδος* facies.

Typus: — Curc. Robiniae Herbst. — congenerici. C. fritillum Fabr. pilosus Fabr. l. licinus Herbst — Thylacit. lapidarius et sabulosus Dej. Catal. Thylac. chalcogrammus, umbrinus et lasius nob.

Observatio: — Discrepantiae quidem inter numerosi huius generis species observantur aliquae, quas tamen pro constituendis propriis generibus non sufficientes judicavi; conatus igitur sum tamquam subgenera proponere species illas, quae notas invicem communes, a reliquis diversas, praebent.

Subgenus A. Cneorhinus nob. Curculio Fabr. Oliv. Herbst. — Thylacites Germ. Dej. — Polydus Megerle, Dej. — Chrysolopus Germ. olim.

Adumbratio: — Antennae breviusculae; articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis in plerisque nodosis, in ceteris brevibus, apice truncatis; clava ovata, acuminata. — Rostrum breve sublatum, supra planum, apice emarginatum; saepius per strigam transverso-impressam a fronte distinctum; frons inter oculos per lineam dimidiatam longitudinaliter impressa. — Oculi aut subrotundati, aut suboblongi, longitudinaliter positi, modice prominuli. — Thorax brevis, transversus, antrorsum paullo angustior, lateribus parum rotundatus, basi apiceque truncatus, supra modice convexus. — Scutellum parvum, triangulare, nonnunquam conspicuum. — Elytra oblongo — l. breviter ovata, supra convexa. — Tibiae subrectae, muticae.

Stirps 1ma. Antennarum articuli 4-8 breviores, nodosi; clava oblongo-ovata.

Typus: Curc. Barcellonicus Herbst. — Species mihi cognitae et huc quoque pertinentes: Cneorh. misargyrides et ludificator nob. — Curc. prodigus Fabr. l. hispanus Herbst. — Curc. 4-lineatus Eschsch.

Stirps 2a. Antennarum articuli 4-8 longiores, subobconici; clava brevior, ovata, acuminata.

Huc pertinent. *Cneorh. pyriformis* et *exosus* nob. ambo e Lusitania.

Stirps 3a. Antennarum articuli 4-8 breviores, nodosi; clava brevior ovata; frons inter oculos linea dimidiata longitudinali non impressa. Oculi parvi, rotundati. Elytra breviter ovata. (olim gen. *Philopeton* nob.)

Typus: — *Curc. geminatus* Auct. — Congenerici: — *Cur. exaratus* Marsh. — *Thylacit. albicans* Dej. et plures aliae.

Α *κλώ* scindo, *ῥίς* nasus.

Observ. — Corpore brevior et thoracis forma diversa hoc subgenus praecipue a genuinis *Thylacitidum* speciebus distinguitur. —

Subgenus B. *Strophosomus* Billb. — *Curculio* Fabr., Gyllenh., Oliv. — *Thylacit.* Germ. Dej. — *Bryssus* Megerle. —

Adumbratio — *Antennae* longiusculae, subtennes; scapo clavato, oculorum marginem superiorem attingente; articulis 1, 2 funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subrotundatis; clava oblongo-ovata, acuminata. *Caput* breve, latum, saepius sulco l. canalicula frontali longitudinaliter impressum. — *Rostrum* breve, latum; basi saepius per strigam transversam a capite distinctum, apice profunde emarginatum. — *Oculi* globosi, valde prominuli. — *Thorax* brevis, transversus, antrorsum angustior, lateribus paullo rotundatus, antice posticeque truncatus, supra convexus. — *Scutellum* vix conspicuum. — *Elytra* magna, ovata, convexa. —

Stirps 1ma. *Thorax* basi truncatus. Elytra ovata juxta basin non constricta.

Typus: *Curc. Coryli* Auctor. — congenerici: *Thylac.* (*Strophos.*) *crucifrons* et *illibatus* nob.

Stirps 2a. *Thorax* basi sub-bisinuatus. Elytra oblongo-ovata, pone basin constricta, margine baseos elevato.

Ad hanc stirpem referuntur. *Strophosom. crucifer* Billb. — *Curc. pilosellus* Gyllenh. — *Curc. limbat* Fabr.

Stirps 3a. Rostrum capiti contiguum, nec per strigam transverso impressam a fronte distinctum, caeterum ut in stripe 1^{ma}.

Huc adnumerantur. *Curc. squamulatus* Gyllenh. — *Curc. lanuginosus* Creutz.

Stirps 4a. Antennae magis tenues, articuli funiculi 3-7 oblongi, subobconici; caeterum ut in stirpe 3a.

Huc pertinent: *Thylacit. (Strophosomus) Porcellus* nob. e Tauria — *Curc. afflatus* Creutz.

Stirps 5a. Antennae dimidii corporis longitudine, graciles, articuli funiculi oblongi, subclavati. Rostrum latum, supra planum, canaliculatum. Tibiae anticae intus crenulae, apice spina horizontali instructae.

Typus: — *Leptocerus roborosus* Germ.

Ab *ετροφη* versura, flexio, *σῶμα* corpus.

Observ. — Stirpes 4^a et 5^a generi *Thylacitis* gennini affines, antennis vero paullo longioribus, subtenuibus, parce pilosis, articulo 3^o longiore, rostro latiori, thorace transverso discrepant. A Subgenere *Cneorhini* quoque differunt: Antennis paullo longioribus, magis tenuibus, rostro latiore, oculis magis prominulis. A subgenere *Sciaphilo* diversi etiam sunt scapo brevior, oculis magis prominulis, rostro latiore.

Subgenus *C. Sciaphilus* nob. — *Curculio* Fabr. Gyllenh., Payk. *Thylacites* Germ. Dej. —

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, subtenues; scapo elongato, clavato, oculos saepius superante; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, obconicis; reliquis sensim brevioribus, subnodosis; clava oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* vix longitudine capitis et illo paullo angustius, supra sub-planum, apice emarginatum. — *Oculi* parvi, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* parvus, saepius transversus, raro suboblongus; supra convexus, lateribus nonnihil rotundatus. — *Elytra* magna, oblongo-ovata, supra convexa, praesertim posterius, apice subacuminata. — *Pedes* longiusculi, subtenues; femoribus valde clavatis, saepius dentatis; tibiis rectis, apice muticis — *Corpus* oblongo-ovatum

Stirps 1a. — Thorax longitudine latior.

Typus: — Curc. muricatus Fabr., Gyllenh. — congenerici: Thylacites smaragdinus Dej. — pumilus nob. l. Omias oblongus Dej.

Stirps 2a. — Thorax latitudine longior — (an hujus generis?)

Typus: — Curc. carinula Oliv. l. Thylacit. asserculatus Germ.

A *σκιά* umbra et *φίλος* amicus.

Observat. — A Subgenere Cneorhini differt: antennis paullo longioribus, magis tenuibus, scapo oculos saepius superante, nec rostro per strigam transversam a fronte distincto, oculis parum prominulis.

Subgenus D. Brachysomus nob.

Adumbratio: — Antennae sublongae, minus tenues, setosae; scapo versus apicem paulatim incrassato, paullo recurvato, oculos superante; articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, subobconicis, illo crassiore, reliquis brevibus, aequalibus apice truncatis; clava ovata. — *Rostrum* brevissimum, supra planum, laeve; scrobe brevi, valde curvata, basi profunda, apice obsoleta. — *Oculi* rotundati, subdepressi.

Thorax parvus, brevis, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus. — *Elytra* ampla, connata, supra valde convexa, subglobosa. — *Corpus* minoris magnitudinis, breviter ovatum, apterum.

Typus: — Curc. hirsutulus Gyllenh. — huc etiam pertinet: Brachyrhynchus setiger Megerle.

A *βραχύς* brevis *σῶμα* corpus.

Observatio: — Ex antennis paullo crassioribus, scrobe minus perspicua, rotundiore forma corporis, colligo, hocce genus a subgenere Scia phili, quocum caeterum valde congruit, esse distinguendum.

Subgenus E. Blosyrus nob. Curc. Oliv.

Adumbratio: — *Antennae* breves, crassiusculae, setosae; scapo clavato, extrorsum valde incrassato, oculorum medium attingente; articulo funiculi basali longiusculo, crasso;

subclavato, 2^o obconico, reliquis brevioribus, subrotundatis; clava ovata, acuminata. — *Rostrum* brevissimum, longitudine capitis et illo non angustius, subtetragonum, crassum, apice emarginatum; per strigam transverso-impressam a fronte distinctum; scrobe infra-oculari, profunda, arcuata. — *Oculi* rotundati, valde prominuli. — *Thorax* transversus, basi apiceque truncatus, lateribus aequaliter rotundatus, modice-convexus. — *Elytra* magna, valde convexa, subglobosa. — *Pedes* breviusculi, validi; femoribus parum incrassatis, muticis.

Typus: *Curculio Oniscus* Oliv. — huc etiam *Thylacit.* (*Blosurus*) *Hystrix* nob.

Α βλοσυρός, adpectu terribilis l. gravis.

Observatio. — Antennae breves, crassiusculae, elytra subglobosa, corpus rigidum hocce subgenus a reliquis praecipue distinguunt.

Subgenus F. *Platycopes*. Dalm. — *Curculio* Sparrm.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae; scapo thoracis marginem anticum tangente, crasso, latere interiore versus apicem valde dilatato, complanato; funiculo subtenui; articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis aequalibus, subrotundatis: clava oblonga; ovali, acuminata. — *Rostrum* breve, ad basin latitudine capitis eique contiguum, versus apicem angustius, late emarginatum, supra planum; per strigam transversam, angulatam, a fronte distinctum, in medio linea longitudinali profunde impressum. — *Oculi* rotundati, valde prominuli. — *Thorax* longitudine duplo latior, antice posticeque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* conata, rotundato-ovata, supra convexa.

Typus: — *Curc. argyrellus* Sparrm. Act. Holm. 1785. Unam tantum speciem conspexi.

Α πλατύς latus, κόπη manubrium, remus.

Observ. — Scapus satis elongatus, latus, interius valde dilatatus, rostrum supra planum, per strigam transversam, angulatam a fronte distinctum, causa nobis fuerunt, cur hoc

subgenus a *Strophosomo*, cui praeterea est simile, distinguamus.

*****) Genus 47. *Herpisticus* Germ.**

Character generis: — Antennae mediocres, minus tennes; scapus oculos attingens: articulis primis funiculi longiusculis; obconicis, reliquis brevibus, subturbinatis, ultimo clavae adpresso; clava oblonga, acuta.

Rostrum breve, crassum, supra planum, canaliculatum; scrobs curvata, percurrents.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax brevis, lateribus antrorsum sensim angustatus, angulis posticis sub-acutis.

Scutellum distinctum, triangulare.

Elytra oblongo-ovalia.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, in feminis paullo latius, apterum. — *Antennae* thoracis medium vix longitudine superantes, versus apicem rostri insertae, minus tennes, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, oculi medium attingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 8^o paullo crassiore, clavae adnexo et illam quasi incipiente; clava oblonga, ovali, angusta, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis ejusque fere latitudine, crassum, parallelepipedum, supra planum, canaliculatum, apice profunde emarginatum; scrobe profunda, curvata, ab apice ad angulum inferum oculi percurrente. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine postica paullo brevior, basi apiceque truncatus, antrorsum angustior; angulis posticis subacutis, supra parum convexus, subtus integer. — *Scutellum* distinctum, obtuse trigonum. — *Elytra* oblongo-ovalia, basi truncata, thorace non latiora, sed illo quadruplo longiora, pone medium latiora, supra convexa, dorso planiuscula, apice obtuse rotundata, pygidium tegentia. — *Pedes* longiusculi, validi, antici longiores; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anticis arcuatis, posticis subrectis, omnibus intus crenulatis, apice interiore unco armatis; posticis extus versus apicem penicillatis; tarsis longiusculis, latis, subtus spongiosis, articulis 1, 2 sub-

trigonis, tertio dilatato, bilobo, ultimo clavato, bininguiculado.

Typus: — *Herpist. laesicollis* Germ. plures species haud vidi.

Α ἕρπω l. ἑρπύζω, serpo, repo.

Observatio: — Quoad habitum generi *Brachyderis* propinquum, diversum vero antennis brevioribus atque crassioribus, canalicula antennali magis deflexa, thorace postice subangulato tibiisque apice uncinatis. —

Genus 48. *Brachyderes* nob. — *Curculio* Fabr., Gyllenh. — *Naupactus* Megerle, Dej. — *Thylacites* Germ., Billb.

Character generis: — Antennae graciles, thorace longiores; scapus ultra oculos extensus; articulus 2^s funiculi plerumque 1^{mo} longior, reliqui breviores, omnes obconici; clava angusta, ovalis.

Rostrum brevissimum, crassum, supra subplanum; scrobs parum curvata, non profunda,

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax brevis, lateribus rotundatus.

Elytra oblonga sub-ovata.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, angustum, laeve, muticum, apterum. — *Antennae* valde elongatae, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o longissimo, clavata, se erigente ultra oculos, 3^o plerumque paullo longiore quam 2^s, 4-8 brevibus, omnibus subobconicis; clava ovali angusta, acuminata, 4-articulata. —

Caput exsertum, subconvexum. — *Rostrum* brevissimum, vix capitè longius, eoque paullo angustius, crassum, subaequale, supra subplanum, interdum in medio late, non vero profunde impressum, apice parum emarginatum; scrobe parum curvata, brevi, non profunda, versus marginem oculi evanescente. — *Oculi* laterales, rotundati, raro suboblongi, prominuli. — *Thorax* brevis, longitudine fere latior, basi apiceque truncatus, antè paullo angustior, lateribus pone medium rotundatus, supra parum convexus, subtus integer. —

Scutellum minutum vel etiam nullum. — *Elytra* thorace sextuplo longiora, oblongo-ovata l. elongata, antice thoracis basi non latiora, pone basin paullatim ampliata, apicem versus denovo angustiora, supra convexa, dorso interdum subplano, anum obtegentia. — *Pedes* longiusculi, validi, subaequales; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis terebibus, subrectis, apice muticis; tarsis latis, subtus spongiosis; articulis 1, 2 subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curc. incanus* Auctorum. — Species, quas cognosco et huc etiam referuntur: *Curc. lusitanicus* Fabr. — *C. gracilis*, equestris et illaesus Schneid. — *Brachyd. opacus* et *leucophaeus* nob.

A βραχὺς brevis, δέρον collum.

Observ. — A genere *Leptoceri*, cui affine, praecipue differt: corpore aptero, scutello vix ullo, humeris semper rotundatis. Scrobs etiam brevis, sed saepius apice obsoleta, parum curvata et ad medium oculi vergens apparet, unde dubium oritur, utrum huic an secundae phalangi hoc genus aptius esset inserendum.

Subgenus *Eusomus*: Germ. — *Eusomatus* Dej.

Adumbratio: — *Antennae* graciles, capite thoraceque longiores; scapo clavato, oculum superante; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, aequalibus, reliquis paullo brevioribus, omnibus subobconicis; clava ovali, angusta. — *Rostrum* breve crassum, subteres; scrobe subtus flexa, obsolete continuata. — *Oculi* rotundati, prominuli. — *Thorax* latitudine medii vix longior, antice posticeque truncatus, lateribus rotundatus. — *Scutellum* ant minutum, triangulare, aut nullum. — *Elytra* ovalia, convexa. — *Pedes* longiusculi; femoribus clavatis, saepius denticulatis; tibiis terebibus, apice muticis; tarsis minus latis, articulis 1^{mo} longiusculis, subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo parum clavato, biunguiculato. — *Corpus* oblongum, dense squamosum, apterum.

Typus: — *Eusom. Ovulum* Illig. Germ. — congenerici: *Brachyd. (Eusom.) piliferus* et *virens* nob.

Αἱ εἰ̄ bene, ἀπτε, σῶμα corpus.

Observatio: — Corpus semper dense squamosum, articulus antennarum tertius haud secundo longior, quaedam formae scrobis diversitas, atque tarsi paullo longiores et angustiores, praecipue mihi videntur hoc subgenus a genere Brachyderis posse distinguere.

Subdivisio. 2a. — Corpus elongatum l. oblongum, plerumque alatum; humeri plus minusve angulati l. prominuli.

Genus 49. *Leptocerus* nob. Germ. (*Ipheus* nob. olim.)
Curculio Fabr., Oliv. — *Thylacites* Dej. —
Naupactus Dej., Meg.

Character generis: — *Antennae* graciles, in plerisque longissimae, in nonnullis mediocres; scapus oculos superans, clavatus; articulus 2^{us} funiculi duplo longior 1^o, reliqui breves, omnes obconici; clava elongata, angusta l. oblongo-ovata.

Rostrum breve, subangulatum, supra planum, in medio canaliculatum; scrobs infra-ocularis curvata.

Oculi rotundati, valde prominuli.

Thorax forma variat: saepissime breviter subconicus, in aliis subrotundatus, in nonnullis pulvinatus.

Elytra aut oblonga aut breviter ovata; humeri plerumque angulati, in nonnullis subrotundati.

Pedes antici elongati, validi; femora saepius magna, valde incrassata; tibiae anticae plerumque intus crenulae, apice valde curvatae.

Descriptio: — Corpus oblongum aut ovatum, saepissime alatum, raro apterum. — *Antennae* in plerisque longissimae, maxime tenues, in nonnullis mediocres, subtenues, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, sese ultra oculos erigente, 2^o brevi, 3^o valde elongato, sequentibus sensim brevioribus, cylindrico-obconicis; clava aut elongata, angusta, aut oblongo ovali,

acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, crassum, sub-horizontale, longitudine capitis, quo paullo angustius, sub-angulatum, supra deplanatum, in medio linea longitudinali profunda, impressa notatum, apice emarginatum; scrobe lineari curvata, pone canthum inferum oculorum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* aut subrotundatus, in nonnullis pulvinatus, aut breviter subconicus, antice truncatus, in plerisque postice plus minusve bi-sinuatus, angulis posticis acutis; in aliis postice vero truncatus, subtus integer; lobis ocularibus caret. — *Scutellum* mediocre, triangulare, in paucis haud distinctum. — *Elytra* partim subovata, antice subtruncata, subelevata, partim oblongo-ovata l. tantum ovata, antice singulatim rotundata, anum occultantia; si prius: humeri obsolete rotundati; si posterius: oblique angulati. — *Pedes* antici elongati, robusti; femoribus muticis, saepius magnis, valde incrassatis; tibiis anticis plerumque intus spinulosis l. crenulatis, apice curvatis, intus unco horizontali armatis; in nonnullis intus muticis, subrectis, apice non uncinatis; tarsis subtus spongiosis, articulo 1^o elongato, 2^o trigono, penultimo latiore, bilobo, unguiculari, valido, biunguiculato.

Stirps 1a. — *Antennae* longissimae, maxime tenues; clava oblongo-ovata. — *Thorax* subrotundatus, pulvinatus, postice truncatus. — *Elytra* subovata, antice saepius subtruncata, subelevata, in nonnullis singulatim subrotundata; humeris vix angulatis, obsolete rotundatis. — *Femora* antica saepius magna, valde incrassata; tibiis anticis intus crenulatis l. spinulosis, apice valde curvatis, uncinatis. — *Corpus* oblongo-ovatum, interdum apterum.

Typus: — *Curcul. longimanus* Fabr., Oliv. — congenerici: *Leptoc. aulacus* et *Sitona durius* Germ. et species quinque indscriptae e Brasilia.

Stirps 2a. — *Antennae* longissimae, maxime tenues; clava angustata, valde elongata. — *Thorax* plerumque antice angustior, lateribus rotundatus, supra convexus; in aliis subrotundatus, pulvinatus, in omnibus postice plus minusve bisinuatus. — *Elytra* oblongo-ovata, antice singulatim rotun-

data; humeris oblique angulatis. — *Femora* antica magna, valde incrassata; tibiis anticis intus crenulatis, l. spinulosis, apice valde curvatis, uncinatis. — *Corpus* plerumque subelongatum, in aliis oblongo-ovatum, alatum.

Typus: — *Curc. rivulosus* Fabr., Oliv. — congener.: *Leptoc. pithecius* et *illotus* Germ. — *Curc. rubiginosus* Fabr. — *Leptoc. polliger*, *institor*, *obliteratus* et *deses* nob.

Stirps 3^a. — *Antennae* longae, thoracis tamen basif parum superantes, maxime tenues; clava angusta, valde elongata. — *Thorax* antice angustior, lateribus rotundatus, supra convexus, postice modice bisinuatus. — *Elytra* ovata, antice singulatim rotundata; humeris oblique angulatis. — *Femora* antica modice incrassata; tibiis anticis subrectis, intus non crenulatis, nec apice uncinatis. — *Corpus* subovatum, alatum.

Typus: — *Leptoc. stauropterus* Germ. — *Naupectus aurichalceus* Dej. et species quinque indeductae e Brasilia.

A λεπτός tenuis, κέρας cornu.

Observ. — Genus hocce *Brachydero* est affine, differt vero, corpore saepius alato et scutellato, pedibus plerumque robustioribus, tibiis anticis saepissime intus spinulosis l. crenulatis, apice curvatis atque uncinatis. — Species huic generi adplicatae, saepe forma et habitu valde dissimiles, in omnibus autem antennae elongatae, graciles, et funiculi articulus secundus, sequentibus duplo longior, structura rostri et oculorum eadem.

Subgenus *Plectrophorus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longae, maxime tenues; scapo longissimo, arcuato, subclavato, thoracem fere attingente; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovali, acuminata. — *Rostrum* breve, capite paullo angustius, supra subplanum, apice late et profunde rotundato-emarginatum; scrobe percurrente, lineari, sensim subtus flexa. — *Frons* latiuscula, convexiuscula; occiput paullo elongatum. — *Oculi* majusculi, suboblongi, valde prominuli. — *Thorax* brevis subcylindricus, versus apicem angustior, basi apiceque truncatus. —

Elytra elongata, sublinearia; humeris obtuse angulatis. —
Tibiae anticae intus crenulatae, intermediae intus versus apicem calcare longo armatae, omnibus apice muticis.

Typus: — *Leptocer.* (Plectroph.) *Lutra* nob. ex America meridionali: — plures species haud vidi.

A πληκτροφόρος calcaria ferens.

Observ. — Quamvis 3ius antennarum articulus secundo haud longior et tibiae pedum intermediarum insolito modo armatae exstent, tamen ob similitudinem habitudinalem totius insecti, ut etiam capitis formam, hoc, ut puto, merito tamquam subgenus sub *Leptocero*, proposui.

*** Genus 50. *Cyphus* nob. Germ. (*Cyrtomon* nob. olim.) *Curculio* Fabr.; Oliv. — *Chlorima* Dejean.

Character generis: — Antennae validiusculae; scapus clavatus, saepius oculos superans; articulus 2^o funiculi 1^{mo} longior, 3 - 7 sensim breviores, omnes obconici; clava oblongo-ovata.

Rostrum breve, crassum, supra planum, in medio linea impressa notatum.

Oculi rotundati, valde prominuli.

Thorax postice bisinuatus, in medio supra saepius deplanatus.

Scutellum minutum, triangulare.

Elytra oblongo-ovata, basi singulatim rotundato-producta, posterius saepius gibba; humeri oblique angulati, subelevati.

Tarsi latiusculi, articulis 1, 2 subtrigonis.

Descriptio: — *Corpus* elongato-ovatum, alatum. — *Antennae* saepe thoracis basin attingentes, in nonnullis paullo brevioribus, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulus 1^o elongatus, clavatus, oculos interdum superans, 3^o 2^o longior, 4 - 8 paulatim breviores, omnes obconici, in paucis subrotundati; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius sed illo etiam paullo angustius, subhorizontale, supra in medio linea longitudinali impressa notatum, apice profunde

emarginatum, ciliatum; scrobe juxta canthum oculi inferum desinente, curvata, laevi. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine longior, antice truncatus, postice modice bisinuatus, anterieus angustior, lateribus non-nihil rotundatus, supra saepius in medio deplanatus, subtus integer. — *Scutellum* minutum, triangulare, immersum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora et illo quintuplo longiora, antice singulatim in medio rotundato producta, supra pone medium saepius gibba, apice aut rotundata, aut in spinam rectam, acuminatam producta, anum occultantia; humeris oblique-angulatis. — *Pedes* validi, antici paullo longiores, basi approximati; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis subcompressis, anticis arcuatis, intus crenulatis, apice, praesertim in altero sexu, unco minutissimo armatis; tarsis subtus distincte spongiosis, latiusculis, ciliatis, articulis duobus basalibus trigonis, subaequalibus, penultimo dilatato, bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Stirps 1a. — Antennae thoracis basin attingentes, articulus tertius secundo fere duplo longior, 4-8 sensim breviores, omnes obconici.

Typus: — *Curc. gibber* Fabr. — congener: *Cyph. argillaceus* et *inhalatus* Germ. — *Curc. Diadema* Fabr. — *Cyphus pudens* nob.

Stirps 2a. — Antennae pone medium thoracis pertinentes, articulo 2o brevissimo, 3o elongato-obconico, 4-8 brevissime-obconicis.

Typus: — *Curc. 16 punctatus* Fabr. — congen.: *Cyph. Varnhageni* Germ. — *Cyph. Germari de Wint-hem*. — *Cyph. figuratus* nob.

Stirps 3a. — Antennae ut in stirpe 2a, sed articulis 4-8 subrotundatis.

Typus: — *Cyphus gloriandus* nob.

Α κυφός curvus, gibbosus.

Observatio: — Generi *Leptoceri* hoc affine, sed corpore crassiore, antennis brevioribus, pedibus anticis parum elongatis, atque tarsorum articulo 1o haud elongato distinguitur.

Subgenus A. *Platyomus* Sahlb. — *Cyphus* Germ.
Curculio Fabr., Oliv., Herbst. — *Chlorima*
 Dejean.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, crassiusculae; scapo elongato, extrorsum sensim valde incrassato; articulus 2^{us} funiculi 1^o longior, 3-7 sensim breviores, omnes subobconici; clava parva, oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* breve, valde crassum, subporrectum, supra longitudinaliter profunde excavatum; scrobe brevi, ante oculos desinente, curvata, profunda, marginibus tumidis. — *Oculi* semi-globasi, parvi, valde prominuli. — *Thorax* subconicus, anteri^{us} paullo angustior, postice profunde bisinuatus. — *Elytra* subovata, antice singulatim rotundato-producta, in plerisque supra gibbosa, apice acuminata; humeris aut spina horizontali extensis, aut obtuse-angulatis, subelevatis.

Stirps 1^a. — Scapus subarcuatus; clava antennarum oblongo-ovata. Scutellum parvum, triangulare.

Typus: — *Cyphus* cultricolis Germ. vel *Platyom.* nodipennis Sahlb. — congen.: *Cyph. piscatorius* Germ. — *Thylacit.* 7-maculatus Dej. — *Cyphus* (*Platyom.*) perlepidus nob.

Stirps 2^a. — Scapus subrectus; clava antennarum elongato-ovata. Scutellum oblongum, antice angustatum, posterius rotundato-ampliatum.

Typus: *Curc. niveus* Fabr., Oliv. — nec plures species vidi.

A πλάτυς latus, ἀμύς humerus.

Observ. — Statura et facie fere simile generis *Cyphi* gennini, forma autem antennarum, rostri aliorumque membrorum diversa.

Subgenus B. *Compsus* nob. — *Cyphus* Germ. —
Curculio Fabr., Oliv., Herbst. — *Chlorima*
 Dejean.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae; scapo oculos superante, crassiusculo, sublineari, basi tamen magis tenni; articulus secundus funiculi basali paullo longior, se-

quentes successive breviores, omnes sub-obconici; clava oblongo-ovali. — *Rostrum* breve, crassiusculum, subporrectum, versus apicem longitudinaliter supra excavatum, apice profunde-triangulariter emarginatum; scrobe brevi, curvata, ante oculos desinente. — *Oculi* subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* subcylindricus, lateribus parum rotundatus, basi leviter bisinuatus, juxta apicem nonnihil constrictus. — *Scutellum* oblongum, antice angustatum, posterius rotundato-ampliatum. — *Elytra* oblongo-ovata, antice singulatim rotundato-producta, thoracis basin sub-obtegentia, dorso subplano, versus apicem saepe gibbosa. — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum. — *Tibiae* omnes apice intus unco horizontali valido armatae.

Stirps 1a. — *Elytra* apice sub-obtusa.

Typus: — *Cyph. acrolithus* Germ. — congener:
Curc. elegans Oliv. — *Curc. clarus* Fabr.

Stirps 2a. — *Elytra* apice acuta, divergentia.

Typus: — *Cyphus* (*Compsus*) *canus* nob.

A *κομψός* *elegans*, *venustus*.

Observatio: — Habitu et statura simile quidem generi *Eustalis*, sed oculi, scrobs atque scapus antennarum aliter constructi.

Subgenus *C. Oxyderces* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae; scapo clavato, sese super oculos extendente; articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, obconicis, 3-7 brevibus, nodosis; clava oblongo-ovata. — *Rostrum* breve, capite paullo angustius, subporrectum, supra in medio valde impressum, canaliculatum, apice profunde emarginatum, ciliatum; scrobe brevi, curvata, ante oculos desinente. — *Oculi* rotundati, valde prominuli. — *Thorax* anteriùs angustior, postice profunde bi-sinuatus, supra in medio planus. — *Scutellum* elongatum, lineare, apice rotundatum. — *Elytra* elongata, antice singulatim rotundato-producta, supra plana, apicibus singulatim valde acuminata et divergentia; humeris oblique angulatis,

subelevatis. — *Tibiae* teretes, anteriores subarcuatae, apice intus unco valido horizontali armatae. — *Corpus* oblongum, alatum.

Typus: — *Curcul. cretaceus* Fabr. nec plures species vidi.

Ab *ὀξυδερχης* acri oculorum acie praeditus.

Observ. — Habitu hoc subgenus hand dissimile *Compso*, antennae vero aliter constructae, scapus clavatus, articuli antennarum 4-8 subrotundati.

Genus 51. *Hadropus* nob.

Character generis: — Antennae breviusculae; scapus oculos attingens; articulo basali funiculi brevi, 2^o longiusculo, 3-7 paullo brevioribus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovalis.

Rostrum planum, in medio canaliculatum; scrobs percurrentes, valde arcuata, subtus flexa.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax subconicus, postice bisinuat.

Elytra convexa, basi singulatim rotundato-producta, posterius gibbosa, apice obtusa.

Tibiae rectae, crassiusculae, apice muticae.

Descriptio: — *Corpus* breviter ovatum, alatum. — *Antennae* thoracis medium attingentes, infra medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, recto, clavato, 2^o breviusculo, 3^o duplo longiore, 4-8 denuo brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovali, apice sub-obtusa, 4-articulata. — *Rostrum* breve, sub-horizontale, crassiusculum, supra planum, in medio impressum, canaliculatum, apice profunde et late rotundato-emarginatum, ciliatum; scrobes profundae, lineares, arcuatae, in medio rostri subtus evanescentes. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, subconicus, antice truncatus; postice bisinuat, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* minutum, triangulare, depressum. — *Elytra* thorace duplo latiora et illo quadruplo longiora, sub-ovata, antice singulatim pro-

ducta, subangulato - rotundata, supra convexa, praesertim posterius, anum occultantia; humeris oblique angulatis. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis rectis, validis, ad apicem latioribus, apice subtruncatis, omnino muticis; tarsis crassis, subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ciliato, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — *Hadrop. nubiculosus* nob. e Brasilia — nec plures species vidi.

Ab ἀδρὸς crassus, ποῦς pes.

Observatio: — Genus vix rite determinatum, sed aliud, cui apte inseri queat, non adest; generi *Cyphi* affine, sed antennae multo breviores, clava illarum brevior, oculi minus prominuli, tibiae rectae, crassiusculae.

Genus 52. *Phaedropus* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv. — *Chlorima* Dej.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; articulo basali funiculi brevi, crassiusculo, 2^o longiusculo, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovalis.

Rostrum breve, crassiusculum, angulatum, in medio late canaliculatum; scrobe valde arcuata.

Oculi majusculi, subrotundati, parum prominuli.

Thorax subcylindricus, postice bisinuatus, pone oculos lobatus.

Elytra oblonga, apice singulatim producto - acuminata; humeri obliqui, angulatim extensi.

Tibiae intus crenulatae, apice unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis una cum thorace, infra medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, clavato, 2^o brevi, crassiusculo, 3^o longiusculo, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo ovali, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius et angustius, modice crassum, subarcuatum, angulatum, supra in medio impressum l. late canaliculatum, apice ciliatum, pro-

funde emarginatum; scrobes valde arcatae, subtus flexae, in basin rostri subtus conniventes. — *Oculi* majusculi, laterales, subrotundati l. potius breviter ovati, parum prominuli. — *Thorax* latitudine longior; subcylindricus, antice late emarginatus, postice leviter bisinuatus, supra convexus, lobis pone oculos obtuse angulatis, productis; subtus late et profunde emarginatus. — *Scutellum* triangulare. — *Elytra* thorace duplo latiora et illo quadruplo longiora, supra, praesertim posterius, convexa, versus apicem sensim attenuata, declivia, apice singulatim producta, acuminata, spinulis dehiscentibus; humeris oblique angulatim extensis. — *Pedes* validi; basi approximati, antici paullo longiores; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis intus crenulatis, apice unco valido, horizontali armatis, anticis intus curvatis; tarsorum articulis omnibus subtus spongiosis, 1, 2 trigonis, penultimo lato, bilobo, ciliato, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — *Curc. candidus* Fabr. l. *Curc. tomentosus* Oliv. — hunc unum tantum vidi.

A *χαιδρωπός* qui hilari est vultu.

Observ. — Habitu fere *Leptoceri* stirpi 3ae simile, distinguitur tamen antennis brevioribus, lobis thoracis pone oculos productis, humeris obliquis, angulatim extensis.

****) Genus 53. *Eustales* nob. — *Eustalis* Germ. — *Phaops* Sahlb. — *Curc. Oliv.* — *Brachyrhinus* Billb.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; scapus oculos attingens, clavatus; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, 3-7 brevibus, omnibus subobconicis; clava elongata, ovalis.

Rostrum capite longius, supra subplanum, apice profunde emarginatum; scrobs curvata, versus marginem inferum oculi desinens.

Oculi oblongi, longitudinaliter positi, modice prominuli.

Thorax postice sub-marginatus, bisinuatus.

Scutellum oblongum, majusculum.

Elytra oblongo - ovata, antice in medio singulatim rotundata, posterius valde convexa; humeri oblique angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* vix capite una cum thorace longiores, versus apicem rostri insertae, subtenuēs, subinfractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, clavato, subarcuato, 2^o et 3^o longiusculis, illo minore, 4-8 paullo brevioribus, omnibus subobconicis; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* saepius capite fere duplo longius, sed illo angustius, subhorizontale, subteres, supra subplanum, in plerisque subcarinatum, versus apicem nonnihil incrassatum, apice ipso profunde triangulariter emarginatum, ciliatum; scrobe lineari, curvata, pone inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, oblongi, longitudinaliter positi, modice prominuli. — *Thorax* latitudine fere longior, antice subtruncatus, postice bisinuatus, submarginatus, anterieus angustior, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, pone oculos perparum laud lobatus, subtus obsolete l. haud emarginatus. — *Scutellum* longiusculum, apice rotundatum, majusculum. — *Elytra* oblongo - ovata l. subelongata, thoracis basi dimidio latiora, sed illo quadruplo longiora, antice in medio singulatim rotundata, thoracis basin subobtegentia, supra, praesertim posterius, convexa, anum occultantia; humeris obliquis, obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, subaequales, validi; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis anticis subarcuatis, intus crenulatis, apice angulato-dentatis, posticis apice mox dilatatis; tarsis latiusculis, subtus spongiosis, articulis 1^o 2^o oblongo trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — Eust. pentachordius Germ. l. Phaops Thunbergi Sahlb. — Ejusdem generis sunt: Eust. adamantinus Germ. — Eustales leucogaenus Germ. l. Phaops albugo Sahlb. — Curc. religiosus Oliv.

Ab *εὐσταλής* bene instructus.

Observ. — Generibus Diaprepis et Exophthalmi affinis hocce genus, sed antennae magis tenuēs atque

si fere angustiores et aliae quidem minus essentielles differentiae.

Genus 54. *Exophthalmus* nob. — Curc. Fabr.
Oliv. — *Chlorima* Dej.

Character generis: — *Antennae* mediocres; scapus oculos attingens; articulis 1^{is} funiculi brevibus, obconicis, 3-7 multo brevioribus, lenticularibus; clava oblongo-ovata, acuminata.

Caput pone oculos elongatum.

Rostrum longiusculum, basi supra subplanum, apice fere concavum, late emarginatum.

Oculi semiglobosi, valde prominuli.

Thorax anterieus angustior, lateribus rotundatis, postice sinuatus, angulis posterioribus subacuminatis.

Elytra oblongo-ovata, antice singulatim rotundato-producta, thoracis emarginaturas replentia; humeri obtuse angulati, subelevati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis una cum thorace, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, basi tenui, versus apicem sensim valde incrassato vel clavato, oculos attingente, 2^o et 3^o brevibus, obconicis, 4-8 multo brevioribus, lenticularibus, subrotundatis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — Caput pone oculos elongatum, subcylindricum. — Rostrum apice longius, declive, basi supra subplanum, apice immixtum, fere concavum, late, non vero profunde emarginatum, ciliatum, nonnihil incrassatum; scrobe profunda, curta, sensim subtus flexa, in medio rostri subtus evascente. — Oculi laterales, semiglobosi, valde prominuli. — Thorax latitudine fere longior, anterieus angustior, truncatus, postice distincte bisinuatus, lateribus rotundatus, angulis posterioribus subacuminatis, supra modice convexus, subtus eger. — Scutellum rotundatum, immersum. — Elytra oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo vix quadruplo longiora, supra modice convexa, basi singulatim ro-

fundato-producta, thoracis emarginaturas implentia, apice acuminata, anum obtegentia; humeris obtuse angulatis, sub-elevatis. — *Pedes* longiusculi, validi; femoribus clavatis, muticis; tibiis subteretibus, anticis versus apicem arcuatis, unco horizontali acuto, minuto intus instructis; omnibus intus parce spinulosis, apice jam mox dilatatis; tarsis longia, latis, subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — Curc. 4-vittatus Oliv. — duae species adhuc indescriptae, mihi visae.

Ab ἐξοφθαλμός qui oculis est. prominentibus.

Observ. — Affine Generi Callizoni, sed rostrum praecipue et caput aliter constructum atque tarsi longiores. A Genere Diaprepis, cui habitu simillimum, differt oculis magis prominulis, rotundatis, rostro supra apice subimpresso, concavo, nec carinato, capite pone oculos magis elongato, elytris antice singulatim rotundato-productis.

Genus 55. Diaprepes nob. — Polydrusus Germ. — Chrysolopus Billb. — Chlorima Dej. — Curculio Auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae longiusculae; scapus versus apicem paullatim incrassatus, oculos attingens; articulus secundus funiculi primo duplo longior, reliqui breviores, omnes obconici; clava elongata, ovalis.

Rostrum longiusculum, subteres, supra carinatum, apice late, sed non profunde emarginatum, paullo incrassatum.

Oculi saepius ovati, modice prominuli.

Thorax anterieus angustior, supra modice convexus.

Elytra oblongo-ovata, supra valde convexa; humeri elevati, obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* elongato-ovatum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis thoracisque, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, versus apicem paullatim incrassato, oculos attingente, 3^o duplo longiore quam 2^o, sequentibus quinque brevioribus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovali, 4-arti-

culata. — *Rostrum* capite longius, subhorizontale, subteres, supra carinatum, apice late, non vero profunde emarginatum, ciliatum, nonnihil incrassatum; scrobe curvata, juxta canthum oculi inferum desinente. — *Caput* pone oculos subelongatum, subconicum. — *Oculi* laterales, ovati, modice prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine fere longior, antice truncatus, lateribus in medio parum rotundatus, anterieus angustior, basi interdum leviter bisinuatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* distinctum, rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo quadruplo longiora, supra valde convexa, posterius ad suturam plerumque subgibba, l. potius subcarinata, apice praesertim in altero sexu, acuminata, anum tegentia; humeris elevatis, obtuse angulatis. — *Pedes* longi, validi, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anticis intus arcuatis, crenulatis l. spinulosis, apice angulato-dentatis; tarsi tibiis parum breviores, lati, subtus spongiosi, articulis 1, 2 subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, valido, biunguiculato.

Stirps 1a. — Thorax postice truncatus.

Typus: — Curc. Spengleri Fabr. — congenerici: Diap. Comma nob. — Curc. Rohrii Fabr.

Stirps 2a. — Thorax postice leviter bisinuatus, in medio sublobatus.

Huc pertinent: Curc. 4-lineatus Oliv. — Curc. affinis Fabr. — Diaprepes aurarius, circumdatus et elegantulus nob.

A διαγενής decorus, elegans.

Observ. — Generi Exophthalmi valde affine, differt vero articulis funiculorum longioribus, subobconicis, oculis subovatis minus prominulis, rostro supra carinato, non concavo, capite pone oculos minus elongato. A Genere Eustalis, cui quoque est affine, differt, antennis longioribus atque paullulum validioribus, pedibus etiam longioribus tarsisque magis dilatatis.

Subgenus Prepodcs nob. — Curculio Fabr., Oliv., Herbst.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres; scapo oculos attingente, sensim incrassato; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, 3 - 7 brevibus, omnibus obconicis; clava oblonga, ovali, acuminata. — *Rostrum* capite paullo longius, sublineare, supra subplanum vel perparum convexum; scrobe curvata, juxta inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati. — *Thorax* basi sub-bisinuatus, anteriorius angustior, supra parum convexus. — *Elytra* oblongo-ovata, supra minus convexa, apice acuminata; humeris oblique angulatis, nonnunquam prominulis, haud elevatis. — *Pedes* validi, antice paullo longiores, tibiis anticis subarcuatis, apice angulato-dentatis, omnibus saepius interne crenulatis; tarsis elongatis, latis, subtus spongiosis. — *Corpus* elongato-ovatum, elegans, alatum.

Stirps 1a. — *Rostrum* lineare, latiusculum, supra subplanum, utrinque linea impressa. *Oculi* modice prominuli.

Typus: — *Curc. vittatus* Fabr. — Huc etiam refertur: *Curc. impressus* Fabr.

Stirps 2a. — *Rostrum* apice subincrassatum, supra subconvexum, in medio leviter carinatum. *Oculi* valde prominuli.

Typus: — *Diaprep. (Prepodes) sejugatus* nob. ex Insula St. Domingo. *

Α προπώδης decorus.

Observ. — Quoad habitum Generis *Diaprepis* genuinis speciebus simile, antennarum vero oculorumque atque rostri forma differentias prebet perspicuas.

Genus 56. *Ptilopus* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv., Thunb. — *Entimus* et *Brachyrhinus* Billb. — *Menoetius* Dej.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, subtenuae; articulis funiculi obconicis; exterioribus sensim paullo brevioribus; clava oblongo-ovalis:

Rostrum subteres, apice parum emarginatum; scrobs subrecta, versus inferum oculi marginem protensa.

Oculi majusculi, modice prominuli, subrotundati.

Thorax antrorsum multo angustior, supra modice convexus.

Elytra elongata l. oblongo-ovata, acuminata.

Pedes elongati, tibiae plerumque arcuatae, subtus ciliatae, posticae in masculis saepius pone basin unidentatae.

Descriptio. — *Corpus* oblongum l. oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* thoracis basin fere superantes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, versus apicem incrassato, oculos attingente, 2-8 obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius, lineare, subdeflexum, subteres, apice haud incrassatum, parum arcuatum, nonnihil emarginatum; scrobe subrecta, aliquantulum curvata, pone canthum oculi inferum desinente. — *Oculi* majusculi, in paucis oblongi, in plerisque rotundati, modice prominuli. — *Thorax* antrorsum multo angustior, basi in plerisque truncatus, raro bisinuatus, supra modice convexus, subtus late sed non profunde emarginatus. — *Scutellum* mediocre, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata l. elongata, thoracis basi in plerisque paullo, in paucis vix latiora, illo vero triplo l. quadruplo longiora, supra convexa, versus apicem attenuata, acuminata, in nonnullis mucronata; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* elongati, validi; femoribus muticis, in medio parum incrassatis; tibiis teretibus, subtus ciliatis, plerumque arcuatis, posticis in masculo saepius pone basin valido dente intus instructis; tarsis latis, spongiis distinctis, ciliatis, unguibus validis.

Stirps 1^a. — Rostrum subelongatum. Oculi oblongi. Thorax latitudine fere longior, subtriangularis, basi bisinuatus, angulis posticis acutis. Elytra elongata, thoracis basi haud latiora, saepius versus apicem gibba, subcompressa, apice ipso mucronata. Tibiae in masculis intus granulatae, posticae rectae.

Typus. — *Curc. aurifer* Fabr., Oliv.

Stirps 2^a. — Rostrum breviusculum. Oculi rotundati. Thorax latitudine brevior, basi subtruncatus, antror-

sum multo angustior. Elytra oblongo-ovata, thoracis basi dimidio fere latiora, apice ipso sub-acuminata; humeris obtuse angulatis. Tibiae posticae in masculo valde arcuatae, pene basin dente valido intus armatae.

Typus: — *Curc. curvipes* Fabr., Oliv. — congenerici: *Curc. valgus* Fabr. l. C. Castilianus Herbst. — *Ptilop. villosipes* et *memnonius* nob.

Α πτερον penna, ποὺς pes.

Observ. — A Genere *Cratopi*, cui maxime est affine, distinguitur: articulis funicularum obconicis, subaequalibus, scrobe subrecta, aliquantulum curvata, elytria basi subtruncatis, humeris obtuse rotundatis, femoribus anticis muticis, minus crassis. Sic etiam subgeneri *Prepodi*, cui praeterea simile, antennis brevioribus, humeris non prominulis, tibiis aliter constructis, dissimile est.

Genus 57. *Cratopus* Dalm. — *Curculio* Fabr., Oliv. — *Lixus* Fabr. — *Leptocerus* et *Tanymecus* Germ. — *Menoetius* Dej.

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenues; scapus clavatus, oculos superans; articulis funiculi basalibus longiusculis, obconicis, 3-7 brevissime obconicis, paulatim brevioribus; clava oblonga, ovalis.

Rostrum breviusculum, crassum, lineare, supra subplanum; scrobs infra-ocularis, subarcuata, profunda.

Oculi majusculi, sub-oblongi, parum prominuli.

Elytra oblongo-ovata l. ovata, basi junctim paullo emarginata; humeri antrorsum prominuli.

Pedes robusti; femora antica magna, valde incrassata, dentata.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, interdum ob-ovatum, alatum. — *Antennae* longiusculae, subtenues, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o basi tenui, sub-flexuoso, apice clavato, sese supra oculos extendente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 sensim brevioribus, brevissime obconicis; 1. subtruncatis, clava oblonga, ovali l. subfusiformi, acuminata, 4-articulata. —

Rostrum in aliis capitis longitudine, in aliis paullo longius, lineare, crassum, supra planiusculum, apice subemarginatum; *scrobe* lineari, profunda, subarcuata, infra oculos desinente. — *Oculi* majusculi, laterales, sub-oblongi, parum prominuli. — *Thorax* latitudine baseos vix longior, subtriangularis, interdum subconicus, basi apiceque truncatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* mediocré, triangulare, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata l. tantum ovata, thoracis basi vix latiora, illo autem quadruplo longiora; basi junctim introrsum parum emarginata, posterius attenuata, supra modice convexa, anum obtegentia; humeris angulatis, antrorsum prominulis, thoracem subambientibus. — *Pedes* robusti; femoribus anticis magnis, valde incrassatis, versus apicem dente valido armatis; tibiis teretibus subrectis, anticis plerumque intus crenulatis, apice intus angulato-dentatis; tarsis subtus eximie spongiosis, articulis 1,2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Cratop*: triangularis Gyllenh. — Huc quoque referri possunt: *Lixus melanocephalus* Fabr. — *Curc. Striga*, roralis, — *brunnipes* et *Punctum* Fabr. — *Cratopus Molitor* nob. — *Menoetius chrysochloris* et *marmoreus* Dej.

Α κραιὺς fortis, ποὺς pes.

Observatio: Generi *Leptoceri* affine, statura autem aliena et diversa. Femora antica saepius magna, valde incrassata, dentata et elytra basi simul emarginata, humeri antrorsum prominuli, thoracem ambientes, characterem hujus generis facilem praebent. Habitu quidem species valde discrepant, sed characteribus essentialibus conveniunt.

Genus 58 *Pachnaeus* nob. — (*Docorhinus* nob. olim)

Character generis: — Antennae mediocres; subtenues; articularis duobus funiculi basalibus subclavatis, reliquis brevibus sub-obconicis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum subteres, versus apicem perparum angustatum, supra sub-planum, in medio linea angusta longitudinalis elevata.

Oculi rotundati, sub-depressi.

Thorax basi bisinuatus, lateribus nonnihil rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, convexa, apice' acuminata; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, pollinosum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis thoracisque, infra medio rostri insertae, subtenues, fiactae, 12-articulatae; articulo 1o elongato, marginem oculorum superiorem attingente, apice clavato, 3o paullo longiori quam 2o, 4-8 brevioribus, omnibus sub-obconicis; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite longius et illo paullo angustius, nonnihil pendulum, subteres, versus apicem perparum angustatum, supra subplanum, in medio lineae angusta longitudinali elevata, apice ipso paullulum emarginata; scrobe angusta, lineari, arcuata, pone inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, sub-depressi, parvi. — *Thorax* latitudine baseos vix longior, anterieus angustior, antice truncatus, in nonnullis infra oculos exigue angulato-lobatus, lateribus nonnihil rotundatus, postice plus minusve bisinuatus, infra pone gulam latè, sed non profunde emarginatus, supra modice convexus. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora, sed illo fere quintuplo longiora, supra convexa, basi aut singulatim subrotundata, aut lobis thoracis basin obtegentibus producta, apice acuminata, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi; longitudine subaequales; femoribus pone medium incrassatis; tibiis subteretibus, rectis, anticis apice vix uncinatis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulis 1o 2o trigonis; penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato. —

Typus: — *Curc. opalus* Bosc. in litter. — congenericus: *Cyphus litus* Germ.

Α παχυνής, pruinosis.

Observatio: — Genus hocce habitu generi *Chlorophani* (ante n. 15.) simillimum, sed differt antennis fractis atque rostro aliter constructo. — Generi *Callisoni*

etiam haud dissimile, rostro autem et oculis, diversum. — A Genere *Asemi* distinguitur: corpore paullo latiore, rostro multo angustiore et paullo longiore, oculis minus prominulis.

Genus 59. *Callizonus* nob. (*Tropirhinus* nob. olim.)

Character generis: — Antennae mediocres; articulis primis funiculi longiusculis, obconicis, 3-7 brevibus, turbinatis; clava ovata, acuminata.

Rostrum longiusculum, subteres, supra subconvexum, carinatum, versus apicem utrinque impressum; scrobs infra-ocularis, arcuata.

Oculi valde prominuli, semiglobosi.

Thorax basi bisinuatus, anterieus angustior, supra valde depressus.

Elytra oblongo-ovata, pone scutellum impressa, apice acuminata; humeri subelevati, obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-subovatum, alatum. — *Antennae* fere longitudine capitis una cum thorace, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, oculos attingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, subturbinatis; clava ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius, subhorizontale, subteres, supra subconvexum, in medio carinatum, utrinque prope hanc carinam versus apicem impressione oblonga instructum, apice ipso erosum, vix emarginatum, subciliatum; scrobe arcuata, lineari, infra canthum oculi inferum desinente. — *Oculi* laterales, valde prominuli, semiglobosi. — *Thorax* latitudine longior, antice truncatus, postice plus minusve bi-sinuatus, lateribus nonnihil rotundatus, anterieus multo angustior, supra late et profunde impressus, subtus integer. — *Scutellum* minutum, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo quadruplo longiora, basi singulatim sub-rotundata, apicem versus paulatim angustiora, acuminata, anum occultantia, supra convexa, pone scutellum impressa; humeris sub-elevatis obtuse angulatis. — *Pedes* va-

lidi; femoribus muticis; in medio-incrassatis; tibiis teretibus, anticis versus apicem subarcuatis, intus indistincte crenulatis, apice truncatis, intus angulato-dentatis; tarsis subtus spongiosis, ciliatis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curc. 19-punctatus* Fabr. — congenericus: *Curc. regalis* Fabr.

A καλλιζωνος pulchre cinctus.

Observatio: — Affine generi *Diaprepi*, sed differt oculis magis prominulis et rotundatis, rostro magis teretiusculo antennisque brevioribus. A subgenere *Prepodis*, cui quoque associatum, discrepat, rostro multo minore atque carinato, et oculis magis prominulis.

*****) Genus 60. *Hypomeces* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv., Herbst.

Character generis: — *Antennae* breviusculae; articulis funiculi basalibus, breviter obconicis, reliquis turbatis, gradatim paullo latioribus; clava oblonga, acuminata.

Rostrum breve, supra planum, profunde canaliculatum.

Oculi subglobosi, valde prominuli.

Thorax subconicus, dorso impressus, anguli postici acuminati.

Elytra elongata, dorso antico sub-depressa, apice subacuminata, humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, pulvere l. squamulis saepius obductum. — *Antennae* ad thoracis medium pertingentes, infra medio rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1o elongato, clavato, oculos attingente, 2-3 breviusculis subobconicis, 4-8 turbatis, exterioribus sensim crassioribus; clava oblongo-subovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, subhorizontale, angulatum, supra subplanum, profunde canaliculatum, apice emarginatum; scrobis profunda, lineari, subarcuata, infra oculos desinente. — *Oculi* laterales, subglobosi, valde prominuli. — *Thorax* subconicus, latitudine longior, anterieus angustior, truncatus, pone oculos non lobatus, basi bi-si-

nustis, angulis acuminatis, supra inaequalis, impressus, sub-
tus pone gulam vix emarginatus. — *Scutellum* distinctum,
subtriangulare, apice rotundatum. — *Elytra* elongato-ovata,
thorace fere quadruplo longiora et illo paullo latiora, dorso
antico subdepressa, apice subacuminata, anum occultantia;
humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi, antici vix longio-
res; femoribus incrassatis, muticis, tibiis subteretibus, sub-
rectis anticis apice intus angulato dentatis; tarsis subtus
spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo,
ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: Curc. squamosus Fabr. Huc quoque referri
possunt: Curc. pulverulentus et unicolor Fabr. —
Hypomeces pauper nob.

Ab *ὑπομήκης* longiusculus.

Observatio: — Generi *Anaemeri* assimile; huic vero
fronte minus lata et palpebra supra oculos producta carente,
antennis paullo magis tenuibus atque longioribus, oculis ro-
tundatis, elytris apice haud dehiscentibus, hocce genus
dissimile.

Subgenus *Dereodus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, validae;
scapo clavato, oculos vix attingente; articulis funiculi basa-
libus breviter obconicis, 3-7 brevibus, apice truncatis, sub-
perfoliatis, coarctatis, crassitudine crescentibus; clava ob-
longo-ovata, acuminata. — *Rostrum* breve, crassum, su-
pra sub-planum, sulco profundo, in verticem usque conti-
nuato, exaratum. — *Oculi* oblongi, subdepressi, majus-
culi. — *Thorax* subcylindricus, basi leviter bisinuatus; lo-
bis infra-ocularibus valde elongatis, acutis instructus, supra
parum convexus, cruciatim impressus, subtus pone gulam
late emarginatus. — *Elytra* elongata, thorace vix dimidio
latiora, pone scutellum subimpressa, apice acuminata; hu-
meris obtuse angulatis.

Typus: — *Hypom.* (*Dereod.*) *denticollis* nob.
e Sierra Leona. Nec plures vidi.

A *δέρη* collum, *ὀδὸς* dens.

Observatio: — Hoc subgenus generi *Hypomeci* valde affine, sed lobis thoracis ab illo praecipue distinguitur.

Genus 61. *Anaemerus* nob. — *Curculio* Fabr., Wiedem.

Character generis: — Antennae breves, validiusculae; scapus oculos non attingens; articulis funiculi duobus basalibus brevibus, subobconicis, 3-7 brevioribus, turbina-
tis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breve, latum, supra planum, canaliculatum.

Frons latiuscula, supra oculis quasi palpebra producta.

Oculi sub-oblongi, valde prominuli.

Thorax oblongus, antice truncatus, postice sub-bisinnatus, lateribus subrectus, supra depressus.

Elytra elongata, apice mucrone parvo armata.

Tarsi elongati, sub-angustati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, durum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, pone medium rostri insertae, deflexae, validiusculae, fractae, parce et rigide pilosae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos sub-attingente, versus apicem sensim incrassato, 2^o et 3^o brevibus, sub-obconicis, 4-8 brevibus, subturbina-
tis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breve, latum, longitudine capitis quo vix angustius, subhorizontale, crassum; supra planum, inaequale, saepe canaliculatum, apice ciliatum, late emarginatum; scrobe curvata, ab apice ad rostri medium infra-oculos exeunte. — *Frons* latiuscula, quasi palpebra supra oculos producta. — *Oculi* sub-oblongi, valde prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine longior, sublinearis, antice truncatus, postice sub-bisinnatus, lateribus in medio aut parum ampliatus, aut rectus, supra depressus. — *Scutellum* minutum, punctiforme. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora et illo plus triplo longiora, supra modice convexa, versus apicem attenuata, apice ipso mucrone parvo, recto armata, anum occultantia; humeris oblique angulatis. — *Pedes* elongati, validi, longitudine sub-

aequales, femoribus in medio parum incrassatis; tibiis tere-
tibus, anticis ante apicem parum arcuatis, reliquis rectis,
omnibus apice intus unco brevi, horizontali, acuto armatis;
tarsis sub-angustatis, articulis 1, 2 oblongo-trigonis, penul-
timo vix latiore, bilobo, ultimo clavato, aut bi-aut uni-
articulato.

Typus: — *Curc. tomentosus* Fabr. — congeneri-
cus: — *Curc. rugosus* Wiedem. in Germ. Mag. IV.
pag. 154.

Ab *ἀρχήσος* agrestis.

Observatio: — Affinitatem cum genere *Hypomeci*
exhibet, dissimilitudinem vero formae corporis, quae aliena
est, antennarumque structurae, quae quoque diversa est, in-
cludit; frons latiuscula aliquantisper oculos tegens, hocce
bene distinctum mihi videtur reddere genus. Duae illae hu-
jus generis, quas cognosco species, dissimilitudinem adeo in-
signem praebent, ut tarsi in *Anaemero tomentosus* sint
angustati et subtus haud spongiosi, unguiculus biarticulatus,
at vero in *Anaem. rugoso* tarsi sint subtus spongiosi et
unguiculus uniarticulatus. Nec, de cetero, essentialem ul-
lam, qua referri ad diversa genera possint, differentiam
reperi.

Genus 62. *Tanymecus* Germ. Dej. — *Curculio* Au-
ctor. reliquor.

Character generis: — Antennae mediocres, subte-
nues; scapus oculos superans; articulis funiculi duobus ba-
salibus obconicis, reliquis brevibus, subturbinatis; clava
oblonga, ovalis, acuminata.

Rostrum breve, crassiusculum; scroba curvata, ante
oculum abbreviata.

Oculi rotundati, subdepressi.

Thorax oblongus, antice posticeque truncatus, lateribus
in medio modice rotundatus, margo posticus saepissime ele-
vatus.

Elytra elongata, apice acuminata.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, alatum. — *An-
tennas* longitudine fere capitis thoracisque, versus apicem

rostri insertae, subtenuae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculi marginem superiorem attingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, illo saepius paullo longiore, reliquis brevibus, subaequalibus, subturbinatis; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis eoque paullo angustius, subhorizontale, longitudinaliter impressum, aut linea in medio elevatum, in paucis supra aequale; scrobe parum curvata, ante oculos abbreviata, non profunda. — *Oculi* laterales, rotundati, aut subdepressi, aut parum prominuli. — *Thorax* latitudine paullo longior, antice posticeque truncatus, margine postico plus minusve distincte elevato-marginatus, lateribus aequaliter rotundatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora, sed illo triplo longiora, oblongo-ovata, dorso parum convexa, apice aut singulatim obtuse, aut conjunctim argute acuminata, anum tegentia: humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, validi, longitudine subaequales, femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis teretibus, apice truncatis, muticis; posterioribus versus apicem extus penicillatis; tarsis longiusculis; subtus spongiosis, articulis 1, 2 subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1^a. Rostrum longitudinaliter impressum. Elytra apice singulatim obtuse subacuminata.

Typus: — Curcul. palliatus Fabr. Gyllenh. l. C. griseus Fabr., Curc. canescens Herbst. Congenerici: Tany. favillaceus et bibulus nob.

Stirps 2^a. Rostrum supra in medio linea longitudinali elevatum. Elytra apice conjunctim acuminata.

Typus: — Tany. urbanus nob. — Huc pertinent: Tany. rudis, discolor et marginalis nob.

Stirps 3^a. Rostrum supra aequale. Elytra apice conjunctim acuminata.

Typus: — Curc. niloticus Hoffmans. in litt.

A τανύω extendo μήκος longitudo.

Observatio. — Proximum est Sitonae generi, at

vero antennarum scapus paullo longior, funiculorumque articuli subturbinati, haud nodosi.

Subgenus *Asemus* nob. — *Curculio* Fabr. Wiedem.

Adumbratio: — Antennae fere longitudine capitis simul cum thorace, subtenues, scapo oculos superante, clavato; articulis duobus basalibus funiculi obconicis, reliquis aut subtarbinatis, aut subobconicis; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, crassissimum, supra subplanum, in medio linea longitudinali elevatum, profunde emarginatum; apertura oris ampla; mandibulae amplae, valde convexae; scrobs plus minusve curvata, ante oculum abbreviata. — *Oculi* laterales, subrotundati, parum prominuli, majusculi. — *Thorax* latitudine paullo longior; in aliis subconicus, in aliis subcylindricus, antice posticeque truncatus, supra modice convexus. — *Elytra* thorace paullo latiora, sed illo triplo longiora, pone medium versus apicem sensim attenuata, apice ipso conjunctim argute acuminata; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi; tibiis teretibus, apice truncatis, intermediis nunquam apice unco valido, subdeflexo armatis, posterioribus versus apicem extus penicillatis: tarsis elongatis.

Typus: — *Curc. rusticus* Fabr. Huc pertinent: *Curc. chloroleucus* Wiedem. Tonym. (*Asemus*) *protervus* nob.

Ab *Donquos* non signatus.

Observatio: — A genere *Tanymeci* genuini hoc subgenus parum discrepat, rostro tamen crassiore, ingentibus fere mandibulis aliterque constructo thorace, distingui posse videtur.

Genus 68. *Astycus* nob. — *Curculio* Oliv.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; scapus clavatus, oculos attingens; articuli funiculi 1-3 sequentibus paullo longiores, obconici; clava oblonga, ovalis, acuminata.

Rostrum breve, angulatum, supra planum, canaliculatum; scrobs linearis, arcuata, subtus flexa.

Oculi subrotundati, parum prominuli.

Thorax oblongus, subcylindricus, lateribus parum rotundatus, margo posticus elevatus.

Elytra subcylindrica, convexa, apice acuminata; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, subcylindricum, exsulptum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non attingentes, pone medium rostri insertae, subtenuae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, inferiorem oculorum marginem tangente, 2-4 longiusculis, obconicis, 5-7 brevioribus, subrotundatis, 8^o crassiore, clavae basin submentiente; clava oblonga, subovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, longitudine capitis et illo paullo angustius, angulatum, supra planum, in medio canaliculatum, apice emarginatum; scrobe lineari arcuata, seorsim subtus flexa. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, subcylindricus, anterieus paullo angustior, lateribus parum rotundatus, antice posticeque truncatus, margo posticus elevatus, subtus pone gulam obsolete emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* antice thoracis basi non latiora, sed mox pone basin per angulum humeralem, obliquum ampliata, deinde sublinearia, thorace quadruplo longiora, subcylindrica, convexa, versus apicem attenuata, acuminata, anum obtegentia. — *Pedes* validi, antici paullo longiores; femoribus muticis, in medio incrassatis; tibiis anticis versus apicem arcuatis, intus crenulatis, apice unco horizontali, acuto intus armatis, posticis apice mox dilatatis, truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis articulo 1^o elongato, subtrigono, 2^o minore, brevior, trigono, 3^o latiore, bilobo, ultimo elongato, parum clavato, valido.

Typus: — Curc. adultus Oliv. Unam tantum ad hoc genus speciem pertinentem vidi.

Ab ἀστυκός urbanus, scitus.

Observatio: — Statura et facies fere eadem, ac in subgenere Asemi, antennis autem brevioribus atque rostri structura maxime discrepat.

Genus 64. *Lissorhinus* nob.

Character generis: — Antennae breves, subrectae, crassiusculae; articulis basalibus funiculi obconicis, reliquis paullo brevioribus, apice truncatis; clava subovata, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, supra planum.

Oculi subovati, prominuli.

Thorax subcylindricus, anterieus subangustior.

Elytra elongata, versus apicem attenuata, acuminata.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, subcylindricum, laeve, alatum; — maris paullo angustior, abdomine subtus in medio paullo deplanatum. — *Antennae* thoracis medium vix superantes, subrectae, attamen parum geniculatae, versus apicem rostri insertae, validiusculae, 12 articulae; articulo 1^o elongato, clavato, oculos attingente, 2^o obconico, 3^o reliquis paullo longiore, 4-8 brevibus, apice truncatis, subcoarctatis, crassitudine crescentibus; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, subhorizontale, crassum, supra planum, in medio linea impressa, apice late emarginatum; scrobe curvata, sensim subtus flexa, pone basin rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, subovati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine paullo longior, subcylindricus, anterieus paullo angustior, antice posticeque truncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* oblongum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo vero quadruplo longiora, elongata, subcylindrica, versus apicem attenuata, acuminata. — *Pedes* validi; femoribus parum incrassatis, muticis; tibiis teretibus subrectis, apice intus subangulatis; tarsis subtus spongiosa, articulis 1, 2 subtrigonis, penultimo paullo latiore, bilobo, ungue brevi, biunguiculato.

Typus: — Lissorh. Eryx nob. Unam solum e Sierra Leona speciem vidi.

A λισσοῦς laevis, ὄλν nasus.

Observatio: — Habitu primo adpectu Lixogeno fere simile, rostrum vero statim dissimilitudinem indicat.

Genus 65. *Protenomus* nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; articulis tribus funiculi basalibus obconicis, reliquis sub-perfoliatis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum breve, angulatum, supra longitudinaliter profunde impressum.

Oculi subovati, sub-depressi.

Thorax oblongus, subcylindricus, supra parum convexus, subtus versus basin utrinque fovea lata impressus.

Elytra oblongo-ovata, antice conjunctim emarginata; humeri antrorsum sub-prominuli.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, sub-apterum, alis incompletis. — *Antennae* thoracis medium non superantes, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12 articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, 4^o brevi, omnibus obconicis, 5-8 brevioribus, sub-perfoliatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava 4-articulata, oblonga, ovali, minuta. — *Rostrum* longitudine capitis, subdeflexum, crassum, angulatum, supra longitudinaliter concavum, apice late, non vero profunde triangulariter emarginatum; scrobe curvata, brevi, latiuscula, ante oculos abbreviata. — *Caput* latum, subpro-ductum, convexiusculum. — *Oculi* laterales, sub-ovati, subdepressi. — *Thorax* latitudine longior, subcylindricus, anterieus vix angustior, apice in medio leviter sinuatus, juxta pone apicem, praesertim versus latera, linea abbreviata impressus; basi subtruncatus, paullulum reflexus, supra modice convexus, subtus versus basin utrinque fovea lata pro receptione femorum anticorum impressus, pone gulam late non vero profunde emarginatus. — *Scutellum* distinctum, triangulare, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo triplo longiora, antice junctim rotundato-emarginata, humeris antrorsum subprominulis; mox pone basin ampliata, oblongo-ovata, apice subacuminata, supra parum convexa. — *Abdomen* in medio juxta basin, (forte in masculis) impressum. — *Pedes* longiusculi, validi; femoribus subclavatis, muticis; tibiis subcompressis, anterioribus intus curvatis; posticis rectis, omnibus apice unco obtuso intus ar-

matiss; tarsa elongatis, articulis 1o et 2o trigonis; penultimo paullo latiore, bilobo, subtus spongioso, ultimo valido, clavato; biunguiculato.

Typus: — Curc. Saisanensis Gebl. n. sp. e Mongolia — D. Steven benigne; communicavit — nec plures vidi.

A *πρωσις* protendo, ὤμος humerus.

Observatio: — Statura similis fere Lissorhini generi, sed magis ovatus, affinis etiam nonnullis Asemi subgeneris speciebus, sed bene distinctus rostro aliter constructo atque elytris antice emarginatis; humeris antrorsum subprominulis.

***** Genus 66. *Artipus* nob., Sahlb. — Sitona Dej.

Character generis: — Antennae mediocres, validae; scapus clavatus, oculos fere superans; articulis primis funiculi obconicis, ultimis turbinatis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, in medio profunde canaliculatum, apice late et profunde emarginatum.

Oculi minores, rotundati, modice prominuli.

Thorax cylindricus, antice truncatus, basi sub-bisinnatus.

Elytra elongata, versus apicem attenuata, sub-acuminata.

Tibiae rectae, crassiusculae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum, minoris magnitudinis. — *Antennae* ad thoracis basin vix pertingentes, versus apicem rostri insertae, validae, parce rigide pilosae, fractae, 12 articulatae: articulo 1o elongato, oculos fere superante, versus apicem sensim incrassato, 2o et 3o longiusculis, obconicis, 4-8 subturbinatis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, supra sub-impressum, canaliculatum, apice late et profunde emarginatum, ciliatum; scrobe infraoculari, valde curvata, basi profunda. — *Oculi* minores, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, cylindricus, antice truncatus, pone gulam leviter emarginatus, postice sub-bisinnatus.

tns, supra convexus. — *Scutellum* distinctum, rotundatum. — *Elytra* thorace dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, supra modice convexa, sublinearia, versus apicem attenuata, subacuminata, abdomen obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi; femoribus parum incrassatis; tibiis rectis, crassiusculis, anticis apice unco brevi intus armatis; tarsis latiusculis, subtus spongiosis, articulo 1^o basi tenui, 2^o trigono, 3^o latiore, bilobo, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Typus: *Artipus corycaeus* Sahlb. — Nullam praeter hanc speciem vidi.

Ab *ἀπρίνου* valens pedibus.

Observatio: — Generi *Sitonae* simillimum et affine est, sed antennis validioribus, articulis omnibus brevissime obconicis diversum; ceterum apice attenuata sunt elytra, pedesque validi atque tibiae rectae, crassiusculae. —

Genus 67. *Sitona* Germ. Dej. — *Brachyrhinus* Billb. — *Curculio* Auctorum reliquorum.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; articulis primis funiculi longiusculis, obconicis, reliquis nodosis; clava oblongo-ovalis.

Rostrum supra planum aut in medio linea impressum, aut sulcatum.

Oculi majusculi, in plerisque subrotundati, modice prominuli, in nonnullis oblongi, valde prominuli.

Thorax subteres, lateribus pone medium rotundatus.

Elytra elongata, apice rotundata; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* parvum, elongatum, alatum. — *Antennae* subtenues, thoracis basin non tangentes, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, clavato, oculorum medium attingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 3-8 brevibus, nodosis; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, apice emarginatum, subhorizontale, in plerisque supra planum, in medio linea longitudinali impressum, in nonnullis latitudine paullo longius, lineare; supra longitudinaliter sul-

catum; scrobo infra-oculari, curvata. — *Oculi* majusculi, laterales, in plerisque subrotundati modice, in paucis valde prominuli, oblongi. — *Thorax* latitudine longior, antice posticeque truncatus, saepius subteres, lateribus pone medium rotundatus, raro in medio ampliatus, supra modice convexus. — *Scutellum* minutum, rotundatum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora, quo quadruplo longiora, supra modice convexa, apice subrotundata, anum occultantia; humeris obtusae angulatis. — *Pedes* mediocres, subaequales; femoribus, praesertim anticis, in medio incrassatis; tibiis apice truncatis, muticis; tarsorum articulo 1^o oblongo, 2^o trigono, 3^o latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. (Genus *Charagmus* nob. olim) — *Rostrum* latitudine paullo longius, subhorizontale, lineare, supra longitudinaliter sulcatum. *Oculi* oblongi, valde prominuli. *Thorax* in medio valde ampliatus. *Tarsorum* spongiae distinctae.

Typus: — *Curc. gressorius* Fabr. — Huc adnumeratur: *Curc. infossor*. Herbst.

Stirps 2a. (*Sitonae genuinae*.) — *Rostrum* breve, subporrectum, supra planum, in medio linea longitudinalis impressa. *Oculi* subrotundati, modice prominuli. *Thorax* subteres, lateribus pone medium rotundatus. *Tarsorum* spongiae obsoletae.

Typus: *Curc. lineatus* Auctorum et congenerici: *C. caninus*, *tibialis*, *hispidulus* Auctora. — et species aliae plures indeductae.

Α σιτώνης frumenti emtor.

Genus 68. *Promecops* nob. — Sahlb.

Character generis: — *Antennae* breviusculae; scapus subclavatus, oculos non attingens; articulis duobus basilibus funiculi longiusculis, obconicis, 3-7 brevibus, subnodosis; clava ovata.

Rostrum breve, crassum, supra canaliculatum; scroba profunda, arcuata.

Oculi elongati, depressi.

Thorax subcylindricus, pone oculos lobatus.

Elytra oblonga; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, minoris magnitudinis, alatum. — *Antennae* ad thoracis medium vix per-tingentes, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1o elongato, oculos non attingente, versus apicem incrassato, 2o et 3o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus; subnodosis; clava ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, crassum, apice vix incrassatum; emarginatum, supra canaliculatum; scrobe curvata, lineari, profunda, pone inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, elongati, perpendiculariter positi, depressi. — *Thorax* latitudine fere longior, basi sub-bisinuatus, antice late, non vero profunde emarginatus, pone oculos eximie lobatus, lateribus subrotundatus, postice paullo angustior, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* rotundatum, punctiforme, subelevatum. — *Elytra* thorace dimidiati-ora et illo quadruplo longiora, supra modice convexa, apice rotundata, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi, longitudine subaequales; femoribus parum incrassatis, muticis; tibiae crassiusculae, anticae intus un- minutissimo armatae; tarsi subtus spongiosi, articulis 1, 2 subtrigonis, 3o latiore bilobo, unguibus brevibus, gracilibus, biunguiculatis.

Typus: — *Promecops nubifer* Sahlb. — *Congenericus* — *Promec. Myops* nob.

A προμήκης oblongus, ὠψ̄ oculus.

Observatio: Genus quoad habitum *Sitonae* proximum, sed thorax pone oculos lobis productus; oculi elongati, depressi. Affine quoque generi *Gronopi*, structura autem rostri maxime differt.

Genus 69. *Hadromerus* nob. *Curculio* Oliv.

Character generis: — *Antennae* mediocres, subtenu- es; scapus clavatus, flexuosus; articulis basalibus fun- culi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subnodosis; clava majuscula, oblonga, ovalis.

Rostrum brevissimum; crassum; supra sub-deplanatum.

Oculi subrotundati, modice prominuli.

Thorax sub-transversus, lateribus rotundatus, postice submarginatus.

Elytra oblonga, apice subacuminata.

Pedes antiqui multo longiores, validi; femora magna, valde incrassata; tibiae subarcuatae, intus crenulatae, tarsorum anteriorum articulus unguicularis longus.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* subtenuae, thoracis medium vix superantes, infra medium rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1o elongato, clavato, subflexuoso, oculos attingente, 2o et 3o longiusculis, 4o et 5o brevibus, sub-obconicis, reliquis subnodosis, ultimo paullo crassiore, clavae adpresso; clava minuscula, oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, supra planum, in medio linea longitudinali impressum, apice emarginatum: scrobe lineari, arcuata, juxta inferum oculorum canthum desinente. — *Oculi* laterales, aut rotundati, aut suboblongi, modice prominuli. — *Thorax* longitudine fere latior, antice posticeque truncatus, lateribus rotundatus, margo posticus subelevatus, subtus pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* minutum, rotundatum. — *Elytra* aut thoracis basi dimidio latiora, oblongo-ovata, humeri obtuse angulati; aut elongata, thoracis parte postica haud manifeste latiora, humeri vix extensi; supra modice convexa, apice ipso acuminata, anum occultantia. — *Pedes* validi, antiqui multo longiores; femoribus anticis magnis, valde crassis, muticis; tibiis subarcuatis, intus crenulatis, apice intus angulatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, unguiculis, anticis saepe longissimis, arcuatis; femoribus posterioribus parum crassis, tibiis rectis, apice muticis.

Stirps 1a. Thorax antice coarctatus; deinde lateribus valde rotundatus. Elytra oblongo-ovata; humeri obtuse angulati.

Typus: — *Hadrom. nobilitatus* nob. e Brasilia.

Stirps 2a. Thorax parum convexus. Elytra thoracis basi vix latiora.

Typus: — *Curculio Sagittarius* Oliv. e Senegallia.

Ab ἀδρός crassus, μηρός femur.

Observatio: Habitus fere similis generi *Leptoceri*, sed antennae multo breviores, aliter constructae atque articulus tarsorum unguicularis saepe valde elongatus. — Hoc genus vix rectum et satis distinctum, ejusque igitur determinatione mihi met ipsi satisfacere non potui.

Genus 70. *Polydrosus* nob. — *Polydrusus* Germ. Dej., Billb. — *Dascillus* Megerle. — *Brachyrhinus* Latr., Billb. — *Curcul.* Fabr. Gyllenh. Oliv. — *Muraus* Megerle. — (olim *Phyllerastes* nob.)

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenues; scapus clavatus, plerumque extra oculos sese erigens; articulis basalibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis aut brevissime obconicis, aut nodosis; clava elongata, ovalis.

Rostrum breve, crassiusculum, subteres, capite angustius.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax parvus, brevis.

Elytra supra, praesertim posterius, convexa; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, l. oblongo ovatum, alatum. — *Antennae* capitis thoracisque longitudine, infra medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, subarcuato, plerumque sese supra oculos erigente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, in plerisque sub-obconicis, in quibusdam nodosis; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo brevius et angustius, nutans, subteres, apice emarginatum; scrobes lineares, angustae, arcatae, in medio rostri subtus flexae et conjunctae. — *Caput* exsertum, subcylindricum. — *Oculi* laterales; rotundati, modice prominuli. — *Thorax* parvus, brevis, antice posticeque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus,

subtus integer. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* thorace fere duplo latiora, quo quintuplo longiora, ovata l. oblongo-ovata, apice subacuminata, supra postice valde convexa, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, subaequales; femoribus in medio incrassatis, muticis l. dentatis; tibiis sub-compressis, vix curvatis, apice muticis, posticis apice subdilatis, extus excavatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore bilobo, ultimo parum clavato, biunguiculato, unguibus brevibus.

Stirps 1a. Antennae longiusculae, subtenues; articulo 1^o clavato, pone oculos sese erigente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 nodosis l. brevissime obconicis.

Typus: Curc. undatus Fabr. — Congen. Curc. fulvicornis auctor. — C. Picus Fabr. — C. flavipes Gyll. — Dascillus sparsus Dahl.

Stirps 2a. Antennae ita ut in stirpe 1^a comparatae; at vero hac in stirpe 2^a articuli 4-8 sunt obconici.

Typus: — Curc. cervinus Fabr. — Huc inscribendi sunt: Curc. squamosus Knoch Polydrus. planifrons et impressifrons Dej. — Polydr. xanthopus et tunicatus nob. — plures aliae indescriptae species.

Stirps 3a. Antennae longiusculae, subtenues; articulo 1^o clavato, oculos attingente, nihilo vero ultra, 2^o et 3^o obconicis, reliquis brevibus, subaequalibus, etiam obconicis. Elytra in plerisque ovata, postice valde convexa.

Typus: — Curc. sericeus Gyllenh. l. C. splendidus Herbst. Arch. — C. micans Fabr. l. C. Pyri Linn. — Dascill. lateralis Meg. — Polydr. thalassinus nob.

A. πολυδρόκος valde ruscidus.

Observatio: Quoniam scrobis l. canaliculae antennalis formam, praecipuum esse hujus familiae characterem, putavi, quae quoque ut Character Phalangum est adhibita, coactus sum longius removere Phyllobium, cui praeterea hoc genus simillimum est et affine.

Subgenus *Scythropus* nob. (olim *Pachyrhinus* nob.)—
Curculio Herbst, *Polydrusus* Germ.

Adumbratio: — Antennae capitæ thoraceque longiores, tenues; scapo oculos superante, clavato; articulis funiculi obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava oblongo-ovali, acuminata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, supra inter antennae striga transversa, elevata, ad latum arcuata; scrobes lineares jam mox subtus flexae, in medium rostri subtus conniventes. — *Frons* latiuscula, convexa, occipite elongato, crasso. — *Thorax* brevis, transversus, subcylindricus, lateribus parum rotundatus, basi apiceque truncatus. — *Elytra* elongata, sublinearia, supra convexa; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiae subcompressae, rectae.

Typus: *Curc. Mustella* Herbst. — *Curc. squamulosus* Creutz. an species distincta?

Α *αυδρηνοῦς* tristia.

Observatio: — Rostrum brevissimum, crassum; frons latiuscula, convexa; occiput longum; antennae magis tenues, articuli funiculi obconici, exteriores sensim breviores; unde hocce subgenus a *Polydrosos* diversum definiri videtur.

Genus 71. *Metallites* nob. Germ. — *Muranus* Meg.

Character generis: — Antennae breviusculae, crassiusculae; scapus supra oculos sese extendens, crassus, clavatus; articulis basalibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis nodosis; clava oblongo-ovata, apice attenuata.

Rostrum breve; subteres; supra planiusculum; capite paullo angustius.

Oculi parvi, rotundati, modice preminuli.

Thorax brevis; subcylindricus, lateribus modice rotundatus.

Elytra elongata; parum convexa.

Descriptio: — *Corpus* elongatum; molliusculum, alatum. — *Antennae* crassiusculae; fractae; ad thoracis basin vix pertingentes, infra medium rostri insertae, 12-arti-

culatae; articulo 1o supra oculos sese extendente, crassiusculo, clavato, saepius arcuato, 2o et 3o longiusculis, obconicis, priori crassiore, 4-8 brevioribus, nodosis, versus apicem sensim paullo crassioribus, clava oblongo-ovata, apice attenuata. — *Rostrum* capite paullo brevius et angustius, mutans, subteres, supra planiusculum, versus apicem non incrassatum, apice ipso submarginatum; scrobe infra-oculari; valde curvata, profunda. — *Caput* exsertum; frons subconvexa. — *Oculi* laterales, parvi, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine fere brevior, subcylindricus, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* mediocriter, apice rotundatum. — *Elytra* elongata, sublinearia, thoracis basi vix duplo latiora, quo quintuplo longiora, apice subacuminata, supra parum convexa, postice subdeclivia, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi; femoribus in medio incrassatis, aut dentatis, aut muticis; tibiis apice muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, unguibus minutis.

Typus: — *Metallites mollis* Germ. — Huc merito adnumerantur: *Curc. atomarius* Oliv. — *Muranus tibialis* et *vittiger* Megerle. — *Curc. Iris* Oliv.

A metallites metallicus.

Observatio. — Generi *Polydrosi* valde affine, rostri autem structura et antennarum diversa.

Genus 72. *Entyus* nob. — *Rembus* Germ.

Character generis: — Antennae longiusculae, graciles; scapus brevissimus, clavatus; articulo funiculi basali crassiusculo, reliquis magis tenuibus, subobconicis, 2o paullo longiore, sequentibus sensim brevioribus; clava oblonga, ovalis.

Rostrum capite paullo longius, crassiusculum.

Oculi subovati, depressi.

Thorax anterieus parum angustior, basi aut truncatus, aut sub-bisinuatus, lobi versus oculos subproducti.

Elytra magna, convexa; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* mediocris magnitudinis, subbreve; alatum. — *Antennae* thoracis basin attingentes, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o brevi; clavato, oculos vix attingente, 2^o crassiusculo, obconico, 3^o 8^o magis tenuibus, subobconicis, exterioribus sensim brevioribus, 3^o paullo longiore quam secundo; clava oblonga, subovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite dimidio longius, crassiusculum, nutans, subangulatum, apice vix incrassatum; scrobes lineares, subtus flexae, in medium rostri subtus conniventes. — *Oculi* laterales, subovati, depressi. — *Thorax* parvus, subcylindricus, anterieus paullo angustior, subtruncatus, basi aut subbisinuatus, aut truncatus, subtus pone gulam late, non vero profunde emarginatus, lobis ocularibus exiguis. — *Scutellum* mediocre, ovatum. — *Elytra* magna, thorace duplo latiora, quo quintuplo longiora, subovata, valde, praesertim posterius, convexa; humeris obtuse angulatis, aliquantulum extensis. — *Pedes* mediocres; femoribus subclavatis, muticis; tibiis teretibus, apice muticis; tarsis longis, spongiosis, articulo penultimo latiusculo, bilobo, ultimo clavato, biangulato.

Typus: — *Rembus auricinctus* Germ. — huc etiam pertinet: *Entyus albicinctus* nob.

Ab *Lyrio* adorno.

Observatio: — Generi *Polydrosi* affinis et propinquum est, sed discrepat corpore subbrevis, scapo etiam antennarum brevi, oculos non attingente, item thorace versus oculos producto.

*****) Genus 73. *Prostomus* Dalm. *Curculio* Fabr. Oliv. Herbst. Weber.

Character generis: — *Antennae* longiusculae; scapus oculos fere superans clavatus; articulis funiculi basalibus obconicis, ultimis subturbinatis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum crassum, angulatum, sulcatum.

Mandibulae exsertae, validae, arcuatae; inermes.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax suborbicularis, ab elytris remotus,

Elytra elongata, convexa, subcylindrica,

Tibiae anticae compressae, arcuatae, apice intus scutatae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, durum, sublineare, subcylindricum. — *Antennae* thoracis basin vix attingentes, versus apicem rostri insertae, fractae, minus tenues, 12-articulatae: articulo 1^o recto; clavato; oculos attingente, 2^o et 3^o elongatis, obconicis, 4^o–8^o brevibus, sub-turbinatis; clava oblonga, ovali, 4-articulata. — *Rostrum* capite longius, crassum, subangulatum, supra inaequale, apice subtruncatum; mandibulis exsertis, validis, arcuatis, inermibus, apice obtusis; scrobe percurrente, curvata, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* magnus, in medio elytrorum fere latitudine, suborbiculatus, pulvinatus, supra perparum convexus, infra pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* elevatum, tuberculiforme. — *Elytra* elongata, sublinearia, latitudine duplo longiora, supra convexa, versus apicem callosa; humeris subprominulis, obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, robusti; femoribus clavatis, muticis; tibiis anticis compressis, latiusculis, apice intus curvatis, scutatis, tibiae intermediae apice unco valido horizontali intus armatae; tarsis subtus spongiosis, latiusculis; articulo basali elongato, 2^o trigono, 3^o latiore, bilobo, ultimo clavato, valido, binnigulato.

Typus: — *Curc. scutellaris* Fabr. Oliv. — plures haud vidi.

Α πρόσωπος os habens porrectum.

Observatio: — Mandibulae exsertae, tibiae anticae compressae, apice scutatae, hoc genus primo adpectu proprium esse, et a reliquis hujus familiae bene distinctum, indicare videntur,

***** Genus 74. *Leptosomus* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv. Herbst.

Character generis: — *Antennae* mediocres, subtenuae; scapus clavatus, recurvatus, oculos superans; arti-

culis funiculi brevibus, aequalibus, subturbinatis; clava elongata, ovalis.

Rostrum capite multo brevius, apice valde incrassatum.

Caput valde elongatum, cylindricum.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax elongatus; cylindricus, angustus.

Elytra elongata, postice in spinas acutas dehiscentes terminata.

Descriptio: — *Corpus* valde elongatum, alatum. — *Antennae* capitis basin vix superantes, in medio rostri insertae, determinate fractae, 12-articulatae: articulo 1o elongato, recurvato, versus apicem incrassato, supra oculos sese extendente, 2o-8o brevibus, subobconicis l. turbinatis, subaequalibus; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* crassum, porrectum, capite multo brevius, apice valde incrassatum; scrobe lineari, profunda, subangulata, subtus flexa, pone inferum oculi canthum desinente. — *Caput* pone oculos valde elongatum, cylindricum, angustum, longitudine fere thoracis. — *Oculi* laterales, semi-globosi, modice prominuli. — *Thorax* valde elongatus, subcylindricus, elytris angustior, in medio paullulum coarctatus, antice posticeque truncatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* elongata, oblongo ovata, thorace duplo longiora, posterius angustata, apice in spinas acutas, divergentes producta; humeris oblique subangulatis. — *Pedes* longinuculi, validi, antiqui approximati; femoribus muticis, clavatis, tibiis teretibus, rectis, inermibus, tarsis subangulatis, subtus spongiis obsolete, articulis 1, 2 trigonis, penultimo paullo latiore, bilobo, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — Curc. acuminatus Fabr. Oliv. unicum speciem vidi.

A λεπτός tenuis, σῶμα corpus.

Observatio. Statura singularis, valde angusta, elongata: facies fere Generis Brenthi, sed antennae determinate fractae.

(*Divisio* 4a. Cleonides. Rostrum longiusculum, crassum, aut nutans, aut deflexum, plerumque teretiusculum, raro subangulatum, extrorsum saepius subincrassatum).

Subdivisio. 1a. Corpus saepissime alatum.

*) Genus 75. Cleonus nob. — Cleonis Dej. Meg. Fisch. — Lixus Illig. Germ. Latr. Oliv. — Epimeces Billb. — Curculio Auctorum ceterorum. — Geomorus nob. olim.

Character generis: — Antennae breviusculae, minus tenues; scapus oculos non attingens; articulo funiculi basali subobconico, sequentibus paullo longiore, 2^o-6^o brevibus, coarctatis, 7^o crassiore, clavae adpresso; clava suboblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breviusculum, crassiusculum, plerumque supra canaliculatum.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax subconicus, juxta apicem obsolete constrictus, antice leviter, basi saepe evidenter bisinuatus.

Elytra elongata, versus apicem plerumque callosa; apice ipso rotundata, in paucis acuminata.

Descriptio: — Corpus oblongum, in plerisque alatum, in paucis apterum, durum. — *Antennae* breviusculae, vix ad medium thoracis pertingentes, intra medium et apicem rostri insertae, validiusculae, arcuatae, parum fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, apice incrassato, 2^o reliquis paullo longiore, sub-obconico, 3^o 7^o brevibus, subaequalibus, transversis, coarctatis, 8^o multo crassiore, clavae adpresso; clava suboblongo-ovata, acuminata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breviusculum, subcrassum, deflexum, subarcuatum, perparum incrassatum, plerumque supra canaliculatum vel carinatum, apice ipso subtruncatum, erosum; scrobe percurrente, curvata, subtus flexa, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, oblongi, subdepressi, perpendiculariter positi. — *Thorax* versus basin longitudine fere latior; anterieus angustior, juxta apicem obsolete constrictus, lateribus vix rotundatus, basi plerumque evidenter bisinuatus, elytrorum basi paullo an-

gustior, supra modice convexus, apice ipso plerumque leviter bisinuatus, in medio productus, pone oculos lobis parum prominulis rotundatus, subtus pone gulam plus minusve emarginatus. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo fere quadruplo longiora, humeri subrotundati, parum prominuli, supra modice convexa, versus apicem saepe callosa, apice ipso rotundata, in paucis acuminata, anum occultantia. — *Pedes* mediocres, validi, subaequales, antici in nonnullis longiores; femoribus muticis, anterioribus crassioribus; tibiae teretes, apice paullo latiores, intus unco horizontali, valido armatae; tarsis saepius latiusculis, subtus spongiosis, articulis 1^o 2^o subtrigonus, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Stirps 1a. — Thorax pone oculos distincte lobatus.

Typus: — *Curc. sulcirostris* Linn. pluresque alii. Species mihi cognitae et huc pertinentes: *Curc. glacialis* Herbst — *Lix. clathratus* et *Arabs* Oliv. — *Curc. nebulosus*, *glaucus* et *obliquus* Fabr. — *Lix. tabidus* Oliv. — *Curc. tetragrammus* Pall. — *Curc. ophthalmicus* Fabr. — *Lix. grammicus* Oliv. — *Lix. segnis* Germ. — *C. Sannio* Herbst l. *mucidus* Germ. — *C. candidatus* Pall. — *Cleonus Gebleri* Stev. — *Cleon. microgrammus* Stev. — *Curc. flaviceps* Pall. — *Cleon. Dauricus* Stev.

Stirps 2a. — Thorax pone oculos indistincte l. non lobatus. Huc referri possunt: *Curc. roridus* Fabr. — *marmoratus* Fabr. *trisulcatus* Gyll. Inf. Suec. — *perlatus* Fabr. — *Lix. alternans*. Oliv. — *C. costatus* Fabr. — *Epimeces verrucicollis* Billb. — *Cleon. scutellatus* Bohem. an ab *κλεωνία* Helenium (herba) quod forte a *κλέων* nom. propr. vel ab *κλέος* gloria, nominis celebritas?

Observatio: — Rostro et antennis minus tenuibus aliterque constructis, atque corpore saepissime crassiore, a genere *Lixi*, cui praeterea est simile, differt.

Subgenus. *Bothynoderes* nob. — *Lixus* Oliv. Germ. —
Epimeces Billb. — *Clenonis* Dej. — *Curculio*
 Fabr. Gyllenh. et plures alii.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, minus tenues, fractae; scapo oculos subattingente, apice incrassato; articulus basalis funiculi brevis, crassiusculus, 2^o 1^{mo} duplo longior, subobconicus, 2-6 breves, transversi, coarctati, 7^o multo crassior, clavam fere incipiens; clava subfusiformi. — *Rostrum* capite longius, crassiusculum, sublineare, dedflexum, saepissime subrectum, nonnunquam subarcuatum, supra carinatum. — *Oculi* ovati, subdepressi. — *Thorax* anterieus angustior, juxta apicem constrictus, pone oculos rotunde lobatus, plus minusve productus, lateribus subrotundatus, basi bisinuatus, in medio baseos foveola impressus. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* oblonga, thoracis basi saepe paullo latiora, versus apicem callosa, apice ipso singulatim obtuse sub-acuminata vel subrotundata; humeris obtuse angulatis l. subrotundatis, in plerisque paullo prominulis. — *Tarsi* elongati, plerumque subcompressi, articulo penultimo bilobo, reliquis paullo latiore. — *Corpus* oblongum, alatum.

Stirps 1^a. *Antennae* validiusculae. *Rostrum* subrectum, supra in medio carinatum, apice ipso subtruncatum, perparum emarginatum. *Elytra* antice pone scutellum non impressa, apice ipso rotundata.

Typus: — *Cleonus* (Bothynod.) nubiculatus Bohem. n. sp. ejusdem stirpis sunt: tenebrosus, Punctum et strabus, nob. — *Sparmanni* Gyllenh. — *lucens* Besser. — *C. nigrivittis* Pall. — *C. cinereus* Herbst.

Stirps 2^a. *Antennae* magis tenues. *Rostrum* subrectum, supra in medio carinatum, apice ipso sinuatum, in medio lobo obtuse rotundato-producto, versus latera emarginatum. *Elytra* antice pone scutellum non impressa, apice ipso rotundata. *Tarsi* angustati, subtus haud spongiosi. — Proprium forsitan genus constituere potest.

Typus: — *Lixus Mimosae* Oliv.

Stirps 3^a. Rostrum subarcuatum, versus apicem subangustatum, supra in medio carinula abbreviata instructum, apice ipso subtruncatum, perparum emarginatum, margine saepius subreflexo. Elytra antice pone scutellum transversim impressa, apice ipso acuminata.

Typus: — *Curc. albidus* Auctor. Ad hanc stirpem referendum genus *Lixus declivis*. — *Lixus punctiventris* Germ.

Observatio: Quoad habitum et staturam omnino *Cleoni* generi simile est, sed articulo 3^o antennarum, qui secundo duplo est longior, atque thorace in medio bascos foveola impresso, differt.

Genus 76. *Chrysolopus* Germ. Dej. — *Curculio* Fabr., Oliv., Herbst.

Character generis: — Antennae breviusculae, validae; scapus oculos vix attingens; articulis funiculi brevibus, lenticularibus, crassitudine crescentibus; clava ovata.

Caput intus ad latera oculorum crista elevata instructum.

Rostrum elongatum, versus apicem incrassatum.

Oculi subdepressi, ovati.

Thorax oblongus, convexus, lateribus aequaliter rotundatus, antice late emarginatus, lobis pone oculos triangularibus productis.

Elytra oblonga; humeri angulati, nonnihil horizontaliter extensi.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, undique convexum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, versus apicem rostri insertae, validae, fractae, parce setosae; 12-articulatae; articulo 1^o elongato, apice incrassato, subcurvato, oculos vix attingente, 3-8 brevibus, lenticularibus, exterioribus sensim crassioribus; clava brevi, ovata, acuminata, 4-articulata. — *Caput* convexum, intus crista l. ruga ad latera oculorum elevata instructum. — *Rostrum* capite fere duplo longius, deflexum, crassum, teres, versus apicem sensim incrassatum; scrobe profunda, curvata, ab apice ad inferiorem rostri basin flexa. — *Oculi* sublaterales,

ovati, subdepressi, oblique positi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, juxta basin et apicem constrictus, lateribus valde rotundatus, margo posticus elevatus, supra modice convexus, antice late emarginatus, lobis lateralibus triangularibus, ad oculos productis notatus, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* distinctum, elongatum, subtriangulare. — *Elytra* oblonga, thoracis basi fere duplo latiora, sed illo quadruplo longiora, supra valde convexa, versus apicem subcallosa, ad latera fere recta, apice rotundata, anum suboccultantia; humeris rectangulatis, parum prominulis. — *Pedes* longi, validi, approximati; femoribus subclavatis, subtus dentatis; tibiis subcompressis, apice subdilatatis, oblique truncatis, extus penicillatis, unco subdeflexo, valido, acuto intus armatis; tarsis latiusculis, subtus spongiosis, articulis primis subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — *Curculio spectabilis* Fabr. Oliv. Una tantum species mihi cognita.

Α χρῦσος aureus, λονίς squama.

Observatio: — Statura fere generis *Hylobii* et specierum quarundam *Hypsonoti* generis, bene vero distinguitur: antennis crassiusculis, articulis 2-8 brevibus, apice truncatis. Caput intus ad latera oculorum crista elevata instructum. Thorax juxta basin et apicem constrictus.

Genus 77. *Rhytideres* nob. — *Curculio* Oliv. — *Cleonis* Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; scapus clavatus, oculos non attingens; articulis 1^{mis} funiculi obconicis, parum longis, 3-6 brevibus, nodosis, ultimo multo crassiore, clavae adpresso; clava oblonga, acuminata.

Rostrum elongatum, teres, supra canaliculatum, apice paullo incrassatum.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax oblongo-quadratus, subteres, lobi pone oculos producti, rotundati.

Elytra oblongo-ovata, basi conjunctim rotundatim - emarginata; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, alatum. — *Antennae* ad thoracis medium pertingentes, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, setosae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, incrassato, ocnlos non attingente; 2^o et 3^o parum longis, obconicis, 4^o-7^o brevibus, nodosis, apice truncatis, 8^o multo crassiore, clavae adpresso; clava oblonga, angusta, subovata, acuminata, 4-articulata, articulis aegre discernendis. — *Rostrum* capite duplo longius, deflexum, crassiusculum, teres, supra canaliculatum, apice paullo incrassatum, emarginatum; scrobe percurrente, subtus flexa, basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, oblongi, depressi, oblique positi. — *Thorax* elytris fere dimidio angustior, oblongo-subquadratus, subtères, lateribus subrectis, antice supra et pone gulam late emarginatus, lobis ocularibus productis, rotundatis. — *Scutellum* minutum, rotundatum, elevatum. — *Elytra* thoracis basi duplo latiora, illoque quadruplo longiora, basi simul introrsum rotundatim - emarginata, oblongo-ovata, convexa, versus apicem callosa, apice ipso subacuminata, anum tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, antici approximati: femoribus subclavatis, muticis; tibiis teretibus, apice intus unco valido horizontali armatis; tarsis angustatis, subcompressis, ciliatis, spongiis obsoletis, articulo penultimo bilobo, paullo latiore, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — *Curculio plicatus* Oliv. plures species non vidi.

A $\phi\upsilon\lambda\epsilon$ ruga, $\delta\epsilon\phi\eta$ collum.

Observatio: — Simile generi *Chrysolopi*, sed differt: antennarum articulis 2^o et 3^o obconicis, clava angusta, rostro canaliculato, thorace oblongo-quadrato, juxta basin et apicem haud constricto, scutello rotundato.

**) Genus 78. *Hypsonotus* Germ. — *Alocorhinus* Sahlb. — *Chrysolopus* Billb. — *Polydrusus*, *Merionus* et *Gastrodus* Dej. — olim *Aula-chorhinus* nob.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; scapus oculos attingens; articulis funiculi longiusculis, exterioribus sensim brevioribus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, subteres, utrinque canalicula dimidiata, ab oculo ad medium rostri ducta exaratum.

Oculi subovati, depressi.

Thorax aut subcylindricus, aut antrorsum angustior, antice in medio productus, lateribus versus oculos lobatus. —

Elytra oblonga, thorace partim dimidio, partim paullo latiora.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, interdum ovatum, posterius saepe gibbum, alatum. — *Antennae* ad thoracis basin fere pertingentes, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, oculos subattingente, apice paullo incrassato l. clavato, 2^o et 3^o longiusculis, quorum hic paullo longior est; reliqui exteriores gradatim sunt breviores, omnes aut obconici, aut subclavati; clava oblongo-ovata, angusta, acuminata, 4-articulata, articulis distinctis. — *Frons* saepe convexa. — *Rostrum* capite duplo longius, deflexum, validum, interdum subarcuatum, canalicula dimidiata, ab oculo ad medium rostri ducta, utrinque saepissime profunde exaratum, plerumque subteres, nonnihil angulatum, apice paullo incrassatum, supra in medio saepius carinatum, nonnunquam teres, haud carinatum; scrobe lineari, curvata, aut pone inferum oculorum canthum desinente, aut basi rostri subtus exeunte. — *Oculi* laterales, subovati, depressi, oblique positi. — *Thorax* aut subcylindricus, aut antrorsum angustatus, haud coarctatus, lateribus nonnihil rotundatus, basi subtruncatus, supra convexus, antice in medio productus, lobis lateralibus rotundatis, ad oculos prominentibus; subtus pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* oblonga, vel saepius oblongo-ovata, thoracis basi nunc fere dimidio, nunc paullo latiora, et illo triplo l. quadruple longiora, supra convexa, praesertim posterius, interdum gibba, margine laterali in medio sinuato; apice acumi-

nata, antum occultantia; humeris saepissime obtusè angulatis, raro vero subrotundatis. — *Pedes* longiusculi, subaequales, validi, basi approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anterioribus intus saepius crenulatis, omnibus apice unco nullo; tarsis subtus spongiosis, valde dilatatis, ciliatis, articulis primis trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. Rostrum subteres, in medio carinatum. Tibiae intus crenulatae.

Typus: — *Hypsonotus clavulus* Germ. — Con-
generici: *Hyps. loculosus*, *leucostictus* et *umbrosus* Germ. — *Alochorhinus comprimatus* Sahlb. Sub hac stirpe novem species adhuc indescriptae, mihi cognitae, omnes e Brasilia.

Stirps 2a. Rostrum subteres, in medio canaliculatum. Tibiae intus haud crenulatae.

Typus: *Leucon Boeberi* Besser in Litt.

Stirps 3a. Rostrum teres, haud carinatum. Tibiae intus crenulatae.

Typus: — *Alochorhinus clericus* Sahlb. l. *Hypsonot. scenicus* Germ.

Observatio: — Genus *Hylobii* huic simillimum est et affine, sed hoc praecipue differt: articulis antennarum 2-8 omnibus obconicis, clava angustiore, tibiis apice muticis.

Subgenus *A. Eurylobus* nob. — *Gastrodus* Dej. — *Hypsonotus* Germ.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, tenues; articulis funiculi obconicis, gradatim brevioribus; clava oblongo-ovata. — *Rostrum* elongatum, aut subteres aut angulatum; scrobe pone inferum oculorum canthum exeunte. — *Oculi* ovati, depressi, majusculi. — *Thorax* oblongus, anterieus angustior, late emarginatus, in medio paullo prominulus, lateribus rotundatus, infra ante pedes anticos late excavatus, argute marginatus, lobis ocularibus eximiis, dependentibus. — *Scutellum* distinctum, triangulare. — *Elytra* aut oblongo-ovata, supra convexa, aut elongata, subcom-

primata, margine laterali in medio sinuato, humeris obtuse angulatis. — *Corpus* ovatum, vel elongatum, alatum.

Typus: — *Hypsonot. cingulatus* et idm var. *Hypson. canephorus* Germ. — Congenericus. *C. elegans* Kirby in litt.

Ab *εὐρύς* latus, amplus, *λοβός* ima auris pars.

Observatio: — Generi *Hypsonoti* genuini simillimum hoc subgenus, sed canalicula ab oculis descendens deest; thorax subtus ante pedes manifeste excavatus, et lobi pone oculos dependentes, quare hoc subgenus a supra commemorato separavi.

Subgenus B. *Lordops* nob. — *Hypsonotus* Germ.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, subtenuēs; scapo oculos attingente, clavato; articulis primis funiculi longiusculis, reliquis brevibus, omnibus obconicis; clava oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* capite plus duplo longius, eique subcontiguum, nutans, subteres, convexiusculum, versus apicem attenuatum; canalicula ab oculis ducta, saepius ante medium rostri desinente, utrinque exaratum. — *Oculi* rotundati, subdepressi. — *Thorax* anterieus angustior, apice late emarginatus, pone oculos valde prolixè lobatus, subtus pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thorace plerumque paullo latiora, convexa, versus apicem saepius gibba, subcompressa, acuminata, margine laterali in medio sinuato.

Typus: — *Curc. Schoenherri* Dalm. l. *Hypson. principalis* Germ. — Congenerici: *Hypson. aurosus* et *navicularis* Germ. — *Curc. Gyllenhalii*. Dalm. l. *Hypson. dives* Germ. — *Hypson. (Cordops) jucundus* et *infacetus* nob.

A *λοβός* curvus, cernuus, *ὤψ* facies.

Observatio: Valde affine generi *Hypsonoti* geminū, sed discrepat: antennis paullo brevioribus, oculis rotundatis, rostro capite magis contiguo, versus apicem attenuato.

Subgenus C. *Lasiopus* nob. Sahlb. — *Polydrusus* Dejean.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, subtenues; scapo oculos fere attingente, sensim incrassato; articulis funiculi longiusculis, obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava oblongo-subovata, acuminata. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, subteres, versus apicem parum incrassatum; scrobe profunda, percurrente, pone canthum inferum oculorum ad basin rostri desinente. — *Oculi* ovati, parum prominuli. — *Thorax* oblongus, convexus, apice angustatus, pone oculos lobatus, basi leviter bisinuatus, marginatus, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* subtriangulare. — *Elytra* thorace fere dimidio latiora, sed illo quadruplo longiora, antice introrsum conjunctim paullo emarginata, versus apicem sensim angustiora, apicē ipso subrotundata, dorso planiuscula, margine laterali in medio sinuato; humeris oblique angulatis. — *Pedes* longiusculi, robusti; femoribus clavatis, muticis; tibiis compressis, intus crenulatis, anticis apice parum incurvatis, posticis intus dense pilosis, in uno sexu, quem puto esse marem, apice unco horizontali, minuto intus instructis.

Typus: — *Lasiopus cilipes* Sahlb. — nec plures species vidi.

Α λάσιος hirsutus, ποὺς pes.

Observatio: — Cum Hypsonoti genuino genere magnam habet similitudinem, praesertim respectu antennarum structurae, at vero dubia videtur affinitas nobis sequentes considerantibus discrepantias: thorax postice marginatus, leviter bisinuatus, elytra apice obtusa nec acuminata et tibiae, unius saltem sexus, apice unco parvo armatae.

Genus 79. *Lepropus* nob. — *Curculio* Fabr. Oliv. — *Menoetius* Dej.

Character generis: — *Antennae* breviusculae, subtenues; scapus oculos subattingens, incrassatus; articulis funiculi basalibus obconicis, 2^o longiore, 3-6 brevibus, lenticularibus, 7^o crassiore, turbinato; clava oblonga, ovalis, acuminata.

Rostrum deflexum, breve, crassum, supra planum, canaliculatum.

Oculi subrotundati, modice prominuli.

Thorax anterus angustior, lateribus rotundatus, antice posticeque truncatus, basi marginatus, supra convexus.

Elytra oblongo-ovata, antice introrsum subemarginata; humeri obtusi, subrotundati.

Pedes antici longiores, robusti.

Tibiae intus valde crenulatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, alatum. — *Antennae* ad thoracis medium pertingentes, pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o oculos subattingente, recto, crasso, clavato, 2^o et 3^o obconicis, hoc longiore, 4-7 brevioribus, lenticularibus, 8^o paullo crassiore, obconico; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, longitudine capitis, 3^o vero paullo angustius, deflexum, supra subplanum, arcuatum, in medio canaliculatum, apice emarginatum, ciliatum; scrobe profunda, arcuata, subtus flexa, ante inferum oculi marginem desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, anterus nonnihil angustior, lateribus parum rotundatus, antice posticeque truncatus, basi marginatus, supra modice convexus, pone oculos non lobatus, subtus pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* minutum, rotundatum. — *Elytra* thorace vix dimidio latiora, et illo fere quadruplo longiora, oblongo-ovata, antice introrsum paullo emarginata, supra modice convexa, apice subrotundata, anum occultantia; humeris obtusis, subrotundatis. — *Pedes* validi, basi approximati, femoribus anticis magnis, posterioribus minoribus; omnibus in medio incrassatis, muticis; tibiis subteretibus, intus evidenter crenulatis, anticis longioribus, versus apicem arcuatis, apice interiore unco armatis, posticis apice dilatatis, truncatis; tarsis latis, subtus spongiosis, articulis 1^o-2^o trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curculio lateralis*? Fabr. Unam tantum speciem vidi.

A λεπρός asper, πούς pes.

Observatio: — Generi Eustalis fere simile, sed differt: articulis funiculorum subnodosis, thorace postice truncato, tibiis anticis intus valde crenulatis. Generi Geophilii affine quidem, sed corpus alatum antennarumque structura est aliena.

***) Genus 80. *Aterpus* nob. — olim *Aades* nob. — *Curculio* Fabr. Oliv. Herbst. — *Rhynchaeus* Oliv.

Character generis: — Antennae mediocres; articulus basalis funiculi insequente duplo longior, subclavatus, 2^a subobconicus 3^a-6^a breves, apice truncati, 7. crassior, clavam incipiens; clava ovata.

Rostrum breve, crassum, apice subtruncatum, erosum.

Oculi rotundati, non prominuli.

Thorax oblongus, basi subtruncatus, antice productus, supra convexus, infra profunde emarginatus.

Scutellum punctiforme, elevatum.

Elytra oblonga, subovata; humeri rectangulati.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, durum, exsculptum, tuberculatum, alatum. — *Antennae* ad thoracis medium pertingentes, versus apicem rostri insertae, subtenuae, fractae, setosae, 12-articulatae; articulo 1^o clavato, oculus subattingente, 2^o longiusculo, subclavato, 3^o paullo brevior, obconico, 4-7 brevibus, subturbinatis, 8^o crassiore, clavam incipiente; clava ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* breve, crassum, subinflexum, apice subtruncatum, erosum; scrobe in apice incipiente, profunda, pone canthum oculi exeunte. — *Oculi* laterales, rotundati, subdepressi. — *Thorax* latitudine longior, antice productus, lateribus rotundatus, supra convexus basi subtruncatus, subtus pone gulam late et profunde emarginatus, lobis ocularibus valde prolixis. — *Scutellum* minutum, punctiforme, elevatum. — *Elytra* oblonga, thorace fere dimidio latiora, quo triplo longiora, sublinearia, convexa, rigida, inaequalia; apice rotundata, anum occultantia; humeris rectangulatis, parum prominulis. — *Pedes* longiusculi, validi, antici subdistantes; femoribus muticis, in

medio incrassatis, tibiis teretibus, rectis, apice muticis; tarsis latis, subtus spongiosis, unguibus brevibus.

Typus: — *Curc. cultratus* et *bicriatus* Fabr. nec plures vidi.

Ab *ἀρεστος* injucundus.

Observatio: — Cum secundi antenniarum articuli longitudine, tum etiam rostro apice subtruncato, thorace antice producto et basi truncato, atque scutello elevato; hoc genus praecipue distinguitur.

Genus 81. *Gronops* nob. — *Bagous* Germ. Dej. —

Aulacus Meg. — *Curculio* Fabr. Oliv. Herbst. —

Rhynchaenus Gyllenh. Ahrens.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; scapus oculos non attingens, clavatus; articulo basali funiculi longiusculo, obconico; 2-6 brevissimis nodosis, coarctatis, 7^o crassissimo, clava crassa, subovata.

Rostrum longiusculum, crassum.

Oculi oblongi, immersi.

Thorax subcylindricus, pone oculos lobatus.

Elytra postice declivia, callosa; humeri angulati.

Tibiae rectae, apice submuticae; tarsi angustati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, angulatum, supra inaequale, minoris magnitudinis. — *Antennae* breves, ad thoracis medium pertinentes, versus medium rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o clavato, oculos non attingente, 2^o longiusculo, obconico, apice incrassato, 3^o-7^o brevissimis, nodosis, valde coarctatis, exterioribus sensim paullo crassioribus, 8^o crassissimo, clavae basin mentiente; clava magna, ovata, 4-articulata, articulis aegre discernendis. — *Rostrum* deflexum vix longitudine thoracis, crassum, subarcuatum; scrobe lineari, curvata, pone inferum oculi canthum excurrente. — *Oculi* laterales, oblongi, immersi, magni. — *Thorax* latitudine fere longior, subcylindricus, antice late emarginatus, postice anbbisignatus, supra parum convexus, inaequalis, lobis ocularibus eximilis, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* par-

vum, subelongatum. — *Elytra* thorace fere duplo latiora, quo plus triplo longiora, supra parum convexa, postice declivia, callosa, apice rotundata, pygidium tegentia; humeris rectangulatis. — *Pedes* longiusculi, validi, basi approximati, femoribus clavatis, muticis; tibiis breviusculis, teretibus omnino rectis, apice unco minutissimo armatis; tarsiis angustatis, subtus haud spongiosis, ungue biunguiculato.

Typus: — *Curc. lunatus* Fabr. l. *Rhynchaem. costatus* Gyllenh. Una tantum species mihi cognita.

A γερῶνος profundus, ὠψ oculus.

Observatio: — Quoad habitum generi *Bagoi* (infra, inter Legionem *Mecorhynchorum*) simile, sed rostrum aliter constructum et tibiae rectae, apice solummodo unco minutissimo armatae.

Genus 82. *Listroderes* nob. — *Merionus* Dej.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, subtenues; scapus oculos attingens; articulis primis funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subturbinatis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum elongatum, crassiusculum, versus apicem sensim incrassatum.

Oculi magni, subovati, subdepressi.

Thorax antice latior, late emarginatus, supra subplatus, pone oculos lobatus.

Elytra elongata, sublinearia, dorso antico planiuscula, versus apicem acute callosa.

Tarsi elongati, subtus vix spongiosi.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, supra parum convexum, alatum. — *Antennae* longitudine fere thoracis una cum capite, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, parce rigide pilosae, 12-articulatae; articulo 1^o valde clavato, oculos attingente, 2^o et 3^o longioribus, obconicis, subaequalibus, 4^o-8^o brevioribus, subturbinatis, exterioribus sensim crassioribus; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata, articulis distinctis. — *Rostrum* longitudine fere thoracis, deflexum, crassiusculum, nonnihil arcuatum, su-

pra carinatum, versus apicem aliquantisper sensim incrassatum, apice ipso leviter emarginatum; scrobe percurrente, subcurvata, paulatim subtus flexa ibique obsolete, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* magni, laterales, subovati, subdepressi. — *Thorax* antice, praesertim in sexu feminino latior, basi subrotundatus, antice late emarginatus et pone apicem constrictus, deinde valde ampliatus, posterius sensim angustatus, angulis baseos rotundatus, supra subplanus, aequalis, pone gulam profunde emarginatus, lobis ocularibus eximie prominentibus, rotundatis. — *Scutellum* subelongatum, apice rotundatum, depressum. — *Elytra* elongata, sublinearia, thoracis basi dimidio latiora, quo quadruplo longiora, antice introrsum simul parum emarginata, dorso antico subdeplanata, versus apicem acute callosa, apice ipso obtuse rotundata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Abdomen* in masculo juxta basin concavum. — *Pedes* longiusculi, validi, antici approximati; femoribus subincrassatis, muticis; tibiis subteretibus, intus crenulatis, anticis apice unco minutissimo intus instructis; tarsis elongatis, praesertim posticis angustatis, pilosis, articulo penultimo latiore, bilobo, subtus vix spongioso, ultimo longissimo, valido, clavato, biunguiculato, unguibus validis.

Typus: — *Listrod. costirostris* Gyllenh. n. sp. *Hypera insubida* Germ. in litt. e Rio Janeiro. — Nullam praeter hanc speciem vidi.

Α λιστροδω complano, δέση collum

Observatio: — Ratione habitus simile fere est generi *Phytonomi* (infra n. 94.) sed differt thorace antice latiore, supra subplano, elytris dorso antico planiusculis. —

Ex habitu tarsorumque forma credibile est, hoc insectum in plantis aquatilibus vivere.

Subdivisio 2a. Corpus semper apterum.

*** Genus 83. *Liophloeus*. Germ. — *Gastrodus* Megerle, Dej. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenuae; scapus clavatus, ultra oculos sese erigens; articulis

feniculi basalibus longiusculis, obconicis, reliquis gradatim brevioribus, turbinatis; clava suboblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breve, teres, apice crassius.

Oculi rotundati, parum prominuli.

Thorax transversus, antice posticeque truncatus, lateribus valde rotundatus, supra in medio transversim convexus.

Elytra ampla, valde convexa, aequalia; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, molliusculum, apterum. — *Antennae* thoracis basin attingentes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o clavato, thoracis marginem anticum tangente, 2-5 obconicis, exterioribus sensim brevioribus, 6-8 brevibus, turbinatis; clava elongato-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* nutans, subcrassum, teres, capite longius, versus apicem incrassatum; scrobes valde curvatae mox subtus flexae, in medium rostri subtus cœuntes. — *Oculi* laterales, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* brevis, anterieus augustior, obsolete coarctatus, basi apiceque truncatus, lateribus valde ampliato rotundatus, supra in medio transversim convexus, subtus integer. — *Scutellum* mediocre, triangulare, distinctum. — *Elytra* magna, antice truncata, thoracis basi fere dimidio latiora, quo vero quadruplo longiora, supra, praesertim posterius, valde convexa, apice acuminata, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, validi, femoribus clavatis, dente parvo armatis; tibiis teretibus apice dilatatis, truncatis, muticis; tarsis latis, subtus distincte spongiosis, ciliatis, articulo basali oblongo, trigono, penultimo latiore, bilobo, ungue biunguiculato.

Typus: — *Curc. nubilus* Fabr. Congenericus: *Liphloeus lentus* Germ.

A λείος laevis, *φλοιός* cortex.

Observatio: — *Barynoti* generi proximum, sed discrepat: corpore magis convexo; antennis longioribus, oculis rotundatis, magis prominulis, scutello manifeste perspicuo, elytris antice truncatis, haud emarginatis, tibiis apice muti-

cis. A Genere *Otiiorhynchi*, cui quoque simile, differt forma rostri alia et canalicula antennali curvata.

Genus 84. *Geophilus* nob. — *Curculio* Fabr.

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenuae; scapus sensim incrassatus oculos superans; articulis primis funiculi longiusculis, omnibus obconicis; clava parva, oblongo-ovata.

Rostrum breve, crassum, subteres.

Oculi subrotundati, modice prominuli.

Thorax antice posticeque truncatus, antierius vix angustior, lateribus parum rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, modice convexa, praesertim posterius.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, durum, apterum. — *Antennae* ad thoracis basin pertinentes, versus apicem rostri insertae, subtenuae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o recto, oculos superante, versus apicem sensim incrassato, 2^o et 3^o longiusculis, 4^o-8^o breviusculis, omnibus subobconicis; clava parva, oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite dimidio longius, crassum, subdeflexum, subteres, supra subplanum, saepius longitudinaliter canaliculatum, apice profunde triangulariter emarginatum, ciliatum; scrobe profunda, curvata, pone marginem oculorum inferum desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, antice posticeque truncatus, antierius vix angustior, in nonnullis coarctatus, lateribus paullo rotundatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* parvum, rotundatum, subelevatum. — *Elytra* thorace fere quadruplo longiora et illo paullo latiora, oblongo-ovata, antice saepius junctim subemarginata, supra, praesertim posterius, modice convexa, pygidium tegentia; humeris saepius obsolete, in quibusdam obtuse subangulatis. — *Pedes* validi, longitudine subaequales, basi approximati; femoribus paullo incrassatis, muticis; tibiis teretibus, intus crenulatis, anterioribus apice unco horizontali, brevi armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ungue biunguiculato.

Typus: — *Geophilus virgatus* nob. — Huc quoque referri possunt: *Curculio 8-tuberculatus* Fabr. — *Geoph. illaetabilis* et *terrenus* nob.

A γῆα terra, φίλος amicus.

Observatio. — Generi *Lepropi* simillimum est, sed differt praecipue corpore aptero, rostri antennarumque structura longiore et alicna.

*****) Genus 85. *Rhytirrhinus* nob. — *Curculio* Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; scapus clavatus, oculos attingens; articulo funiculi basali clavato, 2° obconico, 3-6 lenticularibus, 7° crassiore, subturbinato; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, angulatum, canaliculatum, inaequale, subarcuatum.

Oculi ovati, immersi.

Thorax subrotundatus, antice in medio productus, lobi laterales ad oculos prominentes.

Elytra subovata, basi introrsum subemarginata, inaequalia.

Tarsi angustati, setosi, spongiis nullis.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, crassum, durum, tuberculatum l. inaequale, apterum. — *Antennae* vix ultra thoracis mediam extensae, juxta apicem rostri insertae, subtenuae, pilis raris adpersae, fractae, 12-articulatae; articulo 1° clavato, recto, oculos attingente, 2° longiusculo, quoque clavato, 3° minore, obconico, 4-7 brevibus, lenticularibus, 8° multo crassiore, subturbinato, clavae subadpresso; clava 4-articulata, oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, subangulatum, canaliculatum, inaequale, subarcuatum, ante oculos utrinque tuberculo saepius corniformi instructum, versus apicem in plerisque subincrassatum, in aliis vero apice ipso utrinque dilatatum, in medio paullo emarginatum; scrobe percurrente, parum curvata, minus profunda, versus inferum oculi marginem desinente. — *Oculi* laterales, parvi, ovati, immersi. —

subrotundatus, antice vix angustior, in medio plus productus, basi subtruncatus, lateribus valde rotundatus, parum convexus, lobis ad oculos subangulatis, is. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* subovata, aequalia triplo l. quadruplo longiora, quo dimidio vix simul rotundatim subemarginata, supra aequalia, juxta apicem coarctata, apice antrum occultantia; humeris aut retusis, breviusculi, validi, antici basi applanatis, in medio vix crassiusculi, subtus emarginatis; tibiis omnibus subcompressis, apice truncatis, unco armatis; tarsis angustatis, setosis, haud spongiosis, angustis, biunguiculatis.

Typus: *Curc. inaequalis* Fabr. Huc etiam species mihi visae referuntur: *Rhytirrh. turpis* et *nodifrons* nob.

A *quarta* ruga *quarta* nasus.

Observatio: — Geni *Cryptopis* (in *Legione Orthoceridum*) nonnihil simile, structura vero antennarum forma dissimili rostri, et absentia canaliculae pectoralis hocce genus a genere supra commemorato satis bene distinguitur.

Genus 86. *Minyops* nob. — *Plinthus* Germ. — *Liparus* Oliv. — *Curculio* Fabr. Ross. *Melanus* Dej.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; scapus clavatus, oculos non attingens; articulo basali funiculi obconico, reliquis brevibus, subperfoliatis, crassitudine crescentibus; clava breviter ovata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, subteres, apice parum incrassatum.

Oculi parvi, oblongi, immergi.

Thorax suborbiculatus, supra subplanus.

Elytra connata, subovata, supra parum convexa, dorso subplano, antice introrsum conjunctim paullo emarginata; humeri antrorsum prominuli.

Tarsi angustati, haud spongiosi.

Typus: — *Geophilus virgatus* nob. — Huc quoque referri possunt: *Curculio 8-tuberculatus* Fabr. — *Geoph. illaetabilis* et *terrenus* nob.

A γῆα terra, φίλος amicus.

Observatio. — Generi *Lepropi* simillimum est, sed differt praecipue corpore aptero, rostri antennarumque structura longiore et aliena.

*****) Genus 85. *Rhytirrhinus* nob. — *Curculio* Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; scapus clavatus, oculos attingens; articulo funiculi basali clavato, 2° obconico, 3-6 lenticularibus, 7° crassiore, subturbinato; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, angulatum, canaliculatum, inaequale, subarcuatum.

Oculi ovati, immersi.

Thorax subrotundatus, antice in medio productus, lobi laterales ad oculos prominentes.

Elytra subovata, basi introrsum subemarginata, inaequalia.

Tarsi angustati, setosi, spongiis nullis.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, crassum, durum, tuberculatum l. inaequale, apterum. — *Antennae* vix ultra thoracis medium extensae, juxta apicem rostri insertae, subtenuae, pilis raris adpersae, fractae, 12-articulatae; articulo 1° clavato, recto, oculos attingente, 2° longiusculo, quoque clavato, 3° minore, obconico, 4-7 brevibus, lenticularibus, 8° multo crassiore, subturbinato, clavae subadpresso; clava 4-articulata, oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, subangulatum, canaliculatum, inaequale, subarcuatum, ante oculos utrinque tuberculo saepius corniformi instructum, versus apicem in plerisque subincrassatum, in aliis vero apice ipso utrinque dilatatum, in medio paullo emarginatum; scrobe percurrente, parum curvata, minus profunda, versus inferum oculi marginem desinente. — *Oculi* laterales, parvi, ovati, immersi. —

Thorax subrotundatus, antice vix angustior, in medio plus minusve productus, basi subtruncatus, lateribus valde rotundatus, supra parum convexus, lobis ad oculos subangulatis, valde productis. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* subovata, coadunata, thorace triplo l. quadruplo longiora, quo dimidio latiora, basi saepe simul rotundatim subemarginata, supra modice convexa, inaequalia, juxta apicem coarctata, apice ipso obtuse rotundata, anum occultantia; humeris aut retusis, aut obsoletis. — *Pedes* breviusculi, validi, antici basi approximati; femoribus sublinearibus, in medio vix crassiusculis, muticis, ante apicem subtus emarginatis; tibiis omnibus rectis, crassiusculis, subcompressis, apice truncatis, unco minuto intus armatis; tarsis angustatis, setosis, haud spongiosis, unguibus angustis, biangulatis.

Typus: *Curc. inaequalis* Fabr. Huc etiam species mihi visae referuntur: *Rhytirrh. turpis* et *nodifrons* nob.

A *quarta* ruga *quarta* nasus.

Observatio: — Geni Cryptopis (in Legione Orthoceridum) nonnihil simile, structura vero antennarum forma dissimili rostri, et absentia canaliculae pectoralis hocce genus a genere supra commemorato satis bene distinguitur.

Genus 86. *Minyops* nob. — *Plinthus* Germ. — *Liparus* Oliv. — *Curculio* Fabr. Ross. *Meleus* Dej.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; scapus clavatus, oculos non attingens; articulo basali funiculi obconico, reliquis brevibus, subperfoliatis, crassitudine crescentibus; clava breviter ovata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, subteres, apice parum incrassatum.

Oculi parvi, oblongi, immersi.

Thorax suborbiculatus, supra subplanus.

Elytra connata, subovata, supra parum convexa, dorso subplano, antice introrsum conjunctum paullo emarginata; humeri antrorsum prominuli.

Tarsi angustati, haud spongiosi.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, durum, apterum. — *Antennae* breves, crassiusculae; rigide pilosae, ad thoracis medium vix attingentes, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1° clavato, oculos non attingente, 2° obconico, 3-8 brevibus, subperfoliatis, versus apicem gradatim latioribus, ultimo clavam quasi incipiente; clava breviter ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* longitudine fere thoracis, deflexum, crassiusculum, subteres, nonnihil arcuatum, apice parum incrassatum, apice ipso subtruncatum; scrobe profunda, lata, obliqua, ante apicem incipiente, in basin rostri pone inferum oculi marginem exeunte. — *Oculi* laterales, parvi, oblongi, immersi. — *Thorax* subtransversus, basi apiceque truncatus, lateribus ante medium valde rotundato-dilatatus, posterius angustior, supra aliquantulum planus, inaequalis, subtus pone gulam profunde emarginatus, lobis ocularibus exiguis, productis. — *Scutellum* haud perspicue ullum. — *Elytra* connata, ovata, antice thoracis basi paullo latiora, quo vix triplo longiora, basi introrsum conjunctim rotundato-emarginata, versus apicem subattenuata, margine laterali inflexo, supra parum convexa, dorso subplano apice ipso obtusa, anum occultantia; humeris antrorsum prominulis, subrotundatis. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus subclavatis, muticis; tibiis teretibus, apice truncatis, unco subhorizontali, acuto intus armatis; tarsis angustatis, subtus parce setosis, haud spongiosis, articulo ultimo longo, crasso, biungiculato.

Typus: — *Liparus carinatus* Oliv. l. *Curc. variolosus* Fabr. Nec praeter hanc ullam speciem vidi.

A *μικρός* parvus, exilis, *ὦψ* oculus.

Observatio: — Habitu fere simile generi *Plinthi*, sed distinguitur antennarum articulis 3-8 subperfoliatis, tarsis angustatis, setosis, haud spongiosis.

*****) Genus 87. *Barynotus* Germ. — *Brius* Meg.

Dej. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — *Antennae* mediocres, minus tenues, scapus clavatus, oculos attingens; articulis fomiculi

Thorax subrotundatus, antice vix angustior, in medio plus minusve productus, basi subtruncatus, lateribus valde rotundatus, supra parum convexus, lobis ad oculos subangulatis, valde productis. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* subovata, coadunata, thorace triplo l. quadruplo longiora, quo dimidio latiora, basi saepe simul rotundatim submarginata, supra modice convexa, inaequalia, juxta apicem coarctata, apice ipso obtuse rotundata, anum occultantia; humeris aut retusis, aut obsoletis. — *Pedes* breviusculi, validi, antichi basi approximati; femoribus sublinearibus, in medio vix crassiusculis, muticis, ante apicem subtus emarginatis; tibiis omnibus rectis, crassiusculis, subcompressis, apice truncatis, unco minuto intus armatis; tarsis angustatis, setosis, haud spongiosis, unguibus angustis, biunguiculatis.

Typus: Curc. inaequalis Fabr. Huc etiam species mihi visae referuntur: Rhytirrh. turpis et nodifrons nob.

A *quarta* ruga *quarta* nasus.

Observatio: — Generi Cryptopis (in Legione Orthoceridum) nonnihil simile, structura vero antennarum forma dissimili rostri, et absentia canaliculae pectoralis hocce genus a genere supra commemorato satis bene distinguitur.

Genus 86. *Minyops* nob. — *Plinthus* Germ. — *Liparus* Oliv. — *Curculio* Fabr. Ross. *Meleus* Dej.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; scapus clavatus, oculos non attingens; articulo basali funiculi obconico, reliquis brevibus, subperfoliatis, crassitudine crescentibus; clava breviter ovata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, subteres, apice parum incrassatum.

Oculi parvi, oblongi, immersi.

Thorax suborbiculatus, supra subplanus.

Elytra connata, subovata, supra parum convexa, dorso subplano, antice introrsum conjunctim paullo emarginata; humeri antrorsum prominuli.

Tarsi angustati, haud spongiosi.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, durum, apterum. — *Antennae* breves, crassiusculae; rigide pilosae, ad thoracis medium vix attingentes, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1° clavato, oculos non attingente, 2° obconico, 3-8 brevibus, subperfoliatis, versus apicem gradatim latioribus, ultimo clavam quasi incipiente; clava breviter ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* longitudine fere thoracis, deflexum, crassiusculum, subteres, nonnihil arcuatum, apice parum incrassatum, apice ipso subtruncatum; scrobe profunda, lata, obliqua, ante apicem incipiente, in basin rostri pone inferum oculi marginem exeunte. — *Oculi* laterales, parvi, oblongi, immersi. — *Thorax* subtransversus, basi apiceque truncatus, lateribus ante medium valde rotundato-dilatatus, posterius angustior, supra aliquantulum planus, inaequalis, subtus pone gulam profunde emarginatus, lobis ocularibus exiguis, productis. — *Scutellum* haud perspicue ullum. — *Elytra* connata, ovata, antice thoracis basi paullo latiora, quo vix triplo longiora, basi introrsum conjunctim rotundato-emarginata, versus apicem subattenuata, margine laterali inflexo, supra parum convexa, dorso subplano apice ipso obtusa, anum occultantia; humeris antrorsum prominulis, subrotundatis. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus subclavatis, muticis; tibiis teretibus, apice truncatis, unco subhorizontali, acuto intus armatis; tarsis angustatis, subtus parce setosis, haud spongiosis, articulo ultimo longo, crasso, biunguiculato.

Typus: — *Liparus carinatus* Oliv. l. *Curc. variolosus* Fabr. Nec praeter hanc ullam speciem vidi.

Α μικρὸς parvus, exilis, ὠψ̄ oculus.

Observatio: — Habitu fere simile generi *Plinthi*, sed distinguitur antennarum articulis 3-8 subperfoliatis, tarsis angustatis, setosis, haud spongiosis.

*****) Genus 87. *Barynotus* Germ. — *Brius* Meg.

Dej. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — *Antennae* mediocres, minus tenues, scapus clavatus, oculos attingens; articulis funiculi

basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subnodosis; clava oblongo-ovata.

Rostrum breviusculum, crassiusculum, subteres, apice paullo crassius.

Oculi subrotundati, depressi.

Thorax subtransversus, antice posticeque truncatus, lateribus rotundatus.

Elytra subovata, basi introrsum emarginata; humeri antrorsum prominuli, sutura versus apicem carinato-elevata.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, convexum, apterum. — *Antennae* ad thoracis basin haud pertingentes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculorum medium attingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, subnodosis, crassitudine vix crescentibus, clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite paullo longius, crassiusculum, subteres, supra aliquantulum planum, apice paullo incrassatum; scrobe percurrente, curvata, lata, subtus flexa, in inferiore parte rostri pone oculum desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, depressi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, anterieus paullo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, subtus pone gulam parum emarginatus, in paucis pone oculos sublobatus. — *Scutellum* minutum aegre observandum. — *Elytra* breviter ovata, arcte coadunata, thorace paullo latiora, quo triplo longiora, basi introrsum conjunctim rotundato-emarginata, humeris antrorsum prominulis; lateribus ampliato-rotundata, margine laterali inflexo, in medio subsinuato, dorso antico parum convexa, juxta apicem coarctata, in plerisque subcompressa, unde sutura postice elevata, carinata. — *Pedes* mediocres, validi, aequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, anticis intus sinuatis, apice unco minutissimo armatis; tarsis parum dilatatis, subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ungue brevi, biunguiculato.

Typus: — Curc. obscurus Fabr. Huc quoque referuntur: Baryn. Bohemanni Gyllenh. — Baryn. squa-

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* breviusculae, medium thoracis vix attingentes, versus apicem rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae: articulo primo elongato, oculos non attingente, clavato, 2^o et 3^o obconicis, sequentibus quatuor paullo longioribus, 4^o-7^o brevibus, subnodosis, apice truncatis, 8^o crassiore, cyathiformi, clavae basin mentiente; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* elongatum capite plus duplo longius, subdeflexum, teretiusculum, subtenue, versus apicem sensim incrassatum; scrobe obliqua, pone inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* breviter conicus, anterieus multo angustior, basi apiceque subtruncatus, lateribus parum rotundatus, supra parum convexus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi fere dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, antice introrsum conjunctim subemarginata, supra parum convexa, versus apicem subcallosa, nonnihil attenuata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis, subrotundatis, antrorsum prominulis. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validiusculi; femoribus subclavatis, obsolete dentatis; tibiis teretiusculis, apice unco horizontali, valido intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, unguiculari, longo, angusto, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen: Colón Fabr. Gyllenh. — Congenericus: Curc. binotatus — Fabr.

A λενυρός, corticosus, horrens gluma.

Observatio: — Ratione habitus et staturae proximum est generi Alophi, a quo tamen discrepat: alato corpore, rostro magis tenui, articulis antennarum aliter constructis.

Genus 90. *Tanysphyrus* Germ. Dej. — Rhynchaen. Fabr., Gyllenh. — *Curculio* Herbst, Payk. —

Character generis: — *Antennae* mediocres, subtenues; scapus oculos subattingens; articulo funiculi basali crasso, brevi, 2^o obconico 3^o-6^o minutis, transversis, co-

arctatis; clava magna, subglobosa, articulis arctissime connexis.

Rostrum elongatum, validum, teres, arcuatum.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax convexus, lateribus nonnihil rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, apice attenuata, declivia; humeri rectangulati.

Tarsi subcoarctati, ungue brevissimo.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, alatum, minoris magnitudinis. — *Antennae* versus apicem rostri insertae, ad thoracis medium pertingentes, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos fere attingente, 2^o brevi, crassissimo, 3^o longiusculo, obconico, 4^o–7^o minutis, transversis, coarctatis, 8^o crasso, clavae arcte connexo, clava magna, subglobosa, articulis aegre discernendis. — *Rostrum* elongatum, capite plus duplo longius, validum, teres, arcuatum, subdilectum, versus apicem sensim aliquantisper incrassatum, apice supra deplanatum; scrobes obliquae, paulatim subtus flexae, in basin rostri subtus coeuntes. — *Oculi* laterales, oblongi, depressi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra convexus, subtus pone gulam vix emarginatus. — *Scutellum* haud conspicuum. — *Elytra* thoracis basi fere duplo latiora, quo quadruplo longiora, subovata, apice attenuata, declivia, non vero callosa, anum obtegentia, supra convexa, dorso antico subdepressa; humeris rectangulatis, subelevatis. — *Pedes* elongati, validi, antici basi approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice unco valido, acuto intus armatis; tarsis subcoarctatis, subtus obsolete spongiosis, articulo penultimo paullo latiore, bilobo, ultimo brevissimo, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Lemnae Fabr. Gyllenh. — Nullam speciem, praeter hanc, vidi.

A *ravio* extendo, expando, *αὐρὸν* malleolus pedis.

Observatio: — Quamvis statura hocce genus *Meo-rhynchorum* Legioni proximum, ad hanc tamen *Brachyrhynchorum* Legionem pertinere debere mihi videtur. Ar-

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* breviusculae, medium thoracis vix attingentes, versus apicem rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae: articulo primo elongato, oculos non attingente, clavato, 2^o et 3^o obconicis, sequentibus quatuor paullo longioribus, 4^o-7^o brevibus, subnodosis, apice truncatis, 8^o crassiore, cyathiformi, clavae basin mentiente; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* elongatum capite plus duplo longius, subdeflexum, teretiusculum, subtenue, versus apicem sensim incrassatum; scrobe obliqua, pone inferum oculi canthum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* breviter conicus, anterieus multo angustior, basi apiceque subtruncatus, lateribus parum rotundatus, supra parum convexus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi fere dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, antice introrsum conjunctim subemarginata, supra parum convexa, versus apicem subcallosa, nonnihil attenuata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis, subrotundatis, antrorsum prominulis. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validiusculi; femoribus subclavatis, obsolete dentatis; tibiis teretiusculis, apice unco horizontali, valido intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, unguiculari, longo, angusto, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen: Colón Fabr. Gyllenh. — Congenericus: Curc. binotatus — Fabr.

A λεπυρός, corticosus, horrens gluma.

Observatio: — Ratione habitus et staturae proximum est generi Alophi, a quo tamen discrepat: alato corpore, rostro magis tenui, articulis antennarum aliter constructis.

Genus 90. *Tanysphyrus* Germ. Dej. — Rhynchaen. Fabr., Gyllenh. — Curculio Herbst, Payk. —

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; scapus oculos subattingens; articulo funiculi basali crasso, brevi, 2^o obconico 3^o-6^o minutis, transversis, co-

arctatis; clava magna, subglobosa, articulis arctissime connexis.

Rostrum elongatum, validum, teres, arcuatum.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax convexus, lateribus nonnihil rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, apice attenuata, declivia; humeri rectangulati.

Tarsi subcoarctati, ungue brevissimo.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, alatum, minoris magnitudinis. — *Antennae* versus apicem rostri insertae, ad thoracis medium pertingentes, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos fere attingente, 2^o brevi, crassissimo, 3^o longiusculo, obconico, 4^o–7^o minutis, transversis, coarctatis, 8^o crasso, clavae arcte connexo, clava magna, subglobosa, articulis aegre discernendis. — *Rostrum* elongatum, capite plus duplo longius, validum, teres, arcuatum, subdilexum, versus apicem sensim aliquantisper incrassatum, apice supra deplanatum; scrobes obliquae, paulatim subtus flexae, in basin rostri subtus coeuntes. — *Oculi* laterales, oblongi, depressi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra convexus, subtus pone gulam vix emarginatus. — *Scutellum* haud conspicuum. — *Elytra* thoracis basi fere duplo latiora, quo quadruplo longiora, subovata, apice attenuata, declivia, non vero callosa, anum obtegentia, supra convexa, dorso antico subdepressa; humeris rectangulatis, subelevatis. — *Pedes* elongati, validi, antici basi approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice unco valido, acuto intus armatis; tarsis subcoarctatis, subtus obsolete spongiosis, articulo penultimo paullo latiore, bilobo, ultimo brevissimo, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Lemnae Fabr. Gyllenh. — Nullam speciem, praeter hanc, vidi.

A *tavio* extendo, expando, *αὐγρὸν* malleolus pedis.

Observatio: — Quamvis statura hocce genus *Meo-rhynchorum* Legioni proximum, ad hanc tamen *Brachyrhynchorum* Legionem pertinere debere mihi videtur. Ar-

ticulo enim 2^o antennarum brevi, crasso, reliquis minutis, subtransversis, clava magna, subglobosa, tarsis coarctatis, ungue brevi, a ceteris dignoscitur generibus.

**) Genus 91. *Hylobius* Germ. olim, Dej. → *Liparus* Oliv. Germ. → *Rhynchaenus* Fabr. Gyllenh. → *Curculio* reliquor. Auctor.

Character generis: — Antennae breviusculae, crassiusculae; scapus oculos non attingens; articulis basalibus funiculi longiusculis, obconicis, 3^o-6^o brevibus subrotundatis l. apice truncatis, gradatim paullo latioribus, ultimo multo crassiore, clavae adnexo; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, subteres, stria dimidiata impressa, e medio oculorum exeunte, utrinque plerumque notatum.

Oculi oblongi, parum prominuli.

Thorax lateribus rotundatus, juxta apicem saepius coarctatus.

Scutellum apice rotundatum, distinctum.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem callosa; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — Corpus oblongum, validum, durum, alatum. — Antennae thoracis medium non superantes, crassiusculae, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, apice incrassato, oculos haud attingente, 2^o et 3^o parum longis, obconicis, 4-7 brevibus, subrotundatis, l. apice truncatis, crassitudine paulatim crescentibus, 8^o multo crassiore, clavae adnexo; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — Rostrum elongatum, capite plus duplo longius, dellexum, crassiusculum, subteres, subarcuatum, versus apicem paullo incrassatum, utrinque stria dimidiata, obsolete impressa, e medio oculorum exeunte, plerumque notatum, apice ipso erosum; scrobe obliqua, profunda, ante apicem incipiente, versus marginem oculi inferum exeunte. — Oculi laterales, suboblongi, oblique positi, parum prominuli. — Thorax latitudine medii vix longior, basi leviter subbiinuatus, antice subtruncatus, pone oculos in plerisque sublobatus, lateribus rotundatus, juxta apicem

pius coarctatus; subtus pone gulam profunde emarginata. — *Scutellum* parvum, apice rotundatum, distinctum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora, quo tamen quadruplo longiora, supra valde convexa, striatim impressa, versus apicem callosa; pygidium tegentia; humeris tuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, validi, subaequales; moribus clavatis, interdum dentatis; tibiis subcompressis, tus bisinuatis, apice oblique truncatis, lamina apicali in unguem magnum, horizontalem producta terminatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo cordato, bilobo, unguibus validis, biunguiculatis.

Stirps 1^a. Rostrum utrinque stria dimidiata ab oculo ad medium rostri ducta obsolete exaratum. Thorax juxta apicem coarctatus.

Typus: — *Rhynchaenus Pineti* Fabr. Species ibi cognitae huc referuntur: *Rhynchaenus arcticus* Gyllénh. — *Rh. Abietis* Fabr. — *Rh. Pinastri* Gyllénh. — *Lip. picivorus* Germ. — *Rhynch. caprea* Fabr. *Hylobius rugicollis* Mannerh. — *Hylob. moerens* et *albopunctatus* nob.

Stirps 2^a. Rostrum haud stria utrinque impressum. Thorax juxta apicem non coarctatus.

Typus: — *Curc fatuus* Ross.

Ab *Ulm* lignum, *βίω* vivo.

Observatio: — Sententiae Illustriss. Germari, *Hylobius* sub eodem genere cum *Molytis* nob. (*Liparus* liv.) posse conjungi, assentire nolui; idque eo minus, quod sint apteri, totaque corporis forma robustior, elytra conata, versus apicem non callosa, humeri antrorsum subproanuli, quae omnia apud illos contraria sunt. De cetero, videlicet eorum genus longe diversum videtur. *Molyti* semper sub lapidibus et in gramine commorantur; *Hylobii* vero in truncis arborum vivunt, ibique ut larvae sese alentes in formas transeunt mutatas.

Cohors 2^a. — Corpus apterum. Elytra antice semper unctim introrsum emarginata.

Genus 92. *Molytes* nob. — *Liparus* *) Oliv. Germ. Dej. — *Rhynchaen.* Fabr. Gyllenh. — *Circulio* reliquor. Auctor.

Character generis: — Antennae breviusculae, crassiusculae; scapus oculos non attingens; articulis funiculi primis longiusculis, obconicis, 3^o - 6 brevibus, transversis, subrotundatis, 7^o multo crassiere, clavae adpresso; clava oblongo-ovata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, aut supra laeve, convexum, utrinque stria obsoleta, supra oculos adscendente impressum, aut angulatum, in medio carinatum.

Oculi oblongi, immersi.

Thorax oblongo-rotundatus, ad latera antice coarctatus, basi apiceque truncatus.

Scutellum minutum, triangulare, saepius indistinctum.

Elytra connata, ovata, supra versus apicem non callosa; humeri antrorsum subprominuli.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, robustum, durum, apterum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, versus apicem rostri insertae, crassiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o et 3^o obconicis, quorum ille paullo longior est, 4-7 brevibus, transversis, subrotundatis, gradatim perparum latioribus, 8^o multo crassiere, cyathiformi, clavae connexo; clava oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* elongatum, capite plus duplo longius, crassiusculum, subteres, deflexum, apice subtruncatum, sinuatum l. erosum, paullo incrassatum, subarcuatum, in plerisque stria obsoleta supra oculos adscendente impressum, in aliis angulatum, supra in medio carinatum; scrobe obliqua, ante apicem incipiente, versus inferum oculi marginem exeunte. — *Oculi* laterales, oblongi, immersi, perpendiculares. — *Thorax* oblongo-rotundatus, ad latera antice coarctatus, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, elytrorum basi paullo angustior, supra aut aequalis, modice

*) Nec retinendum putavi nomen genericum *Liparus*, cum *Liparis* jam nomen cujusdam generis *Bombycum* sit, et eundem praeterea piscium generi quoque impositum.

convexus, aut aliquantulum planus, inaequalis, subtus pone gulum leviter emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare, interdum aegre observandum. — *Elytra* connata, ovata, antice introrsum paullo emarginata, thoracis medio vix latiora, mox pone basin ampliata, lateribus usque ad apicem rotundata, apice obtuse rotundata, anum occultantia, supra valde convexa, callo nullo. — *Abdomen* in mare subtus juxta basin concavum. — *Pedes* longiusculi, subaequales, robusti; femoribus clavatis, imo etiam dentatis; tibiis subcompressis, intus bisinuatis, apice oblique truncatis, lamina apicali intus in uncum magnum horizontalem producta terminatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. Rostrum teres, supra convexum, utrinque atria obsoleta supra oculos adscendente impressum; scrobs linearis. Thorax supra aequalis, modice convexus.

Typus: — *Curc. germanus* Linn. l. fusco maculatus Fabr. huc etiam referuntur: *Curc. coronatus* Latr. l. *germanus* Fabr., Gyllenh. — *Lip. dirus* Oliv. l. *glabratus* Fabr. — *Molyt. Besseri* nob. — *Curc. punctatus* Marsh.

Stirps 2a. (*Epicthonius* nob. olim.) Rostrum angulatum, in medio carinatum; scrobs versus oculos latiuscula. Thorax supra aliquantulum planus, inaequalis.

Typus: — *Lipar. bajulus* Oliv. — Congenericus: *Curc. Monachus* Germ.

A μωλύτης tardus, hebes.

Observatio: — confer. observatio ad Gen. *Hylobii* ante n. 91.

Genus 93. *Plinthus* Germ. — *Curculio* Fabr. Panz. Herbst. — *Rhynchaenus* Oliv. Fabr. — *Lixus* Fabr. — *Liparus* Oliv. — *Meleus* Meg. Dej.

Character generis: — Antennae mediocres, validiusculae; scapus apice incrassatus, oculos subattingens; articulis primis funiculi obconicis, reliquis brevibus, nodosis et gradatim paullo latioribus; clava brevis, subovata.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, subarcuatum, apice paullo incrassatum.

Oculi parvi, oblongi, immersi.

Thorax lateribus rotundatus, supra partim convexus, in medio carinatus, pone oculos exigue lobatus.

Scutellum nullum.

Elytra oblongo-ovata, in paucis subelongata, basi junctim introrsum emarginata.

Descriptio. — *Corpus* oblongo-ovatum l. elongatum, apterum. — *Antennae* thoracis medium vix superantes, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, apice incrassato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4^o-8^o brevibus, nodosis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava brevi, subovata, 4-articulata. — *Rostrum* elongatum, capite plus duplo longius, crassiusculum, teres, apice parum incrassatum; scrobe totum rostrum percurrente, obliqua, aut sensim subtus flexa, aut versus oculi medium desinente. — *Oculi* laterales, oblongi, immersi, oblique positi, parvi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, antice posticeque subtruncatus, pone oculos parum lobatus, lateribus rotundatus, supra modice vel parum convexus, in medio carinatus, subtus pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* plerumque oblongo-ovata, nonnunquam elongata, thoracis basi paullo latiora, quo vero triplo longiora, basi introrsum aliquantulum emarginata, humeris antrorsum prominulis, thoracem ambientibus; supra convexa, versus apicem callosa, plerumque attenuata, apice ipso obtuse rotundata, anum occultantia. — *Pedes* mediocres, subaequales, validi, antici approximati; femoribus subclavatis, saepius dentatis; tibiis subcompressis, intus bisinuatis, apice oblique truncatis, antice horizontali, acuto intus instructis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Typus. — *Curculio Megerlei* Fabr. *Species* mihi cognitae et huc quoque pertinentes, sunt: *Plinth. Tischleri* et *Sturmii* Germ. *Curc. silphoides* Herbst l.

Lipar. Geometra Oliv. — Rhynchaen. porculus.
 Fabr. l. Curc. porcatus Panz. — Curc. leprosus
 Ross. in litt. — Plinth. caliginosus Germ. l. Lixus
 idem Fabr.

A *πλνθος* later.

Observatio: — Generi Molyti affine, statura vero aliena est; antennae enim longiores et magis tenues. A Genere Minyopis cui quoque simile, discrepant antennae longiores et tenuiores aliterque constructae, rostrum subtenue, semper teres, nec angulatum.

Subdivisio 2da. Tibiae omnes apice muticae. Corpus acrissime alatum.

Genus 94. *Phytonomus* nob. — *Hypera* Germ.
 Dej. — *Donus* Megerle — *Rhynchaenus* Fabr.
 Gyllenh. Oliv. — *Curculio* Fabr. et reliquor.
 Auctor.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; scapus clavatus, oculos fere attingens; articulo primo funiculi incrassato, elongato, 2do obconico, aut reliquis longiore, aut subaequale, 3-7 brevibus, nodosis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum capite duplo longius, minus crassum, teretiusculum, paullulum arcuatum; scrobs obliqua, sensim subtus flexa.

Oculi oblongi, subdepressi.

Thorax in plerisque lateribus rotundatus, in paucis subcylindricus, basi apiceque subtruncatus.

Elytra oblongo-vel breviter ovata: humeri aut obtuse angulati, aut subrotundati.

Descriptio: — *Corpus* aut ovatum, aut magis oblongum, in plerisque alatum, in paucis apterum. — *Antennae* vix ad thoracis basin pertinentes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1º elongato, extrorsum valde clavato, oculos fere attingente, 2º ma-

jore, elongato, incrassato, 3^o obconico, aut reliquis longiore, aut subaequale, sequentibus quinque brevibus, nodosis; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrium* capite duplo longius, deflexum, parum arcuatum, crassiusculum, crassitudine variat; scrobe obliqua, lineari, ad inferum oculi canthum exeunte. — *Oculi* laterales, oblongi, subdepressi, oblique positi. — *Thorax* latitudine medii vix longior, basi truncatus, in plerisque lateribus rotundatus, in quibusdam subcylindricus, supra modice convexus, vel dorso planiusculus, apice saepius subemarginatus, aut lobis ocularibus exiguis, aut nullis; subtus pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* aut oblongo-aut breviter ovata, thorace fere duplo latiora et illo plus triplo longiora, antice subtruncata, supra modice convexa, basi planiuscula, apice declivia, rotundata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis l. subrotundatis. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validiusculi; femoribus elongatis, clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. Corpus oblongum.

Typus: — *Rhynchaen*. *Polygoni* Fabr. Species, quae huc etiam inscribendae sunt. *Rh. Rumicis* — *Pollux* — *Miles* — *pedestris* — *elongatus*, — *arundinis* — *Viciae* — *Plantaginis* — *variabilis* — *borealis* et *bipunctatus* Gyllenh. Ins. Sv. — et plures aliae.

Stirps 2a. Corpus breve, ovatum.

Huc merito adnumerantur: *Rhynchaen. fasciculosus* et *punctatus* Gyllenh. — *Curc. Oxalis* — *contaminatus* et *Viennensis* Herbst. — *Donus setosus* Megerle.

A φυτόν planta, *νομός* pabulum, *domicilium*.

Genus 95. *Coniatus* Germari, olim — *Curculio* Auctorum — nunc *Hypera* Germ. Dej.

Character generis: — *Antennae* mediocres, minus tennes; *scapus* oculos subattingens, articulo basali funiculi elongato, incrassato, sequentibus brevibus, apice truncatis,

coarctatis; crassitudine crescentibus; clava elongata, ovalis, angusta.

Rostrum elongatum, subcylindricum, subrectum; scrobe subrecta, versus marginem oculi inferum evanescente.

Oculi majusculi, rotundati, aliquantulum prominuli.

Thorax basi subbisinuatus, lateribus rotundatus, anguli postici prominuli, supra convexus.

Elytra oblongo-ovata; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* ad thoracis medium pertingentes, infra medium rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, extrorsum crassiore, oculos subattingente, 2^o longiusculo, crasso, obconico, reliquis aequalibus, brevibus, subtransversis, apice truncatis, exterioribus sensim crassioribus; clava elongata, ovali, angusta, 4-articulata. — *Rostrum* capite duplo longius, deflexum, subrectum, crassiusculum, teres, apice haud incrassatum; scrobe subrecta, non profunda; pone medium rostri incipiente, versus marginem oculi inferum exeunte. — *Oculi* majusculi, laterales, rotundati, paullulum prominuli. — *Thorax* latitudine longitudinem vix superans, antice truncatus, postice leviter bisinuatus, angulis baseos lateralibus prominulis, lateribus rotundatus, supra convexus, subtus pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo fere quadruplo longiora, supra convexa, antice truncata, apice rotundata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi, longitudine subaequales; femoribus crassiusculis, fere cylindricis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice unco minutissimo intus instructis, reliquis muticis; tarsi tibiis paullo breviores, subtus obsolete spongiosi, articulis 1^o et 2^o oblongo-trigonis, 3^o paullo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, biunguiculato, unguibus validis.

Typus: — *Curc. Tamarisci* Fabr. — *Species* ad hoc quoque genus pertinentes, sunt: *Curc. repandus* et *splendidulus* Fabr.

A *νογιάτος* albario et tectorio opere inductus, calce illitus.

Observatio: — Simillimum hocce genus est *Phytonomi* generi, cui vero dissimile: articulis antennarum 4-8 brevibus, apice truncatis, nec rotundatis, clava angusta, rostro subrecto, scapo aliter constructo, oculis majusculis, rotundatis, prominulis, tarsis longiusculis. Respectu structuræ scrobis seu canaliculae antennalis, hoc genus in limine inter primam et secundam Phalangem sistit; una cum genere *Phytonomi* Legioni quoque 2^{dæ} seu *Mechorhynchis* propinquum; attamen vero forma rostri antennarumque insertio locum ejus heic determinant.

Phalanx 2^{da}. Canalicula antennalis seu scrobis subrecta, versus medium oculi adscendens.

(*Divisio* 6^a. *Phyllobides*: Rostrum breve, subhorizontale, crassiusculum, saepius teretiusculum, nonnumquam aliquantulum incrassatum, interdum quoque supra planum. Corpus elongatum, alatum; humeri obtuse angulati.)

Subdivisio 1^a. — Thorax pone oculos non lobatus.

*) Genus 96. *Mylocerus* nob. — *Curculio* Fabr., Oliv., Herbst.

Character generis: — Antennae elongatae, subtenuae; scapus capite longior, arcuatus; articulis duobus primis funiculi longiusculis, reliquis brevibus, omnibus subobconicis; clava elongata, ovalis, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, subporrectum, supra planum, carinatum, apice profunde triangulariter emarginatum.

Oculi aut laterales, aut subapproximati, suboblongi.

Thorax subtransversus, postice bisinuatus.

Elytra oblonga, subovata, supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* elongatum l. oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* subtenuae, longitudine dimidii corporis l. ultra, in apice rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o longissimo, ad thoracis medium pertin-

gente, valde arcuato, sensim incrassato, 2^o et 8^o longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus subobconicis; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, subporrectum, capite vix angustius, infra subteres, supra planum, in medio carinatum, apice profunde triangulariter emarginatum, ciliis longis instructum; scrobe brevi, recta, ante marginem oculi anticum desinente. — *Oculi* aut laterales, aut subapproximati, suboblongi, modice prominenti. — *Thorax* longitudine latior, lateribus nonnihil rotundatus, antice truncatus, postice bisinuatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* triangulare, parvum. — *Elytra* oblongo-ovata, thorace duplo latiora, et illo quintuplo longiora, dorso modice convexa, apice subrotundata, anum occultantia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales; femoribus clavatis, dentatis; tibiis teretibus, apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo lato, ciliato, ultimo biunguiculato.

Stirps 1^a. — *Oculi* laterales.

Typus: — *Curc. curvicornis* Fabr. l. *passerinus* Oliv. *transmarinus* Herbst. Congenerici: *Curc. dentifer* Fabr. — *Mylloc. discolor* nob.

Stirps 2^a. — *Oculi* subapproximati.

Typus: — *Curc. viridanus* Fabr., Oliv. — *Hae* etiam pertinent: *Mylloc. musculus* nob.

Α μυλλὸς curvus, κέρας cornu.

Observatio: — Geni *Sitonae* haud dissimile, sed rostri antennarumque structura valde diversum.

Genus 97. *Macrocorynus* nob. — *Carcilio* Oliv., Fabr.

Character generis: — *Antennae* mediocres, minus tenues; *scapus* capite longior, valde arcuatus, crassiusculus; articulo basali funiculi breviter obconico, crasso, 2^o paullo longiore, sed angustiore, etiam obconico, reliquis brevibus, turbinatis; clava elongata, ovalis, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, supra in medio impressum, apice late rotundato-emarginatum.

Oculi laterales, subrotundati.

Thorax transversus, antice posticeque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus.

Elytra oblonga, apice subrotundata.

Descriptio. — *Corpus* elongatum, alatum. — *Antennae* thoracis basin vix superantes, in apice rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o capite paullo longiore, valde arcuato, crassiusculo, 2^o breviter obconico, crasso, 3^o longiore, etiam obconico, sed angustiore, reliquis brevibus, turbinatis; clava elongata, ovali, valde angusta, apice acuminata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, capite vix angustius, supra arcuatum, in medio longitudinaliter impressum, apice late rotundato-emarginatum, ciliatum; scrobe lata, basi profunda, subrecta, ad oculum protensa. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* longitudine latior, antice paullo angustior, lateribus perparum rotundatus, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* mediocre, triangulare. — *Elytra* oblonga, antice thoracis basi dimidio latiora, quo quadruplo longiora, humeri obtuse angulati; supra modice convexa; apice subrotundata, pygidium tegentia. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales; femoribus clavatis, dentatis; tibiis teretibus, apice dilatatis, muticis, pro receptione tarsorum excavatis; tarsis subtus distincte spongiosis, ciliatis, articulo primo elongato, trigono, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus. — *Curc. discoidens* Oliv. (dorsalis Fabr.?) nec plures hujus generis vidi.

A μακρὸς longus, *κορὴν* clava.

Observatio. — Simillimum est generi *Mylloceri*, sed antennae sunt validiores, rostrum apice late-rotundato-emarginatum, supra in medio impressum, thorax antice posticeque truncatus.

**) Genus 98. *Phyllobius* nob. Germ. — Olim *Polydrosus* Germ., Schönh., Dej., Billb. — *Chrysa*, *Dascillus* et *Muranus* Meg. — *Curculio* auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae longiusculae, aut subtenues, aut validiusculae; scapus thoracem subattingens, versus apicem sensim incrassatus; articulis basalibus funiculi longiusculis, obconicis, 3 - 7 brevibus, aut obconicis, aut nodosis; clava vel elongata; angusta, vel subovata, acuminata.

Rostrum breve, subteres; scrobs apicalis, brevis cavernosa.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax parvus, antè subcoarctatus, lateribus rotundatus, supra in medio transversim convexus.

Elytra oblonga, thorace latiora, apice subrotundata.

Descriptio: — Corpus elongatum, squamosum, molliusculum, alatum. — Antennae thoracis basin superantes, versus apicem rostri insertae, aut subtenues, aut validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o anteriorem thoracis marginem plerumque tangente, versus apicem sensim incrassato, partim recto, partim nonnihil arcuato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, aut obconicis, aut nodosis, subaequalibus; clava vel elongata, angusta, vel ovata, acuminata, 4-articulata. — Rostrum longitudine capitis, quo paullo angustius, nonnumquam paullo brevius, subhorizontale, subteres, versus apicem aliquantulum incrassatum, apice profunde emarginatum; scrobe apicali, brevi, cavernosa. —

Oculi majusculi, laterales, rotundati, prominuli. — Thorax parvus, longitudine latitudinem vix superans, antè subcoarctatus, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra in medio transversim convexus, subtus integer. — Scutellum triangulare. — Elytra elongata, thorace sextuplo longiora et illo dimidio latiora, supra modice convexa, apice subrotundata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — Pedes longiusculi, validi, subaequales; femoribus crassiusculis, plerumque apice dente magno, acuto subtus armatis; tibiis teretibus, apice muticis, anticis saepe intus sinuatis; tarsis longiusculis, subtus spongiosis, articulis 1, 2 oblongo-trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Antennae thoracis basin superantes, subtenuae; articulis 2° et 3° longis, 4-8 sensim brevioribus, omnibus obconicis; clava elongata, angusta.

Typus: — Curc. Pyri Linn. — *Congenerici:* — Curc. calcaratus et oblongus Auctor. — Phyllob. psittacinus Germ. — et plures aliae.

Stirps 2a. — Antennae thoracis basin superantes, validiusculae; articulis 2° et 3° longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava elongata, ovata.

Typus: — Curc. argentatus Auctor. — *Congenerici:* Phyll. maculicornis Germ. — C. sinuatus Fabr. — Phyllob. herbeus et thalassinus nob.

Stirps 3a. — Antennae longitudine capitis thoracisque, validiusculae; articulo 2° et 3° longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, nodosis; clava breviter ovata, acuminata.

Typus: — C. parvulus Fabr. Gyllenh. — *Congenerici:* C. viridicollis, Betulae, mali auctorum et multae aliae.

A φύλλον folium, βίω vivo.

Observatio: — Generi Polydrosi, cui quoad habitum simile, dissimile structura canaliculae antennalis rectae, non curvatae infra oculum.

Subdivisio 2a. — Thorax pone oculos lobis productis.

***) Genus 99. Cyphicerus nob. — Curculio Wied.

Character generis: — Antennae longae, validiusculae; scapus capite longior, valde arcuatus, crassus; articulo basali funiculi brevi, subobconico, 2° longissimo, subcylindrico, reliquis brevibus, subobconicis; clava elongato-ovata, acuminata.

Rostrum brevissimum, crassum, supra planum, in medio capinula parva elevatum, apice triangulariter emarginatum.

Thorax subtransversus, antice late emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus.

Elytra oblonga, apice singulatim producta, obtuse acuminata.

Descriptio: — *Corpus* oblongum l. oblongo-ovatum, alatum. — *Antennae* thoracis basin superantes, in apice rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o capite longiore, valde arcuato, crasso, 2^o brevi, subobconico, 3^o longissimo, sublineari, 4-8 brevissime obconicis; clava elongato-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, crassum, capite vix angustius, supra planum, subimpressum, in medio carinula parva elevatum, apice triangulariter emarginatum, ciliatum; scrobe apicali, brevi, subcurvata. — *Oculi* laterales, subrotundati, subdepressi, magni. — *Thorax* longitudine latior, anteriora vix angustior, antice late emarginatus, pone oculos lobatus, lateribus parum rotundatus, postice obsolete bisinuatus, supra modice convexus, subtus pone gulam, late sed non profunde emarginatus. — *Scutellum* mediocre, rotundatum, subelevatum. — *Elytra* antice thoracis basi dimidio latiora, quo quadruplo longiora, supra, praesertim posterius, convexa, apice singulatim subproducta, obtuse acuminata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi, longitudine subaequales; femoribus clavatis, dentatis; tibiis teretibus, apice intus angulato-dentatis; tarsis subtus spongiosis, articulo basali oblongo, 2^o trigono, 3^o latiore bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curc. orbitalis* Wiedem. — Congenericus: *Cyphicer. nivosus* nob. ambo e Bengalja — a Dom. Westermann Havniae benevole communicati mihi sunt.

A *κνφς* incurvus, *κέρας* cornu.

Observatio: — Statura et facies fere similis *Myllocer*i generi et *Macrocloryni*, structura vero thoracis antennarumque abunde differt.

Genus 100. *Amblyrhinus* nob.

Character generis: — *Antennae* mediocres, minus tenues; scapus capite longior, validus, subarcuatus; articulo basali funiculi longiusculo, obconico, reliquis brevibus, subaequalibus, subturbinatis; clava parva, ovata.

Rostrum brevissimum, supra planum, versus apicem angustius; scrobs latissima, profunda.

Oculi magni, subdepressi.

Thorax subconicus, lateribus subrectis, basi profunde bisinuatus, antice subemarginatus.

Elytra oblonga, pone medium latiora, apice subacuminata, supra parum convexa.

Descriptio: — *Corpus* parvum, oblongum, alatum. — *Antennae* longitudine capitis thoracisque, versus apicem rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o thoracis marginem anteriorem tangente, valido, subarcuato, versus apicem sensim incrassato, 2^o longiusculo, obconico, sequentibus crassiore, reliquis brevibus, subaequalibus, subturbatis, vel brevissime subobconicis; clava parva, ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* brevissimum, capiti subcontiguum, supra planum, versus apicem angustius, apice ipso triangulariter emarginatum; scrobe apicali, ante marginem anticum oculi desinente, latissima, profunda. — *Oculi* maiusculi, laterales, subrotundati, depressi. — *Thorax* postice longitudine fere latior, subconicus l. anterieus multo angustior, ibique late emarginatus, pone oculos eminenter lobatus, lateribus subrectis, basi profunde bisinuatus, supra aliquantulum convexus. — *Scutellum* rotundatum, evidenter conspicuum. — *Elytra* oblonga, thorace quintuplo longiora, antice thoracis basi paullo latiora, humeri obtuse angulati; lateribus pone medium nonnihil ampliata-rotundata, versus apicem attenuata, supra dorso parum convexa, apice ipso subacuminata, pygidium tegentia. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales; femoribus in medio parum incrassatis, omnibus subtus dentatis; tibiis teretibus, anterioribus intus sub-bisinuatis, apice unco parvo intus armatis; tarsis subtus obsolete spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — Amblyrh. poricollis nob. e Tranquebar: — magnitudo fere Curc. fulvicornis Fabr., sed paullo latior, nec plures species vidi.

Ab ἀμβλῆς obtusus, ὄιν nasus.

Observatio. — Generi *Mylloceri* proximum, forma vero antennarum rostri atque thoracis, aliorumque membrorum valde diversa.

(*Divisio 7a.* *Cyclomides*. Rostrum breve, plus minusve crassum, subhorizontale l. subdeflexum, lineare, saepius teretiuseculum, nonnunquam versus apicem subangulatum. Corpus breve l. subovatum, apterum; humeri rotundati l. obtusi.)

*) Genus 101. *Episomus* nob. — *Curculio* Fabr. Oliv.; Sparrm.

Character generis. — Antennae mediocres, crassae; scapus incrassatus ad oculos pertingens; articularis duobus basalibus funiculi breviter obconicis, 3-6 brevioribus, subtransversis, apice truncatis, 1^o duplo longiore, subcylindrico, clavae adpresso; clava parva ovata.

Rostrum breve, valde crassum, apice profunde emarginatum; scrobs subcurvata, ad oculum protensa, basi profunda.

Oculi parvi, rotundati, prominuli.

Thorax subcylindricus.

Elytra magna, ovata, supra valde convexa, praesertim posterius.

Descriptio. — *Corpus* ovatum, durum, robustum, aut alatum, aut apterum. — *Antennae* crassae, thoracis basin vix tangentes, versus apicem rostri insertae, fractae, pilis brevibus, rigidis, raris obductae, 12-articulatae: articulo 1^o valido, incrassato, subrecurvato, ad oculos pertingente, 2^o et 3^o brevibus, subtransversis, apice truncatis, 8^o duplo longiore, subcylindrico; clavam fere incipiente eique adpresso; clava parva, paullo crassiore, subovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* breve, valde crassum; inaequale, supra in medio longitudinaliter impressum, apice subincrassatum, profunde emarginatum, ciliatum; *scrobe* subcurvata, medium oculorum attingente. — *Oculi* parvi, laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine vix

longior, elytris multo angustior, subcylindricus, antice truncatus, lateribus parum rotundatus, basi aut bisinuatus, aut subtruncatus, supra modice convexus, subtus pone gulam vix emarginatus. — *Scutellum* parvum, triangulare, nonnumquam rotundatum. — *Elytra* magna, ovata, dura, saepe connata, in medio thoracis basi duplo latiora, et illo triplo l. quadruplo longiora, supra, praesertim posterius, valde convexa, margine laterali inflexo, in medio sinuato, pygidium obtegentia; humeris obtusia. — *Pedes* longitudine subaequales, fortes; femoribus subclavatis, muticis; tibiis terebibus, anticis apice intus angulato-dentatis, posticis apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Curc. avarus* Fabr. l. *Lacerta* Oliv. Hue quoque referri possunt: *Curc. Platina* Sparrm. Act. Holm. — *C. Echinus* Fabr. — *C. pauperatus* Fabr.

Ab ἐπισώμος corpulentus.

Observatio: — Antennae crassae, clava parva et corpus robustum hoc praecipue distinguunt genus, quod praeterea omnino haud dissimile quoad habitum, subgeneri *Cneorhini*.

**) Genus 102. *Pholicodes*. nob.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; scapus elongatus, thoracem attingens, subcurvatus, apice clavatus; articulis primis funiculi longiusculis, subclavatis, reliquis brevibus, subobconicis, clava elongata, ovalis.

Rostrum subhorizontale, breve, crassum, supra subplanum; scrobs apicalis, brevis.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax lateribus paullo rotundatus.

Scutellum minutum, tri-angulare.

Elytra oblongo-ovata, supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* parvum, oblongo-ovatum, squamulosum, apterum. — *Antennae* capitis thoracisque longitudine, versus apicem rostri insertae, graciles, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o ultra oculos sese extendente, gra-

cile, apice clavato, paullo arcuato, 2^o et 3^o longinaculis, subclavatis, 4-8 brevibus, gradatim paullo brevioribus, subobconicis; clava elongata, subovali, acuminata, articulis quatuor subconjunctis. — *Rostrum* vix longitudine capitis eique subcontiguum, paullo angustius, subporrectum, sublineare, supra subplanum, crassum, apice triangulariter, non vere late emarginatum; scrobe apicali recta, brevi. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus subangustior, antice posticeque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, subtus subinteger, nonnihil emarginatus. — *Scutellum* minutum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, antice thoracis latitudini aequalia, sed mox pone basin paulatim ampliata, thorace quadruplo longiora, supra convexa, praesertim posteriorius, antra occultantia. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice muticis; tarsis subtus spongiosis, ciliatis, articulo ultimo subclavato, biangulato.

Typus: — *Pholic. plebejus* nob. — Hujus generis duae tantum species e Caucaso, adhuc indescriptae, mihi cognitae.

Α *φολικώδης* squamatus.

Observatio: — Quoad formam externam *Thylaciti* generi simillimum, rostri vero antennarumque structura longe diversa.

Genus 103. *Ptochus* nob. — *Omius* Dej.

Character generis: — Antennae longae, validiusculae; scapus longus, sublinearis, parum recurvatus, thoracem attingens; articulis funiculi basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, apice subtruncatis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum brevissimum, capite vix angustius, supra subplanum.

Frons subconvexa, lata.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax brevissimus, subcylindricus.

Elytra oblongo-ovata, convexa.

Descriptio: — *Corpus* parvum, oblongo-ovatum, apterum. — *Antennae* longitudine dimidii corporis, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o thoracis marginem anticum tangente, sublineare, versus apicem sensim perparum incrassato, paullo recurvato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, apice subtruncatis; clava oblongo-ovata, acuminata, indistincte articulata. — *Rostrum* brevissimum, vix capite longius, quo paullo angustius, subporrectum, supra subplanum, apice profunde emarginatum: scrobe apicali, subrecta, brevi. — *Mandibulae* elongatae, valde arcuatae, corneae, edentulae. — *Frons* lata, subconvexa. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* brevissimus, transversus, subcylindricus, lateribus parum rotundatus, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* minutissimum, vix conspicuum. — *Elytra* oblongo-ovata, antice thoracis latitudini aequalia; sed mox pone basin paullo ampliata, posterius attenuata, thorace quadruple longiora, supra convexa, apice ipso rotundata, animum tegentia. — *Pedes* longiusculi, validiusculi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice muticis; tarsis subtus vix spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo gracili, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Ptochus Porcellus* nob. e *Tauria*. — Ejusdem generis est: *Curc. inustus* Steven seu *Omia grandicornis* Dej.

Α πτωχός mendicus, pauper.

Observatio: — Generi *Omia* proximum; sed differt corpore magis elongato, rostro aliter constructo, scapo longiore, sublineari.

Genus 104. *Stomodes* nob.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, validae; scapus supra oculos sese extendens, versus apicem sensim incrassatus; articulo basali funiculi longiusculo, obconico, reliquis brevibus, subtruncatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum breve, crassum, subteres.

Oculi rotundati, subdepressi.

Thorax longus, lateribus ampliatus - rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, supra parum convexa.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, oblongo-ovatum, apterum. — *Antennae* capitis thoracisque longitudine, versus apicem rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, thoracis marginem anticum attingente, versus apicem sensim incrassato, paullo recurvato, 2^o longiusculo, obconico, 3-8 brevissime subobconicis l. potius subrotundatis; clava oblongo-ovata, articulis quatuor arcte conjunctis. — *Rostrum* breve, vix capitis longitudine, eoque paullo angustius, crassum, subteres; scrobe apicali brevi, recta. — *Mandibulae* (sinistra nempe mihi visa) elongatae, valde arcuatae, corneae, edentulae. — *Oculi* laterales, rotundati, subdepressi. — *Thorax* latitudine medi longior, subovatus, basi truncatus, marginatus, lateribus aequaliter valde ampliatus - rotundatus, apice truncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* haud distinctum. — *Elytra* oblongo-ovata, antice thoracis basi paullo latiora, sed mox pone basin ampliata, posterius attenuata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, anum tegentia. — *Pedes* breviusculi, validi; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis rectis, in medio latiusculis, apice muticis; tarsis elongatis, articulo penultimo latiore, bilobo, spongiis obsolete, unguibus mediocribus, subclavatis, biunguiculatis.

Typus: — Stom. tolutarius nob. e Tauria hunc unum vidi.

A *στώμαθος* qui ore amplo est.

Observatio: — Affine generi *Ptochi*, cum vero 2^{us} et 3^{us} antennarum articuli sint breviores, frons minus lata, et latera thoracis multo magis rotunda, construxi itaque hoc genus proprium.

Genus 105. *Trachyphloeus* Germ. Dej. Billb. — *Curculio* Linn. Fabr. Gyllenh. et plures alii.

Character generis: — *Antennae* breviusculae, crassiusculae; *scapus* crassissimus, ultra oculos extensus; articu-

lis funiculi basalibus breviter obconicis, primo crasso; reliquis brevissimis, transversis; clava parva, ovata.

Rostrum longitudine capitis, lineare, supra subplanum; scrobs elongata, subrecta, profunda.

Oculi rotundati, subdepressi.

Thorax transversus, basi apiceque truncatus, lateribus valde ampliato-rotundatus.

Elytra ampla, connata, subovata, supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* parvum, ovatum, supra vage et breviter setosum, minus convexum, apterum. — *Antennae* thoracis basin vix attingentes, pone medium restri insertae, crassiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o crassissimo, clavato, supra oculos sese extendente, 2^o crasso, breviter obconico, 3^o brevior, minus crasso etiam obconico, 4-8 brevissimis, transversis, subcoarctatis, lenticularibus; clava parva, ovata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis, lineare, apice distincte emarginatum, supra subplanum; scrobe elongata, subrecta, profunda, ad oculum protensa. — *Oculi* parvi, laterales, rotundati, subdepressi. — *Thorax* brevis, transversus, basi apiceque truncatus, lateribus valde ampliato-rotundatus, supra parum convexus, inaequalis, subtus integer. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ampla, subovata, connata, antice thoracis basi paullo latiora, quo quintuplo longiora, versus medium nonnihil ampliata, supra parum convexa, margine laterali inflexo, abdomen arcte includentia, anum tegentia. — *Pedes* breviusculi, validi; femoribus subclavatis, muticis; tibiis rectis, teretibus, omnibus apice intus angulatis, uncinatis et spinulosi; tarsis brevibus, articulo ultimo latiore, bilobo, subtus obsolete spongioso, ungue brevi, biunguiculato.

Typus: — *Curc. scabriculus* Auctor. — Ejusdem generis sunt: *Trachyphl. spinimanus* Germ. — *Curc. Erinaceus* Fabr. — *Trachyphl. digitalis, aristatus et asphaltinus* nob.

Α τραχὺς ἀσπερ, φλοιός cortex, pellis.

Genus 106. *Omiās* Germ. olim in litt. — Dej. — *Curculio* Fabr. — *Bryssus* Megerle. — *Platym'e-*

topon Meg. — *Peritelus* et *Trachyphloeta*
 Germ. Ins. sp. nov.

Character generis: — Antennae longiusculae, saepius graciles; scapus elongatus, basi tenuis, apice clavatus; articulis primis funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, nodosis; clava oblongo-ovata.

Rostrum deflexum, breve, crassum, subteres, supra versus apicem subtriangulariter fere impressum.

Frons plus minusve lata.

Oculi parvi, rotundati, prominuli.

Thorax parvus, angustus, lateribus rotundatus.

Elytra saepius ampla, breviter ovata, supra valde convexa.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, breve, aut subrotundatum, aut subovatum, saepius glabrum, pilosum, apterum. — *Antennae* in plerisque subtenuēs, in quibusdam validiusculae, fractae, capite thoraceque longiores, infra medium rostri insertae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, basi tenui, apice clavato, paullulum recurvato, thoracis marginem anticum attingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, nodosis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine capitis, subdeflexum, crassum, subteres, supra versus apicem late, fere triangulariter leviter excavatum l. impressum, apice ipso subemarginatum; scrobe superna, apicali, profunda, recta, brevi. — *Mandibulae* breves, crassae, corneae. — *Frons* plus minusve lata. — *Oculi* parvi, laterales, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* parvus, saepius angustus, antice posticeque truncatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* in plerisque nullum, in paucis triangulare. — *Elytra* ampla, aut subglobosa, aut breviter ovata, in medio thorace duplo latiora, quo quadruplo longiora, supra valde convexa, pygidium occultantia. — *Pedes* mediocres, validiusculi, longitudine subaequales; femoribus valde clavatis, muticis, posticis in nonnullis dentatis; tibiis teretibus, apice intus subangulatis, truncatis, muticis; tarsis saepius

parvis, articulo penultimo paullo latiore, bilobo, ultimo clavato, gracili, subclavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Antennae subtenues; scapus curvatus. Frons latiuscula, subconvexa. Oculi modice prominuli. Tarsi minus lati, spongiae obsoletae.

Typus: — *Curc. rotundatus* Fabr. — Congenerici: *C. holosericeus* Fabr. — *Curc. gracilis* Beck. — *Curc. puberulus* Stev. — *Omius Verrucula* nob.

Stirps 2a. — Antennae subtenues; scapus subrectus. Frons lata, subdepressa. Oculi valde prominuli. Femora postica dentata; tarsi lati, subtus distincte spongiosi.

Typus: — *Peritelus seminulus?* Germ.

Stirps 3a. — Antennae validiusculae; scapus valde curvatus. Frons latiuscula, parum convexa. Oculi modice prominuli. Tarsi minus lati, spongiae obsoletae.

Typus: — *Curc. gracilipes* Panz. Fn. Germ.

Stirps 4a. — Antennae validiusculae; scapus subrectus. Frons lata, convexa. Oculi valde prominuli. Tarsi minus lati, spongiae obsoletae.

Typus: — *Om. glomeratus* nob. n. sp. e Tauria.

Ab omia humerus?

Observatio. — Magnam habet similitudinem cum insequente genere *Periteli*, cui quoque Illustriss. Dom. Germ. in lus. nov. spec., plures deinde adseruit species, quas tamen, ratione differentiarum sequentium distinguere volui.

Omius: — Corpus breve, subrotundatum, glabrum, pilosulum. Antennae saepius graciles, scapus basi tenuis, apice clavatus, articulis funiculi 3-7 exterioribus nodosis; rostrum subdeflexum, subteres, supra versus apicem leviter subtriangulariter impressum; oculi prominuli; tibiae minus crassae.

Peritelus. — Corpus breviter ovatum, squamosum. Antennae semper validae, scapus sublinearis, sensim incrassatus, articulis funiculi 3-7 exterioribus subtruncatis; rostrum subhorizontale, supra fere planum; oculi subdepressi; tibiae crassiusculae.

Genus 107. *Peritelus*. Germ. — *Pedanus* et *Centricnemus* nob. olim.

Character generis: — Antennae longiusculae, validae; scapus sublinearis, thoracis marginem anticum tangens, sensim incrassatus; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subturbinatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum subhorizontale, crassum, supra subplanum.

Oculi subdepressi.

Thorax brevis, anterieus angustior, lateribus rotundatus.

Elytra ampla, subovata, supra convexa, praesertim posteriorius, margine laterali inflexo.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, squamosum, apterum. — *Antennae* capite thoraceque longiores, in apice rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o ultra oculos sese extendente, valido, sublineari, sensim incrassato, subrecurvato, 2^o, 3^o longiusculis, subobconicis, 4-8 brevibus, apice truncatis, subturbinatis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* subhorizontale, crassum, longitudine capitis, saepius versus apicem paullo angustius, supra subplanum; scrobe superna, apicali, profunda, recta, oblonga. — *Oculi* laterales, subrotundati, subdepressi. — *Thorax* parvus, latitudine postica brevior, antice posticeque truncatus, lateribus paullulum rotundatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ampla, subovata, connata, antice thorace paullo latiora, mox vero pone basin valde ampliata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, praesertim posteriorius, margine laterali inflexo, abdomen arcte includentia. — *Pedes* mediocres, subaequales, validi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, crassiusculis, apice dilatatis, in nonnullis apice multi-spinosis; tarsis subtus spinosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — *Peritelus sphaeroides* Germ. — Congenericus: *Perit. Leucogrammus* Germ.

Observatio: — Cfrtr. observatio ad genus praecedens: Omias.

Subgenus A. *Holcorhinus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, minus tenues; scapo capite longiore, subclavato; articulis primis funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, subturbatis; clava oblongo-ovata. — *Rostrum* subporrectum, capite longius et illo angustius, subteres, supra subplanum, apice paullulum incrassatum, per incisuram arcuatam, transversam, profunde impressam, a fronte distinctum; scrobe apicali, lata, apice explanata. — *Oculi* prominuli, semiglobosi. — *Thorax* brevis, anterieus angustior, antice posticeque truncatus, lateribus rotundatus, supra modice convexus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* subovata, connata, supra, praesertim posterius, convexa. — *Pedes* longiusculi, validi, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, auticis apice intus subcurvatis, apice unco minuto intus instructis; tarsis longiusculis, subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo valido, clavato, biungiculato. — *Corpus* oblongo-ovatum, apterum.

Typus: — *Peritelus* (Holcorh.) hispidulus nob. Huc refertur: *Perit.* (Holcorh.) querulus nob. — Uterque ex Algier.

Ab ὀλκός sulcus. ῥῖν nasus.

Observatio: — A *Peritelis* genuinis, quibus habitu similes sunt huc relatae species, praecipue distinguuntur: scapo antennarum basi tenuiore, aliterque rostro constructo, scrobe apice explanata, oculis prominulis et tarsis paullo longioribus. Hae discrepantiae, etsi notabiles, non tamen pro peculiare genere constituendo, haud sufficientes censeo.

Subgenus B. *Pycoderes*. nob. — *Curculio* Sparrm.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, validiusculae; scapo clavato, oculos superante; articulis funiculi basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, apice runcatis, gradatim paullulum latioribus; clava breviter ovata. — *Rostrum* breve, subteres, lineare, capite angustius, per impressionem transversam subdistinctum, scrobe superna, elongata,

profunda, apice deplanata, recta. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* brevis, latus, lateribus ampliato-rotundatus, apice subito angustatus, subcoarctatus, supra convexus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ampla, ovata, coadunata, antice introrsum conjunctim submarginata, supra valde convexa, versus apicem callosa. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice intus angulato-subdentatis, posticis apice dilatatis, muticis, tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — Curc. Gallina Sparrm. Act. Holm.

Α πικτός plicatus, rugosus, δέρον collum.

Observatio. — Facie simile generi *Thylaciti*, sed scrobs aliter constructa.

Subgenus *C. Oosomus* nob.

Adumbratio; — Antennae mediocres, validiusculae, pone medium rostri insertae; scapo apice valde incrassato, oculos superante; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, subobconicis, illo crassiusculo, reliquis brevissimis, coarctatis, transversis, crassitudine parum crescentibus; clava ovata. — *Rostrum* capite longius et angustius, subteres, versus apicem subangustatum; scrobe superna; ante apicem incipiente; versus oculum explanata, angusta, profunda, recta. — *Oculi* rotundati, parum prominuli. — *Thorax* latitudine medii vix longior, lateribus in medio ampliato rotundatus, supra convexus. — *Elytra* ampla, coadunata, breviter ovata, supra valde convexa. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice latioribus; tarsis latiusculis, subtus spongiosis, ungue biunguiculato.

Typus: — *Oosom. Harriolus* nob. Huc quoque referri potest: *Oosom. testatus* nob. — Uterque e Cap. bonae spei.

Ab ὠόν ovum, σῶμα corpus.

Observatio: — A subgenere *Pycoderis* praecipue antennis paullo brevioribus, articulis brevissimis, coarctatis distinguitur.

Subgenus D. Phlyctinus nob.

Adumbratio: — Antennae longiusculae, subtenuēs; scapo valde elongato, clavato, recurvato; articulis basalibus funiculi longiusculis: 1^o crassiusculo, 2^o primo paullo longiore, reliquis brevibus, omnibus obconicis; clava oblonga, ovali, acuminata. — *Rostrum* capite paullo longius, subcylindricum, nonnihil arcuatum; scrobe superna, elongata, profunda, recta, ante oculum abbreviata. — *Oculi* laterales, rotundati, valde prominuli. — *Thorax* latitudine postica vix longior, antice posticeque truncatus, antrosum angustior, lateribus modice rotundatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ampla, subovata, antice introsum subemarginata, supra versus apicem valde convexa, inaequalia. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice intus angulato-subdentatis; tarsis latiusculis, subtus spongiosis, articulo ultimo valido, biunguiculato. — *Corpus* breviter ovatum, apterum.

Typus: — Peritel. (Phlyctin:) callosus nob. n. sp. e Cap. b. spei.

A φλυκτὶς pustula, tumor.

Observatio. — A Peritelis genuinis, quibus habitus simillimum, praecipue antennarum, rostri oculorumque structura differt.

Genus 108. Cosmorhinus nob.

Character generis: — Antennae longae, subtenuēs; scapus valde elongatus, subfiliformis; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis gradatim brevioribus, etiam obconicis; clava oblonga, ovalis, angusta.

Rostrum breve, crassiusculum, deflexum, teretiusculum, supra inaequale; scrobs superna, in medio rostri posita, brevis.

Oculi parvi, rotundati, subprominuli,

Thorax parvus, transversus, subconicus, supra convexus.

Elytra ampla, subglobosa, supra valde convexa.

Ungues tarsorum breves.

Descriptio: — *Corpus* parvum, breviter ovatum, brotundatum, apterum. — *Antennae* subtenues, longitudine dimidii corporis, in medio rostri superne insertae, frange; 12-articulatae; 1^o longissimo, verticem fere superante, subfiliformi, apice parum incrassato, subarcuato, 2^o et 3^o angustiusculis, obconicis, 4-8 extrorsum sensim brevioribus, omnibus obconicis; clava oblonga, angusta, ovali, acuminata, articulata. — *Rostrum* breve, deflexum, longitudine caeteris, crassiusculum, teretiusculum, apice late emarginatum, incrassatum, supra antennarum insertionem, crista elevata, longitudinali utrinque instructum, canaliculis antennarum profundis, brevibus, cavernosis, in latere superiore rostrum locatis, subapproximatis. — *Oculi* parvi, laterales, rotundi, subprominuli. — *Thorax* parvus, brevis, antice lato angustior, subconicus, lateribus subrectis, basi apice truncatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* lum. — *Elytra* ampla, subglobosa, antice quidem thoraci aequalia, mox vero pone basin valde ampliata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, margine laterali intero, anum tegentia. — *Pedes* mediocres, validi; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice dilatatis, aequae angulato-dentatis; tarsis subtus spongiosis, articulo medio lato, biungiculato, unguibus brevissimis, biungulatis.

Typus: — *Cosmorh. cristirostris* nob. e Cap. tae spei. Sub hoc genere unam tantum speciem vidi.

Α κόρυς ornamentum, ῥιν nasus.

Observatio. — Facie fere simile *Thylaciti* (*Strophosoma*) *Coryli*, sed antennis rostroque valde diversum.

Genus 109. *Sciobius* nob. — *Curculio* Sparrm.

Character generis: — *Antennae* longissimae, graciles; scapus valde elongatus, clavatus; articulo basali funis breviusculo, obconico, 2^o longissimo, subfiliformi, 3-7 angustiusculis, subobconicis; clava elongata, valde angusta.

Rostrum breve, crassum, supra planum.

Oculi subrotundati, modice prominuli.

Thorax brevissimus, transversus, lateribus nonnihil rotundatus, supra modice convexus.

Elytra breviter ovata, supra valde convexa.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, apterum. — *Antennae* dimidio corpore longiores, versus apicem rostri insertae, maxime tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o ad basin tenui, extrorsum subclavato, parum recurvato, thoracis marginem anteriorem attingente, 2^o breviusculo, obconico, 3^o longissimo, subfiliformi, 4-8 longiusculis, subobconicis; clava elongata, valde angusta, 4-articulata. — *Rostrum* subhorizontale, breve, longitudine capitis, quo vix angustius, subangulatum, crassum, apice late emarginatum, supra planum, interdum carinatum, per strigam arcuatam impressam a fronte distinctum; scrobe superna, apicali, brevissima, pterygiis subdivaricatis. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* brevissimus, transversus, antice paullo angustior, subconicus, lateribus nonnihil rotundatus, antice posticeque truncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* magna, breviter ovata, in medio basi thoracis plus duplo latiora, supra valde convexa, versus apicem subattenuata, margine laterali inflexo, abdomen arcte includentia. — *Pedes* mediocres, validi, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo lato, bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — Curc. Tottus α Sparrm. Act. Holm. — Ejusdem generis est, Curc. pullus Sparrm.

A sola umbra, *ſic* vivo.

Observatio. — Genus quoad habitum Otiorhynchi generi proximum fere est, antennarum vero structura longe diversa.

***) Genus 110. *Cyclomus* nob.

Character generis: — *Antennae* longiusculae, subtenues; scapus oculos superans, clavatus; articulis basalibus funiculi longiusculis, subobconicis, reliquis brevibus, subtrijugatis; clava oblonga ovalis.

Rostrum brevissimum, crassum, subteres, apice subtruncatum, perparum emarginatum; scrobs apicalis, ad oculum protensa.

Oculi rotundati, modice prominuli.

Thorax latitudine longior, antice coarctatus, lateribus rotundatus.

Elytra ovata, supra convexa, versus apicem nonnihil attenuata.

Tarsi longiusculi, setosi, haud spongiosi.

Descriptio. — *Corpus* mediocris magnitudinis, ovatum, muricatum; pulvere sordido obductum, apterum. — *Antennae* thoracis basin fere attingentes, versus apicem rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculorum marginem superiorem attingente, paululum recurvato, basi tenui, apice clavato, 2^o et 3^o longiusculis, illo clavato, hoc obconico, 4-8 brevibus, subturbinatis, vel subnodosis; clava oblonga, ovali, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Frons* lata, modice convexa. — *Rostrum* subdeflexum, capite fere brevius et illo paullo angustius, crassum, subteres, apice subtruncatum, perparum emarginatum, apertura oris ampla; scrobe apicali, obliqua, ad oculum protensa, lineari, lata, profunda. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine paullo longior, antice posticeque truncatus, antice paullo latior et intra apicem transversim coarctatus, lateribus rotundatus, supra modice convexus, subtus pone gulam emarginatus. — *Scutellum* vix perspicuum. — *Elytra* ovata, antice thorace paullo latiora, sed mox pone basin valde ampliata, thorace quadruplo longiora, supra convexa, versus apicem nonnihil attenuata, apice ipso rotundata, margine laterali inflexo, in medio sinuato, abdomen arcte includentia. — *Pedes* validiusculi, postici paullo longiores; femoribus clavatis, muticis; tibiis terebribus, rectis, apice truncatis, subdilatis, intus unco minutissimo instructis, tarsis longiusculis, angustatis, setosis subtus haud spongiosis, articulis 1, 2 oblongis, subtrigonis, penultimo haud latiore, bifido, ultimo elongato, clavato, unguibus acutis, validis. —

Typus: — *Cyclom. inquinatus* nob. — Congenerici: *Cyclom. pollutus* et *lanugipes* nob. omnes e Cap. bonae spei.

A κύκλος orbis ὤμος humerus.

Observatio: — Rostrum subdeflexum, crassum, teres, pedes postici longiusculi, subtenues, tarsi angustati, setosi, nec spongiosi, notas hujus generis bene distinctas praebent.

Subgenus *Epichthonius* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, subtenues; scapo oculorum marginem inferiorem attingente, clavato; articulis funiculi obconicis, gradatim brevioribus, clava oblonga, ovali, acuminata. — *Rostrum* deflexum, capite paullo longius, crassum, teretiusculum, rectum, versus apicem sensim incrassatum; scrobe apicali, obliqua, versus oculum explanata, lata, sublineari. — *Frons* lata, parum convexa. — *Oculi* laterales; subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* antice paullo latior, juxta apicem ad latera coarctatus, lateribus rotundatus, lobis pone oculos magnis, obtuse triangulatis, productis. — *Elytra* subovata, convexa, versus apicem nonnihil attenuata, margine laterali inflexo. — *Pedes* longiusculi, postici paullo longiores; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice truncatis, muticis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulo penultimo reliquis haud latiore, bilobo, ultimo elongato, clavato, unguibus acutis, validis.

Typus: — *Curc. Simus* Wiedem. in litt. e Cap. bonae spei.

Ab ἐπιχθόνιος qui super terram vivit.

Observatio: — Lobi thoracis producti et tarsi spongiosi ut et articulorum structura antennarum obconica, hoc subgenus a genere *Cyclomi*, cui caeterum simillimum, distinguunt.

Genus 111. *Eremnus* nob.

Character generis: — *Antennae* saepius longae, tenues; scapus elongatus, clavatus; articulis primis funiculi longiusculis, reliquis sensim paullo brevioribus, omnibus obconicis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum capite paullo longius et illo angustius, lineare, crassiusculum, subangulatum, supra subplanum.

Oculi majusculi, subrotundati, subdepressi.

Thorax transversus, supra modice convexus, versus apicem coarctatus, pone oculos lobatus.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem subattenuata.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, apterum. — *Antennae* in plerisque tennes, longitudine fere dimidii corporis, in nonnullis paullo breviores, minus tennes, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, supra oculos pertingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, 4-8 gradatim brevioribus, omnibus obconicis; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* subdeflexum, capite longius eoque angustius, crassiusculum, lineare, angulatum, supra planum, carinatum l. canaliculatum, apice ipso triangulariter emarginatum; scrobe apicali, brevi, recta, versus oculum explanata. — *Occiput* latum, subelevatum, transverse convexus. — *Oculi* majusculi, laterales, subrotundati, parum prominuli, subdepressi. — *Thorax* longitudine latior, basi truncatus, apice late emarginatus, pone oculos rotundato lobatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, versus apicem coarctatus, subtus pone gulam distincte emarginatus. — *Scutellum* aut nullum, aut minutum, triangulare. — *Elytra* coadunata, oblongo-subovata, thoracis basi dimidio latiora, quo quadruplo longiora, supra, praesertim posterius, convexa, lateribus nonnihil rotundata, versus apicem paullatim attenuata, margine laterali inflexo, in medio sinuato, abdomen arcte includentia. — *Abdomen* maris subtus versus basin et apicem impressum. — *Pedes* mediocres, validi, subaequales; femoribus valde clavatis, muticis; tibiis teretibus in plerisque rectis, apice muticis, in paucis anticis intus subbisinuatis, apice intus angulato-dentatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps: 1^a. Scutellum nullum; lobis thoracis pone oculos distinctis.

Typus: — *Eremnus exaratus* nob. — Congenerici: *Eremn. obtusus* et *dentipennis* nob. — omnes e Cap. bonae spei.

Stirps 2a. Scutellati; lobis thoracis obsoletis.

Typus: — *Curc. setulosus* Wiedem. in litt. e Cap. b. sp. — Huc etiam pertinet: *Eremnus memnonius* nob. ex Ins. Teneriffa.

Ab *ερεμνός* tenebrosus.

Observatio: — Habitu simile speciebus *Stirpis* 1mae subgeneris *Cneorhini*, sed antennae sunt longiores, articuli obconici, clava oblonga, angusta, canalicula antennalis recta.

*** Genus 112. *Amycterus* Dalm.

Character generis: — Antennae breviusculae, minus tenues; scapus elongatus, clavatus; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, subobconicis, 3-6 brevibus, lenticularibus, 7^o longo, cyathiformi, clavam amplectente; clava turbinata, acuminata, articulis valde coarctatis.

Rostrum brevissimum, crassissimum, inaequale, apertura oris ampla.

Oculi subrotundati, parvi, immersi.

Thorax subrotundatus, supra parum convexus.

Elytra magna, oblonga, lateribus nonnihil rotundata, apice obtusae rotundata, supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* magnum, oblongum, apterum, scabrum. — *Antennae* breviusculae, thoracis medium non superantes, pone medium rostri insertae, fractae, 12-articulatae: scapo clavato, sensim incrassato, subrecto, oculum superante, funiculo 7-articulato, parce setoso, articulis primis longiusculis, subobconicis, 3-6 brevibus, lenticularibus, 7^o longo, versus apicem crassiore, cyathiformi, clavae basin amplectente, clava turbinata, acuminata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* brevissimum, vix capitis longitudine, crassissimum, inaequale, apice triangulariter late emarginatum, apertura oris ampla; mandibulis latissimis, valde convexis, subacetabuliformibus, margine interiore re-

cia; scrobe apicali, oblonga, subrecta, ante oculum abbreviata, profunda. — *Oculi* laterales, subrotundati, immersi, parvi. — *Thorax* subrotundatus, antice leviter bisinuatus; lobis pone oculos obtuse rotundatis; postice truncatus, lateribus valde rotundatus, supra parum convexus, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* minutum, immersum, triangulare. — *Elytra* magna, oblonga, antice latitudine thoraci subaequalia et illo quadruplo longiora; basi introrsum nonnihil coniunctim emarginata, lateribus usque ad apicem rotundata, pone medium latiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, subtus lateribus inflexa, abdomen arcte includentia. — *Pedes* breviusculi, postici paullo longiores, graciles; femoribus vix incrassatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, anticis apice intus angulo subdeflexo, crasso, obtuso armatis; tarsis subangustatis, articulis tribus primis subcordatis, subaequalibus, subtus canaliculatis, haud spongiosis, ultimo incrassato, biunguiculato, unguibus acutis, validis.

Typus: — *Curc. mirabilis*, Kirby in Linn. Trans. — Species unica e nova Hollandia, magna, facie aliena, rostri forma insolita et valde singulari.

Ab α priv. et $\mu\upsilon\chi\eta\eta\epsilon$ nasus.

(*Divisio* 8^a. *Otiiorhynchides*. Rostrum breviusculum, crassiusculum, subhorizontale, apice dilatatum et incrassatum, supra subplanum, pterygiis apicalibus divaricatis; scapus antennarum, semper pone oculos sese extendens.)

Subdivisio. 1^a. Thorax pone oculos non lobatus. Corpus apterum.

*) Genus 113. *Otiiorhynchus* Germ. — olim *Loborhynchus* nob. Meg. — *Brachyrhynchus* Meg. — *Pachygaster* Germ. Dej. — *Brachyrhinus* Latr. — *Simo* Meg., Dej. — *Micocerus* Billb. — *Curculio* Linn. Fabr. Gyllenh. pluresque alii.

Character generis: — Antennae longae, saepissime subtenues, raro validae; scapus oculos superans; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis aut

breviusculis, obconicis, aut brevibus, lenticularibus; clava vel oblonga, angusta, vel subovata, acuminata.

Rostrum apice incrassatum, dilatatum, pterygia apicalia divaricata; scrobs brevis, lata, versus oculum explanata.

Oculi rotundati, modice l. parum prominuli.

Thorax lateribus rotundatus, supra convexus.

Elytra connata, ovata, l. oblongo-ovata.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, apterum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, versus apicem rostri insertae, saepissime subtenues, raro validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o thoracis marginem anticum semper attingente, aut recto, aut recurvato, clavato l. versus apicem sensim incrassato, nonnunquam crasso, subaequali, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, reliquis aut breviusculis, subobconicis, aut brevibus, lenticularibus, l. nodosis; clava aut oblonga, ovali, valde angusta, aut subovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite saepe longius, subhorizontale, teretiusculum, apice incrassatum, dilatatum, apicè ipso emarginatum, pterygiis apicalibus, divaricatis; scrobe apicali, superna, brevi, lata, profunda, versus oculum explanata. — *Oculi* laterales, rotundati, aut modice, aut parum prominuli. — *Thorax* basi apiceque truncatus, lateribus in medio ampliato - rotundatus, supra convexus, subtus integer. — *Scutellum* minutum, triangulare, aegre observandum. — *Elytra* connata, oblongo-subovata, nonnunquam elongata, antice thoracis basi parum latiora, quo quadruplo l. quintuplo longiora, mox pone basin valde ampliata, versus apicem attenuata, margine laterali inflexo, abdomen arcte includentia, apice ipso rotundata, anum tegentia, supra convexa, dorso interdum subplano; humeris rotundatis. — *Abdomen* in mare juxta basin concavum. — *Pedes* mediocres; subaequales, validi; femoribus clavatis, dentatis l. muticis; tibiis teretibus, anticis intus bisinuatis, saepius crenulatis, apice dilatatis, truncatis, intus denticulo horizontali instructis, vel muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis duobus basalibus, trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Articuli antennarum 4-8 longiusculi, obconici; clava oblonga, valde angusta.

Manipulus 1s. Femora mutica.

Typus: — Curc. clavipes Oliv. l. Curc. tenebricosus Gyllenh.

Huc etiam pertinent: Otiorh. Rhacusensis Dej. Ahr. — Curc. Goerzensis Fabr. — planatus Fabr. — caudatus Ross. — cinifer Germ. — plumipes Germ. — sulphurifer Fabr. — ater Gyll. — fuscipes Oliv. cribrerosus Germ. — scabricollis Germ. — Mastix Hellw. — Armadillo Ross. — multi punctatus Fabr. — et multo plures.

Manipulus 2s. Femora dentata.

Huc merito referenda sunt: Curc. Giraffa Germ. — sulcifrons nob. — lavandus Sturm. — Simo elegantulus Dahl.

Stirps 2a. — Articuli antennarum 4-8 breves, apice truncati; clava oblonga, ovalis.

Manipulus 1s. Femora mutica.

Huc pertinent: Curc. alutaceus Germ. — C. laevigatus Fabr. Gyll. — Ot. perdix Megerle, Germ. et multae aliae species.

Manipulus 2s. Femora dentata.

Huc quoque: C. gemmatus Fabr. — C. infernalis Germ. Curc. lepidopterus auctor.

Stirps 3a. Articuli antennarum 4-8 breves, aut transversi, aut subrotundati l. nodosi; clava ovata vel oblongo-ovata.

Manipulus 1s. Femora mutica.

Species huc pertinentes, sunt: Curc. orbicularis Fabr. — Maurus Gyllenh. — pertusus Meg. — raucus Fabr. — setosus Fabr. Gyll. — picipes Fabr. — hirticornis Gyllenh. — et plures aliae.

Manipulus 2s. Femora dentata.

Huc referuntur: *C. Ligustici* Auctor. — *sulcatus* — Fabr. Gyll. — *Zebra* Gyll. — *Austriacus* Fabr. — *rufifrons* Gyllenb. — *ovatus* Auctor. aliaeque plures.

Ab οὖς, ὠρός auris, diminutiv.: ὠρίον auriculā, et ὀφύζος rostrum.

Observatio: — Hoc genus hujus familiae, plurimas habet species, quae plerumque habitu similes sunt. Dantur tamen paucae quaedam exceptiones, ex gr. *Curc. perdix* Oliv. Ent. 88 p. 375. 446. T. 31. f. 468, cui est corpus oblongum, elytra subdepressa; sed antennae, rostrum et plures praecipuae partes, non a reliquis hujus generis differunt. — *Curc. hirticornis* Hbst., Gyllenb. (Genus Simo Meg. Dej.) mihi videtur magis diversus, cui sunt antennae crassae, hirtae, scapus crassus, subaequalis; corpus oblongo-ovatum, at vero praeter has dissimilitudines minores, nullas quidem alias inveni tales, ut causa differentiae genericae viderentur, imprimis cum *Curc. picipes*, qui a reliquis hujus generis separari vix potest, sese ad praecedentem *I. Curc. hirticornem* appropinquet, et ab illis, qui antennis habent subtenues, ad paucos, qui antennis validis sunt, transgressum constituat.

Genus 114. *Tyloderes* nob. — *Brius* Megerle, Dej. — *Curculio* Herbst.

Character generis: — Antennae longae, subtenues; scapus versus apicem sensim incrassatus; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, obconicis, 2^o paullo longiore, reliquis brevibus, lenticularibus; clava oblongo-ovata, articulo 1^o longo, basi angusto.

Rostrum subelongatum, apice crassius, pterygia apicalia divaricata; scrobs suboblōnga, cavernosa.

Oculi rotundati, subprominuli.

Thorax pulvinatus, supra convexus, lateribus in medio ampliatis - rotundatus.

Elytra connata, oblongo-ovata, antice introrsum subemarginata, dorso subplana, versus apicem declivia, carinato-elevata.

Descriptio. — *Corpus* oblongo-ovatum, rigidum, scabrosum, apterum. — *Antennae* capite thoraceque longiores, versus apicem rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o capite longiore, recto, versus apicem sensim incrassato, 2^o et 3^o obconicis, quorum hic illo dimidio longior; 4-8 brevibus, lenticularibus, suboblongis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulo 1^o longo, basi angusto. — *Rostrum* capite duplo longius, subhorizontale, teretiusculum, apice incrassatum, dilatatum, apice ipso profunde triangulariter emarginatum, pterygiis divaricatis; scrobe apicali, superna, oblonga, cavernosa. — *Oculi* laterales, rotundati, subprominuli. — *Thorax* latitudine longior, pulvinatus, basi apiceque truncatus, lateribus in medio ampliato-rotundatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* minutum, triangulare, indistinctum. — *Elytra* connata, oblongo-ovata, thorace quadruplo longiora, antice thoracis basi parum latiora, introrsum nonnihil conjunctim emarginata, et mox pone basin aliquantulum ampliata, sed versus apicem attenuata, dorso subplano; supra versus apicem gibba, carinato-elevata, declivia, apice ipso obtusa, anum tegentia, margine laterali inflexo. — *Pedes* mediocres, validi, postici paullo longiores; femoribus clavatis, muticis; tibiis subcompressis, in medio intus paullo latioribus, anticis intus subcrenulatis, omnibus apice unco horizontali, acuto intus armatis; tibiis subtus spongiosis, ciliatis, articulis 1, 2 subtrigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus. — *Curc. chrysops* Hbst. — hunc unum vidi.

A $\tau\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$ callus, cutis obdurata, $\delta\acute{\epsilon}\eta\eta$ collum.

Observatio. — Genus hocce Otiorhynchi generi simillimum; sed forma clavae antennarum et structura scrobis, elytrorum tibiarumque praecipue differunt.

Genus 115. *Hyphantus* Germ.

Character generis. — *Antennae* longae, tenues; articulis primis funiculi longiusculis, reliquis brevioribus, omnibus clavatis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum parum elongatum, apice crassum, pterygia apicalia divaricata; scrobs apicalis, oblonga, profunda.

Oculi rotundati, subprominuli.

Thorax globosus, pulvinatus.

Elytra connata, ovalia.

Pedes antici longiusculi; tibiae anticae intus denticulatae, apice arcuatae, unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum valde convexum, durum, granulatum, apterum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, versus apicem rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o thoracem attingente, recto, 2^o et 3^o longiusculis, 4-8 gradatim brevioribus, omnibus clavatis; clava oblongo-ovali, 4-articulata. — *Rostrum* capite fere duplo longius, deflexum, teretiusculum, apice crassius, pterygiis apicalibus divaricatis; scrobe apicali, superna, oblonga, profunda. — *Oculi* laterales, rotundati, subprominuli. — *Thorax* latitudinis medio brevior, subglobosus, pulvinatus, basi petiolatus, subtus pone gulam emarginatus. — *Scutello* caret. — *Elytra* connata subovalia, thoracis medio haud latiora, quo duplo longiora, supra, praesertim versus apicem, valde convexa, lateribus rotundata, ad apicem attenuata, margine laterali inflexo, abdomen arcte includentia. — *Pedes* validi, antici longiores; femoribus clavatis, antiois subtus, forte in altero sexu, denticulo minuto armatis; tibiis sublinearibus, apice truncatis, anticis intus denticulatis, apice arcuatis, unco horizontali, valido, acuto intus instructis; tarsis longiusculis, subtus spongiosis, articulis duobus basilibus trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — Hyphant. baccifer Germ. nec plures species vidi.

Ab ὑφαντός textus?

Observatio: — Generi Tyloderi affine, sed antennae magis tenues aliterque constructae sunt, thorax globosus, subtus pone gulam emarginatus, basi petiolatus, elytra ovato-globosa, tibiae magis teretes, anticae versus apicem intus curvatae, unco magno armatae.

Genus 116. *Elytrodon* nob.

Character generis: — Antennae mediocres, validiusculae; scapus oculos superans, clavatus; articulis basilibus funiculi longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, semi suborbiculatis, apice truncatis, gradatim latioribus; clava elongata, ovalis, apice subobtus.

Rostrum breve, teretiusculum, crassum, pterygia apicalia modice divaricata.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax transversus, basi obsolete bisinuatus, lateribus valde rotundatus, supra parum convexus.

Elytra oblongo-ovata, ante apicem spina porrecta armata.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, apterum. — *Antennae* ad thoracis basin pertingentes, pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o capitis rostrique longitudine, recto, apice clavato, 2^o, 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, ant semi suborbiculatis, aut subturbinatis, apice truncatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava elongata, subovali, subobtus, 4-articulata. — *Rostrum* breve, crassum, teretiusculum, apice parum incrassatum, apice ipso paullulum emarginatum, pterygiis apicalibus parum dehiscentibus; scrobe apicali, recta, brevi, versus oculum explanata. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* longitudine latior, antice truncatus, lateribus in medio valde ampliato-rotundatus, postice obsolete bisinuatus, supra parum convexus, subtus integer. — *Scutellum* parvum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, humeri rotundati; thoracis basi vix latiora, sed illo quintuplo longiora, apice subacuminata, anum occultantia, supra subconvexa, ante apicem singulorum elytrorum spina valida, porrecta, margine laterali parum inflexo, versus apicem angulo obtuso instructo. — *Pedes* validi, subaequales; femoribus clavatis, dentatis; tibiis subcompressis, basi subtenuibus, anticis apice intus angulatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Cure. bidentatus* Steven. Nova species e *Tapria*. Congenericus: *Elytrød. bispinus*, *Thylacites* idm Sturm ex Hungaria.

Ab ἔλυτρον elytrum, ὀδοῦς dens.

Observatio: — Genus quoad habitum *Phytonomo* fere proximum, scrobis vero antennarumque structura alia est.

Subdivisio 2^a. Thorax pone oculos lobatus. Corpus alatum.

Genus 117. *Phytoscaphus* nob. — olim *Cnemon* nob.

Character generis: — Antennae longiusculae, vacidiusculae; scapus capite longior, versus apicem sensim incrassatus, parum recurvatus; articulis duobus basalibus funiculi longiusculis, reliquis brevibus, omnibus obconicis; clava breviter ovata.

Rostrum subelongatum, apice incrassatum, dilatatum, pterygia apicalia divaricata.

Oculi subrotundati, depressi.

Thorax anterieus angustior, lateribus rotundatus, supra convexus, pone oculos lobatus.

Elytra oblongo-ovata; humeri obtuse angulati.

Tibiae anteriores intus in medio angulo unciformi productae.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, alatum. — *Antennae* capite thoraceque longiores, versus apicem rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o thoracem attingente, versus apicem sensim incrassato, subrecurvato, 2^o et 3^o longiusculis, 4-8 brevibus, omnibus obconicis; clava 4-articulata, breviter ovata, acuminata. — *Rostrum* capite duplo longius, subhorizontale, teres, supra planum, subangulatum, apice incrassatum, dilatatum, apice ipso late, non vero profunde rotundato-emarginatum, pterygiis apicalibus divaricatis; scrobe apicali, superna, brevi, recta, versus oculum explanata. — *Oculi* majusculi, subrotundati, depressi, in fronte nonnihil approximati. — *Tho-*

rax latitudine longitudinem vix superans, anterie angustior, antice late emarginatus, pone oculos eminenter lobatus, bas; subbisinuatus, lateribus parum rotundatus, supra convexus, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* distinctum, rotundatum. — *Elytra* thorace dimidio latiora, quo quadruplo longiora, oblongo-ovata, convexe, apice subacuminata, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi, aequales; femoribus clavatis, dentatis; tibiis subteretibus, anticis versus apicem intus curvatis, anterioribus intus in medio angulo unciformi productis, apice unco horizontali, valido, intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo cordato, bilobo, ciliato, unguiculo mediocri, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Phytoscaphus lixabundus* n. sp. e Bengalía. Unam tantum speciem vidi.

A *φυτοσκάφος* agricola, rusticus, hortulanus.

Observatio: — Genus hocce habitu generi *Otiiorhynchi* appropinquat; cum vero instructus sit alis, scutello distincto, et tibiis anterioribus intus in medio angulo unciformi armatus sit, facile apparet differentia essentialis. — Structura thoracis et rostri hoc a generibus *Myloceri* et *Cyphiceri*, quibus alias simillimum est, distinguit.

Subgenus *Chlœbius* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longitudine dimidii corporis, minus tenues, fractae; articulo 1^o thoracis medium fere attingente, versus apicem sensim incrassato, subrecto, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, lenticularibus; clava oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* capite paullo longius eoque angustius, subteres, versus apicem incrassatum, dilatatum, pterygiis rostralibus subdivaricatis; scrobe apicali, cavernosa, brevissima, profunda. — *Oculi* sublaterales, ovati, depressi. — *Thorax* basi apiceque truncatus, pone oculos exigue lobatus, lateribus aequaliter rotundatus, supra in medio transversim modice convexus, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thorace vix quadruplo longiora et illo dimidio latiora, supra modice convexe; humeris obtuse angulatis. —

Pedes longiusculi, validi, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, apice unco acuto, minutissimo intus instructis; tarsis longiusculis. — *Corpus* parvum, oblongum, alatum.

Typus: — Chlöeb. immeritus nob. e Caucaso. Unam tantum speciem vidi.

A χλόη gramen, βίω vivo.

Observatio: — Subgenus hocce vix rite determinatum, generi Phyllobii valde propinquum est, sed differt: pterygiis rostralibus, subdivaricatis, oculisque ovatis, thorace subtus emarginato et pone oculos lobato, tibiis apice uncinatis.

(*Divisio* 9^a. *Tanyrhynchides*. Rostrum perpendiculare, elongatum, sublineare. Scapus antennarum semper supra oculos extensus.

*) Genus 118. *Tanyrhynchus* nob.

Character generis: — Antennae longae, maxime tenues; scapus apice clavatus, supra oculos sese extendens; funiculo 7-articulato: articulis longiusculis, obconicis, gradatim brevioribus; clava elongata, ovalis.

Rostrum capite duplo longius, subfiliforme, lineare, arcuatum; scrobs elongata, supra ocularis.

Oculi oblongi, depressi.

Thorax transversus, lateribus rotundatus, pone oculos sublobatus.

Elytra oblongo-ovata, convexa, antice introrsum paullo emarginata.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, apterum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, versus apicem rostri insertae, maxime tenues, fractae; 12-articulatae: articulo 1^o apice clavato, supra oculos pertingente, reliquis septem longiusculis, obconicis, exterioribus sensim paullo brevioribus; clava elongata, angusta, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* elongatum, deflexum, capite duplo longius, teres, minus crassum, lineare, arcuatum, apice ipso subemargina-

tum; scrobe elongata, superna, subrecta, lineari, totum rostrum percurrente; ad oculum protensa. — *Oculi* majusculi, laterales, oblongi, depressi. — *Thorax* longitudine latior, anterieus angustior, antice late emarginatus, nonnihil coarctatus, pone oculos sublobatus, lateribus valde ampliatus — rotundatus, postice truncatus, supra modice convexus, subtus pone gulam emarginatus. — *Scutellum* minutum, vix conspicuum, in metathorace situm. — *Elytra* oblongo-ovalia, thorace triplo longiora et illo parum latiora, antice introrsum subemarginata; humeri antrorsum subprominuli, rotundati; supra convexa, apice attenuata, subacuminata, pygidium tegentia, margine laterali inflexo, in medio sinuato. — *Pedes* mediocres, validi, subaequales; femoribus clavatis, anterioribus subdentatis; tibiis teretibus, apice muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 subtrigonis, illo magno, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Tanyrh. terranus* nob. Unam solum — modo speciem vidi a Cap. bonae spei.

A τανύω extendo ῥύγχος rostrum.

Observatio: — Habitu generi *Otiiorhynchi* simile, sed rostro satis longo, lineari, primo conspectu, distinguitur.

**) Genus 119. *Myorhinus* nob. — *Rhynchaenus* Steven.

Character generis: — Antennae longae, tenues; scapus clavatus, oculos superans; articulis primis funiculi longiusculis, reliquis gradatim brevioribus, omnibus subobconicis; clava oblonga, ovalis.

Rostrum capite plus duplo longius, validum, valde arcuatum, supra gibbum, carinatum.

Oculi in fronte fere connexi, depressi.

Thorax transversus, pulvinatus, anterieus angustior, lateribus rotundatus, elytrorum basi paullo angustior.

Elytra ovata, valde convexa, versus apicem declivia.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, breviter ovatum, convexum, apterum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, mox pone medium rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o clavato, supra oculos sese

extendente, 2^o et 3^o longiusculis, reliquis gradatim paullo brevioribus et paullulum latioribus, omnibus subobconicis, clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* deflexum, capite plus duplo longius, parum crassum, subcompressum, valde arcuatum, supra a basi ad antennarum insertionem alte elevato-carinatum, carina versus apicem bipartita; scrobe superna, recta, ab apice ad medium rostri ducta profunda, lineari, versus oculum lata, explanata. — *Mandibulae* parvae, convexae, intus concavae, obtuse bidentatae. — *Oculi* parvi, subapproximati in frontem convergentes, subrotundati, depressi. — *Thorax* longitudine latior, basi apiceque truncatus, anterieus angustior, lateribus rotundatus, supra convexus, pulvinatus, subtus integer. — *Scutellum* vix conspicuum. — *Elytra* ovata, antice thoracis basi paullo latiora, sed mox pone basin valde ampliata, thorace triplo l. quadruplo longiora, supra convexa, versus apicem declivia, apice ipso subacuminata, anum occultantia, margine laterali inflexo. — *Pedes* mediogres, validi, subaequales; femoribus valde incrassatis, acute dentatis; tibiis subcompressis, intus bisinuatis, apice muticis, posticis apice extus obsolete penicillatis; tarsis subtus spongiosis, articulo 1^o lato, subtrigono, 2^o minuto, subrotundato, 3^o latiore, bilobo, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — Myorh. *Steveni* nob. — *Rhynchaen. incrassatus* Steven e Caucaso.

A *μύω* comprimo, *ῥίς* nasus.

Observatio: — Habitus, etsi paullo minor, similis est *Thylacitidis* *Coryli*. Structura rostri singularis est et oculi in frontem fere connexi, unde genus praecipue determinatur.

Legio 2^a. Mecorhynchi. (Rhynchaenides
Fab.)

Rostrum cylindricum l. filiforme, plus minusve elongatum, raro thorace brevius. Antennae autem l. prope medium rostri, nec juxta sinum oris insertae.

Sectio 1^a. Antennae articulis 11, 12; clava
4-articulata.

(*Divisio 1^a.* Erirhinides. Pedes antici basi
approximati.)

Subdivisio 1^a. Scutellum plus minusve distinctum.
Alati.

*) Genus 120. *Lixus*. Fabr. Gyll. Germ. Illig. Oliv. Dej.
Billb. — *Phoxus* Billb. — *Curculio* Auctor.
reliquor.

Character generis: — Antennae breviusculae, de-
flexae, tenues; funiculo 7-articulato, articulis duobus basali-
bus longiusculis, obconicis, 3-6 brevibus, apice truncatis,
7^o crassiore, clavae adpresso; clava oblonga, fusiformis.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres l. cylindricum,
subrectum, nonnunquam paullulum arcuatum.

Thorax oblongus, conicus, ad latera antica parum co-
arctatus, basi bisinuatus.

Elytra elongata, cylindrica, in nonnullis apice attenuata,
acuminata, deliscentia.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, cylindricum, saepe
angustissimum, duriusculum, nonnunquam pulverulentum,
alatum, (interdum apterum, ex. gr. *Lix. ocularis*). —
Antennae thorace breviores, pone medium rostri insertae,
deflexae, fractae, tenues, 12-articulatae: articulo 1^o longo,
clavato, oculos subattingente, eosdem vero nunquam supe-
rante, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-7 brevibus; ae-
qualibus, apice truncatis, 8^o multo crassiore, clavam incipi-
ente; clava oblonga, utrinque attenuata, 4-articulata, ar-
ticulis arcte connexis. — *Rostrum* thorace paullo brevius, ca-
piteque paullo angustius, crassiusculum, cylindricum, saepe
rectum, interdum subarcuatum, plerumque laeve, rarius
subcarinatum; scrobe infraoculari, curvata. — *Oculi* parvi,
laterales, subovati, parum prominuli. — *Thorax* oblon-
gus, antice angustior, ad latera antica parum coarctatus,
basi bisinuatus, apice saepe truncatus, supra parum conve-
xus, infra pone gulam emarginatus, pone oculos saepe sub-
lobatus. — *Scutellum* minutum, triangulare, vix conspicu-

um. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, sed illo quadruplo longiora vel ultra, cylindrica, convexa, in pluribus apice attenuata, in spinam elongatam, acutam, extrorsum l. sursum flexam excurrentia, unde apices elytrorum dehiscunt; in aliis apice ipso rotundata. — *Pedes* longi, tennes, antici approximati; femoribus subcylindricis, saepius muticis; tibiis unco brevi, valido, corneo ad apicem intus armatis; tarsis saepe longiusculis, subtus spongiosis, articulo penultimo cordato, bilobo, unguibus validis.

Stirps 1^a. (Genuini). — Rostrum longius, subcylindricum, laeve, plus minusve crassum.

Manipulus 1^s. *Elytra* apice acuminata, interdum dehiscentia.

Typus: — *Lix. paraplecticus* Auctor. Congenerici: *Lix. Sitta* et *impressus* Sahlb. — *Lix. Algius*, cylindricus, *Ascanii* Fabr. aliaeque plures.

Manipulus 2^s. *Elytra* apice mutica l. rotundata.

Typus: — *Lix. angustatus* Fabr. — Congenerici: *Lix. Bambalio* Germ. — *auriculatus* Sahlb. — truncatellus, filiformis, *Bardanae* et *crassipes* Fabr. et multae aliae.

Stirps 2^a. (Spurii) — Rostrum crassius, breviusculum, subcarinatum. *Pedes* robustiores. *Alae* interdum nullae.

Typus: — *Curc. lividus* Fabr. — *Rhynchaen. ocularis* Fabr. seu *Lix. barbarus* Oliv. — Nec plures novi.

Observatio: — A genere *Cleoni* praecipue differt: rostro antennisque magis tenuibus et forma aliter constructa, corpore etiam saepissime minus crasso.

Genus 121. *Pacholenus* nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, tennes; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevissime subobconicis; clava oblonga, fusiformis.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, subarcuatum.

Thorax oblongus, antice in medio valde productus.

Elytra elongata, cylindrica.

Femora antica intus in media angulo valido armata, producta.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, cylindricum, alatum, supra interdum setosum. — *Antennae* paullo ultra medium thoracis extensae, juxta medium rostri insertae, deflexae; tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevissime subobconicis; clava oblonga, utrinque attenuata, articulis quatuor arcte conjunctis. — *Rostrum* capite duplo longius et ultra, deflexum, crassiusculum, subarcuatum, teres; scrobe infra-oculari, curvata. — *Oculi* magni, subovati, infra caput fere connexi, paullulum prominuli. — *Thorax* latitudine longior, anterieus subangustior, antice in medio cornu quasi obtuso, horizontali productus, basi subbisi-nuatus, supra parum convexus, pone oculos lobis productis, subtus pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* minutum, aegre observandum. — *Elytra* thorace fere latiora, quo quadruplo longiora, cylindrica, convexa, antice singulatim rotundata, apice aut obtuse rotundata, aut attenuata, subacuminata, producta. — *Pedes* antiqui robusti, approximati; femoribus intus in medio angulo, magno, valido, compresso, tibiam inflexam occultante armatis; tibiis compressis, latiusculis, curvatis; pedes posteriores tenues; femoribus vix in-crassatis, muticis; tibiis rectis, his omnibus unco deflexo, valido, corneo, ad apicem extus armatis; tarsis spongiosis, articulo penultimo bilobo, unguibus validis, biunguiculatis.

Typus: — *Pachol. pelliceus* nob. — Congenerie. *Pach. penicillus* nob. — ambo e Brasilia.

Α παχὺς crassus, ὀλένη brachium.

Observatio: — Quoad habitum aliquantisper simile est generi *Lixi*, sed maxime ab eodem antennis, oculis pedibusque differt.

Genus 122. *Brachypus* nob.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; funiculo 7-articulato: articulo basali obconico; cras-

siusculo, reliquis brevibus, subrotundatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, subtenue, teres, parum arcuatum.

Oculi subovati, depressi.

Thorax subconicus, antice posticeque truncatus, subtus integer.

Elytra elongata, subcylindrica, apice attenuata, acuminata, deliscentia.

Unguli tarsorum brevissimi.

Descriptio: — *Corpus* parvum, elongatum, cylindricum, alatum. — *Antennae* capite rostroque fere longiores, infra medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o obconico, crassiusculo, reliquis brevibus, subrotundatis, subaequalibus, exterioribus sensim paullo crassioribus, ultimo clavae adnexo; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* thorace paullo longius, minus tenue, teres, parum arcuatum; scrobe obliqua, infra basin rostri desinente. — *Oculi* laterales, subovati, depressi. — *Thorax* oblongus, anterieus angustior, antice posticeque truncatus, supra parum convexus, ante apicem depressus, depressus, infra antice integer, lobis ocularibus nullis. — *Scutellum* minutissimum, vix conspicuum. — *Elytra* thorace paullo latiora, sed illo fere quadruplo longiora, subcylindrica, parum convexa, versus apicem attenuata, non callosa, pygidium obtegentia, apice in spinam obtusam producta, unde apices elytrorum dehiscunt; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* breviusculi, validi, antici approximati; femoribus in medio crassis, muticis; tibiis rectis, crassiusculis, apice intus angulatis, anticis apice unco minutissimo, corneo, horizontali armatis; tarsis breviusculis, latiusculis, subtus spongiosis, unguibus brevissimis, biunguiculatis.

Typus: — *Brachypus Lixoides* nob. nec plures vidi.

Α βραχὺς brevis, ποὺς pes.

Observatio: — Habitus et statura fere *Lixi* genuini generi est, sed antennarum, rostri aliarumque partium forma diversa.

Genus 123. *Larinus* Schüpp. Germ. — olim *Rhinobatus* Germar, Dej. — Billb. — *Lixus* Oliv. — *Rhynchaen.* Fabr. — *Curculio* Auctor. reliquor.

Character generis: — Antennae brevès, deflexae, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, subobconicis, 4-7 brevibus, semirobundatis, 8^o crassiore, clavam incipiente; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum teres, crassiusculum, plus minusve arcuatum, basi saepius subcarinatum.

Thorax longitudine latior, conicus, postice profunde bisinuatus, ad latera antica coarctatus, lobi pone oculos minuti.

Elytra ovata, supra convexa, dorsum subplanum, apice rotundato; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, aequale, parum exsculptum, saepius laevigatum et polline, praesertim in feminis, tectum, alatum. — *Antennae* thoracis medium pertinentes, infra medium rostri, in mare apicem propius insertae, deflexae, fractae, validiusculae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, oculos vix attingente, 2^o et 3^o longiusculis, subobconicis, 4-7 brevibus, semirobundatis, exterioribus sensim crassioribus, 8^o multo crassiore, clavam quasi incipiente eique adpresso; clava oblongo-ovata, utrinque attenuata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* plerumque longitudine thoracis, et in feminis interdum paullo longius, teres, crassiusculum, plus minusve arcuatum, rarius rectum, basi saepius subcarinatum; scrobe infra-oculari, curvata. — *Oculi* laterales ovati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latior, conicus, antice truncatus, postice profunde bisinuatus, lobo scutellari producto, ad latera antica coarctatus, supra parum convexus, subtus pone gulam leviter emarginatus, lobis pone oculos minutis. — *Scutellum* minutum, triangulare, interdum vix conspicuum. — *Elytra* ovata, lati-

tudine baseos vix duplo longiora, posterius angustiora, apice rotundata, basi singulatim rotundato-producta, et saepissime thoracis basin obtegentia, supra convexa, dorso subplano; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi; antici approximati; femoribus crassiusculis; tibiis omnibus apice iutus unco valido, horizontali armatis; tarsis subtus valde spongiosis; articulo penultimo cordato, bilobo, unguibus validis.

Typus: — Rhynchaen. Cynarae Fabr. Congenerici: — Rhynchaen. Onopordinis, Jaceae, planus et Ursus Fabr. — Lix. Carlinae, gravidus, Maurus, Buccinator, et Scolymi Oliv. — Curc. Veturula Fabr. — et plures aliae.

A λαρινός saginatus.

Observatio. — Genus videtur naturale, statura et facie Rhinocylli, a quo tamen abunde differt antennarum rostrique forma. A Lixio mox dignoscitur: thorace brevior, elytrisque basi multo latioribus quam posterius, dum contra Lixorum elytra saepius versus basin angustiora, quam in medio, sunt.

Subgenus Ileomus nob. — Larinus Germ. — Lixus Fabr. Illig. Oliv. — Rhinobatus Dej. — Curculio De Geer, Sparrm.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulo 2^o saepius dimidio longiore basali, reliquis brevibus, exterioribus sensim crassioribus, omnibus subobconicis; clava oblongo-ovata, acuminata. — *Rostrum* capitis thoracisque fere longitudine, teres, crassiusculum, arcuatum, laeve. — *Thorax* longitudine latior, anterieus angustior et juxta apicem valde coarctatus, postice profunde bisinuatus, lobo scutellari producto; in medio baseos impressus, pone oculos lobis minutis productis. — *Scutellum* parvum, triangulare, impressum. — *Elytra* oblongo-ovata, basi singulatim rotundato-producta, lobis thoracis basin obtegentibus, dorso antico impressa, versus apicem callosa; humeris obtuse angulatis, prominulis. — *Pedes* antici longiores et valde robusti; tibiae

apice unco valido intus armatae; tarsi longiusculi, subtus spongiosi. — *Corpus* oblongum, subinaequale, pulverulentum, alatum.

Typus: — *Lix*, pulverulentus Oliv. *Curculio* idm De Geer l. *Lix*, rureus Fabr. — Eiusdem generis sunt: *Curc.* Caffer. Sparrm. Act. Holm. 1785. *Larinus* (*Ileomus*) pacatus nob.

Ab *ἐλεω* coarcto, *ὤμος* humerus.

Observatio: Quoad staturam et faciem simile *Larini* generi, sed differt: articulo 3^o antennarum saepius dimidio longiore 2^o, atque elytris dorso antico impressis.

**) Genus 124. *Heilipus* Germ. — *Pissodes* Germ. Dej. — *Rhynchaen*. Oliv. Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres, aut crassiusculae, aut subtenuae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, rotundatis; clava oblonga, ovalis, spongiosa, articulis arcte connexis.

Rostrum longitudine variat, in plerisque crassiusculum, in paucis subfiliforme, teres, subarcuatum.

Thorax anterieus angustior, juxta apicem nonnihil coarctatus, basi sub-bisinuatus, pone oculos lobatus.

Scutellum apice rotundatum, distinctum.

Elytra oblonga l. oblongo-ovata, versus apicem callosa; humeri obtuse angulati.

Pedes validi; femora semper dentata; tibiae apice intus unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, robustum, durum, alatum. — *Antennae* ultra thoracis medium pertinentes, pone medium rostri insertae, aut crassiusculae, aut subtenuae, fractae, 12 articulae; scapo seu articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, aut subaequalibus, aut hic illo fere duplo longiore, 4^o aut breviter obconico, aut rotundato, 5-8 brevibus, rotundatis; clava oblonga, ovali, subfusiformi, spongiosa, 4-articulata, articulis arctissime connexis. — *Rostrum* longitudine varians,

plerumque capitis thoracisque longitudine, teres, crassiusculum, arcuatum, saepe juxta apicem paullulum gibbum; in aliis longius, subfiliforme; scrobe infra-oculari, obliqua. — *Oculi* laterales, ovati, depressi. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus angustior et ad latera apicis nonnihil coarctatus, deinde subrotundatus, basi leviter bisinuatus, supra modice convexus; subtus pone gulam emarginatus, versus oculos plus minusve lobatus. — *Scutellum* aut oblongo-ovatum, ant apice rotundatum, distinctum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora et illo triplo longiora, oblonga l. oblongo-ovata, basi subtruncata, supra convexa, versus apicem plus minusve callosa, pygidium obtegentia, apice ipso in plerisque subrotundata, in quibusdam acuminata, et in paucis apice deplanata et mucronata; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* longiusculi, robusti, antici approximati; femoribus in medio valde incrassatis, infra dente valido semper armatis; tibiis omnibus intus in medio dilatatis, apice unco valido, corneo, horizontali armatis; tarsis longiusculis, latis, spongiosis; unguibus validis; biunguiculatis.

Stirps 1a. Funiculi duo articuli basales obconici, subaequales.

Typus: — *Heilipus lactarius* Germ. — Congenerici: *Heilip. catagraphus*, *Pissodes onychinus*, *erythrorhynchus*, *prodigialis*? et *trachypferus* Germ. — *Rhynchaen. apiatus* Oliv. — *Rh. clavipes* et *multiguttatus* Fabr. — et species multo plures, adhuc indescrptae.

Stirps 2a. Articulus 2s funiculi basali fere duplo longior.

Manipulus 1s. *Elytra* apice deplanata, mucronata.

Typus: — *Heilipus spathulatus* Germ. et plures aliae.

Manipulus 2s. *Elytra* apice subrotundata nec deplanata.

Typus: — *Pissodes polymitus* Germ. — Congenerici: *Rh. oculatus* Fabr., *Heilipus cadius* Germ. — *Heilip. myops* nob. et species plures indescrptae.

Ab *ἐλλειπὺς* flexipes.

Observatio: — Hocce genus quodam modo Lixi et Lirini generibus affine, sed scutellum evidenter conspicuum, antennae paullo longiores, pedesque validi differentias praebent manifestas.

Genus 125. *Orthorhinus* nob. — *Rhynchaenus* idm Fabr. Hbst.

Character generis: — Antennae thoracis medium superantes, subtenuis; articulo 1^o longo, sublineari, 2^o et 3^o obconicis, 4-8 brevibus apice truncatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, inferum, perpendiculare, cylindricum; omnino rectum.

Oculi parvi, ovati, depressi, in fronte subapproximati.

Thorax longus, juxta apicem coarctatus, antice in medio paullulum productus.

Scutellum minutum, distinctum.

Elytra oblonga, versus apicem callosa.

Pedes antiqui longiusculi; tibiae compressae, apice uncinatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, rigidum, scabrosum, alatum. — *Antennae* thoracis medium pertingentes, pone medium rostri insertae, subtenuis, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o longitudinem dimidiam totius antennae aequante, oculos tamen non attingente, tenui, sublineari, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, apice truncatis l. potius subrotundatis, exterioribus sensim paullo crassioribus, articulo ultimo clavae adnexo; clava 4-articulata, oblongo-ovata, articulis connexis. — *Rostrum* capite duplo longius, vel pro sexu amplius, crassiusculum, cylindricum, omnino rectum; perpendiculare, sub capite insertum; scrobe infra-oculari, lineari, obliqua. — *Oculi* parvi, subovati, depressi, in fronte subapproximati, oblique positi. — *Thorax* latitudine longior, anterieus angustior et ad latera apicis coarctatus, deinde subrotundatus, basi subtruncatus, antice in medio parum productus, supra convexus, infra ante pedes anticos emarginatus, sed lobis pone oculos vix produ-

ctis. — *Scutellum* minutum, apice rotundatum, distinctum. — *Elytra* thoracis basi vix dimidio latiora, quo triplo longiora, sublinearia, basi truncata, supra convexa, versus apicem callosa, apice ipso rotundata, pygidium obtegentia. — *Pedes* robusti, antici longiusculi, approximati; femoribus anticis magnis, validis, pone medium crassiusculis, omnibus dente valido infra armatis; tibiis compressis, flexuosis, intus bisinuatis; apice unco valido, corneo, horizontali instructis; tarsis spongiosis, praesertim anticis latissimis, deplanatis, articulo 1^o oblongo-trigono, 2^o subquadrato 3^o multo latiore, bilobo, unguiculari, clavato, binnguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. cylindrirostris* Fabr. plures species haud vidi.

Ab ὀρθός rectus, ῥίς nasus.

Observatio: — Generi *Pissodis* aliquatenus simile, differt vero rostro perpendiculari, cylindrico, omnino recto, pedibusque anticis valde elongatis, validis.

Genus 126. *Paramecops* nob. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulo basali obconico, reliquis subperfoliatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava oblongo-ovata, crassiuscula.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, sublineare, parum l. vix curvatum.

Oculi magni, oblongi, sub capite fere connexi.

Thorax antice angustior, subtus emarginatus.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem callosa.

Pedes validi; tibiae apice intus unco minuto armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, durum, (farina alba large obtectum,) alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, infra medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12 articulae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, subrecto, 2^o brevi, obconico, reliquis subperfoliatis, utrinque pilosis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava oblongo-ovata, crassiuscula, 4-articulata. — *Rostrum*

longitudine thoracis, crassiusculum, teres, sublineare, parum l. vix curvatum, supra in medio parum gibbum; scrobe infra-oculari, lineari, profunda, obliqua. — *Oculi* maximi, laterales, oblongi, perpendiculariter positi, sub capite fere connexi, paullulum prominuli. — *Thorax* latitudine longior, anterieus angustior et ad latera apicis coarctatus, deinde subrotundatus, basi subbisinuatus, antice in medio paullo productus, supra convexus, infra pone gulam emarginatus, lobis pone oculos vix productis. — *Scutellum* mediocre, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora et illo triplo longiora, basi subtruncata, vel potius singulatim rotundata, supra convexa, versus apicem callosa, apice rotundata, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi, subaequales, antici approximati; femoribus clavatis, subdentatis; tibiis subrectis, teretiusculis, apice unco minuto armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo crassiusculo, biunguiculato.

Typus: — *Curculio farinosus* Wied. Unicam speciem vidi.

Α παραμήκης oblongus, ὧψ oculus.

Observatio: — Generi *Pissodis* proximum est, oculis vero sub capite fere connexis, thorace subtus emarginato abunde differt.

Genus 127. *Pissodes*. Germ. Ins. nov. Spec. — *Pissocles* Dej. Catal. — *Rhynchaen.* Fabr. Gylenh. et Auctor. plur. — *Curculio* Linné.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulo basali obconico, reliquis brevibus, apice truncatis, crassitudine crescentibus; clava ovalis.

Rostrum elongatum, tenue, arcuatum, teres.

Thorax antice multo angustior, postice bisinuatus, subtus integer.

Scutellum rotundatum, distinctum.

Elytra oblonga, versus apicem callosa; humeri obtuse angulati.

Pedes validi; tibiae apice intus unco valido armatae.

Descriptio. — *Corpus* oblongum, durum, obscurum, maculis squamosis variegatum, subtus satis profunde punctatum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o subrecto, clavato, oculos subattingente, 2^o breviusculo, obconico, 3-8 brevibus, apice truncatis, exterioribus crassitudine gradatim crescentibus; clava 4-articulata, ovata, apice acuminata, crassiuscula. — *Rostrum* thoraci subaequale, vel longius, tenue, arcuatum, teres; scrobe lineari, obliqua, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* distantes, subovati, depressi. — *Thorax* longitudine vix latior, antice multo angustior, subtruncatus, ad latera antica coarctatus, postice bisinuatus, supra parum convexus, subtus integer, pone oculos non lobatus. — *Scutellum* parvum, apice rotundatum, elevatum, distinctum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, sed illo triplo longiora, apice attenuata, rotundata, supra dorso parum convexa, postice callosa, pygidium tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi, subaequales, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretiusculis, unco valido subhorizontali, acuto intus instructis; tarsis breviusculis, latis, subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo clavato, biungiculato.

Typus. — *Pissodes Pini* (Rhynchaen. idm Auct). — Congenerici: *Piniphilus piceae* Illig. — Rhynchaen. *Hercyniae*, notatus et *piniphilus* Gyll. Ins. Sv. — *Pissodes nemorensis* Germ.

Α πιττωδης piceus, resinosus.

Observatio. — Species hujus generis semper in truncis arborum resinosarum vitam degunt; quoad habitum aliquot speciebus generis *Heilipi* appropinquant, sed antennae breviores, crassiores, aliter constructae, et thorax subtus integer essentialiter hoc genus distinguunt.

Genus 128. *Penestes* nob. — Rhynchaenus Fabr.

Character generis. — Antennae mediocres, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus obconicis, 1^o crasso, reliquis brevibus, transversis; clava magna, ovata, articulis arcte connexis.

Rostrum elongatum, validiusculum, arcuatum, teres.

Thorax antèrius paullo angustior, pone oculos lobatus.

Elytra oblonga, versus apicem non callosa; humeri obtuse angulati.

Tibiae anteriores apice intus curvatae.

Ungues tarsorum breviusculi.

Descriptio: — *Corpus* parvum, oblongum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulae; articulo 1^o subrecto, clavato, oculos subattingente, 2^o et 3^o breviusculis, obconicis, illo crasso, reliquis brevibus, transversis, crassitudine crescentibus; clava magna, ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* thoracis longitudine, crassiusculum, arcuatum, teres; scrohe infra-oculari, obliqua. — *Oculi* distantes, ovati, perpendiculariter positi, depressi. — *Thorax* latitudine fere longior, antèrius subangustior, antice late emarginatus, ad latera antica subcoarctatus, dein paullo rotundatus, postice leviter bisinuatus, supra convexus, infra pone guttam late emarginatus, lobis pone oculos parum productis. — *Scutellum* parvum, punctiforme. — *Elytra* thorace dimidio latiora et illo triplo longiora, suboblongo-ovata, basi subtruncata, apice attenuata, rotundata, supra dorso parum convexa, postice non callosa, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis, subprominulis. — *Pedes* validi, subaequales, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis anterioribus apice intus curvatis, omnibus apice unco subhorizontali, acuto intus instructis; tarsis breviusculis, latis, subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo brevi, clavato, biunguiculato.

Typus: Rhynchaen. Tigris Fabr. plures haud vidi.

A πνεύτης servus, famulus.

Observatio: — Generi Pissodis proximum quidem est, abunde tamen differt: rostro crassiore aliterque constructo, thorace pone oculos lobato, elytris postice non callosis et unguis tarsorum brevioribus.

Genus 129. Euderes nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, validae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, quorum 1^o longior est, reliquis brevibus, apice truncatis; clava ovata.

Rostrum elongatum, latiusculum, complanatum, arcuatum. Oculi magni, ovaes, depressi.

Thorax subconicus, basi leviter bisinuatus, infra ante pedes anticos fossula lata, semiotundata impressus.

Elytra elongata, subcylindrica, versus apicem callosa; humeri subprominuli.

Descriptio: — Corpus elongatum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* capite rostroque fere longiores, pone medium rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o recto, clavato, oculos non attingente, 2 et 3 longiusculis, obconicis, illo longiore, reliquis brevibus, apice truncatis, crassitudine parum crescentibus; clava breviter ovata; 4-articulata, articulis distinctis. — *Caput* productum, convexum. — *Rostrum* longitudine thoracis, latiusculum, complanatum, arcuatum; scrobe pone medium incipiente, lineari, profunda, subrecta, versus marginem inferiorem oculorum exeunte. — *Oculi* laterales, ovaes, depressi, oblique positi, satis magni. — *Thorax* longitudine fere latior, anterieus angustior, subconicus, basi leviter bisinuatus, apice subtruncatus, in medio obsolete emarginatus, supra modice convexus (profunde, multi-sulcatus,) pone oculos laud lobatus, infra pone gulam profunde, semiotundato-emarginatus, dein ante pedes anticos fossula etiam semiotundata impressus. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora et illo plus triplo longiora, subcylindrica, basi subtruncata; humeri antrorsum subprominuli; supra versus apicem callosa, apice ipso rotundata, anum tegentia. — *Pedes* breviusculi, validi, longitudine subaequales, antici subapproximati, femoribus in medio incrassatis, versus apicem dentatis; tibiis subsinuatis, omnibus apice truncatis, uncò acuto, subhorizontali intus armatis; tarsis longiusculis, articulis duobus basalibus trigonis, illo longiore, penultimo lato, bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo clavato, binnguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. lineicollis* Wiedem. n. sp.
e Cap. bonae spei. nec plures vidi.

Ab *εὖ* bene, pulchre, *δὲ* collum.

Observatio: — Quoad habitum generi *Pissodis* simile est hoc genus, sed ex rostro latiore, valde complanato, et fossula sub thorace ante pedes anticos fere ut in *Cryptorhynchidibus* impressa, differentia essentialis elucet.

Genus 130. *Eri rhinus* nob. — *Rhynchaenus* Fabr. — Dej. Gyllenh. pluresque alii. — *Notaris* et *Dorytomus* Germ. in litt.

Character generis: — Antennae longiusculae, aut tenues; aut validiusculae; funiculo 7-articulato; articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, nodosis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, longitudine varians, cylindricum, arcuatum, in plerisque subfiliforme.

Thorax anterieus angustior, antice posticeque subtruncatus, lateribus in medio ampliatus, pone oculos plus minusve lobatus.

Elytra oblonga, versus apicem saepius callosa; humeri obtuse angulati.

Pedes mediocres; tibiae in plerisque rectae, anteriores apice unco minuto armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, pone medium rostri insertae, aut tenues, aut validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, nodosis, subaequalibus; clava oblongo-ovata, apice acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine variat, capite thoraceque paullo longius vel plus, cylindricum, arcuatum, in plerisque subfiliforme; scrobe pone medium rostri incipiente, angusta, profunda, subrecta, ante marginem anticum oculi desinente. — *Oculi* majusculi, laterales, ovati, depressi. — *Thorax* latitudine longior, anterieus angustior et vix coarctatus, lateribus in medio ampliatus, antice posticeque subtruncatus, supra modice convexus, subpulvinatus, infra pone gulam aut late

emarginatus, aut subtruncatus, pone oculos plus minusve lobatus. — *Scutellum* distinctum, triangulare. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora, quo triplo l. quadruplo longiora, basi conjunctim subemarginata; humeris antrosum prominulis, fere rectangulatis; supra modice convexa, versus apicem saepius subcallosa, apice ipso rotundata, pygidium obtegentia. — *Pedes* mediocres, validi, antici approximati, anteriores nonnunquam longiores; femoribus in medio incrassatis, aut armatis, aut muticis; tibiis in plerisque rectis, anterioribus apice unco minuto armatis; tarsis subtus spongiosis, unguibus validis.

Stirps 1a. — Articuli funiculorum basales longiusculi, obconici. Pedes mediocres; tibiae in plerisque rectae, anteriores apice unco minuto armatae.

Typus: — Rh. aethiops Auctor. — Congenerici: Rh. bimaculatus, acridulus et dorsalis auctor. — C. Rhamni Herbst. — Dorytomus petax Sahlb. — Rhynchaen. vorax, Tremulae, Tortrix, taeniatus, majalis et pectoralis Gyll. et species multo plures.

Stirps 2a. Articuli funiculorum basales brevissime obconici, Pedes longiusculi; tibiae omnes arcuatae, apice unco valido armatae.

Typus: — Rh. Festucae Auctor. — Congenerici: Rhynchaen. Nereis Gyllenh. — Curc. Nereis Payk.

A *ῥῖν* nasus et particula *ἔρ* significationem augente.

Observatio. — Pro hoc genere, numerum frequentissime in Europa occurrentium Curculionum longirostrum includente, nomen Rhynchaeni, a Fabricio quoque usitatum, esse conservandum, in animo antea fuit; cum vero Clairv. et Latr. hanc denominationem Orchaestidibus primum imposuerint, etsi eos pauci Entomologi hac in re secuti sint, veritus sum ne nomen Rhynchaeni, quod praecipue notationem Curc. longirostrum in genere explicat, jam generi peculiari impositum confusione causa esset, quare his nomen Eriirini proposui.

Illustr. Dom. Germar in observationibus, hanc familiam spectantibus, benevole mecum communicatis, huc relatas spe-

cies in duo genera, *Notaris* nempe et *Dorytomus*, distribuere conatus est; sed, ut mihi videtur, sufficientes hujus separationis characteres vix erui queunt.

Subgenus *Grypidius* nob. — *Grypus* Germ. in litt. — *Arachipus* Megerle in litt. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyllenh. et Auctor. reliquor.

Adumbratio: — Antennae longiusculae, subtennes; articulo 1^o oculos attingente, subrecto, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, nodosis l. apice subtruncatis, aequalibus; clava oblongo-ovata. — *Rostrum* elongatum, tenue, arcuatum, cylindricum. — *Thorax* latitudine medii vix longior, lateribus aequaliter rotundatus, lobis pone oculos distinctis. — *Scutellum* suboblongum, elevatum, parvum, saepius aegre observandum. — *Elytra* subovata, humeri antrorsum subprominuli, obtuse angulati; dorso antice parum convexa, posterius saepius gibba, declivia. — *Pedes* validi, subaequales; tibiis teretiusculis, subrectis, apice intus angulatis, anterioribus unco minuto introrsum flexo armatis.

Typus: — *Rhynchaen. Equiseti* Auctor. Huc adnumerantur: *Rhynchaen. atri-rostris* et *brunnirostris* Gyll. Herbst. — *Rh. Sparganii* Dahl. in litt.

Ἀ γυρνός qui naso est aquilino, incurvus.

Observatio: — subgenus hocce, etsi dubium, *Erirhinis* genuinis simillimum est, sed scutellum pusillum, saepe obsoletum, humeri prominuli et elytra gibbosiora, habitum diversum inducunt.

Quum *Grypi* jam diu tamquam nomen avis sit usitatum, denominationem quidem hujus generis a Dom. Germ. propositam, paullulum mutavimus.

Genus 131. *Hydronomus*. nob. — *Rhynchaen. Gyllenh.* — *Curculio* Marsh.

Character generis: — Antennae breviusculae, validae; funiculo 7-articulato: articulo 1^o obovato, crasso, 2^o elongato, obconico, reliquis nodosis, sensim extrorsum multo crassioribus; clava magna, breviter ovata.

Rostrum subelongatum, crassiusculum, subarcuatum.

Thorax angustus, antice late emarginatus, pone oculos lobatus.

Elytra oblonga, apice attenuata; humeri obtuse angulati.

Tibiae omnes arcuatae, apice unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, minoris magnitudinis, alatum. — *Antennae* capite rostroque paullo longiores, pone medium rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o obovato, crasso, 3^o elongato, basi tenui, obconico, 4-8 brevibus; nodosis, coarctatis, exterioribus sensim multo crassioribus; clava magna, breviter ovata, 4-articulata. — *Caput* breve, retractum; frons inter oculos sulco abbreviato profunde impressa. — *Rostrum* longitudine fere thoracis, paullo arcuatum, crassiusculum; scrobe obliqua, profunda, versus marginem oculi anticum desinente. — *Oculi* laterales, ovati, depressi. — *Thorax* angustus, subcylindricus, latitudine paullo longior, antice late emarginatus, margine subelevato, postice truncatus, supra parum convexus, lobis pone oculos productis. — *Scutellum* parvum, rotundatum. — *Elytra* antice thorace fere duplo latiora, quo plus triplo longiora, supra parum convexa, dorso antico depressa, apice subattenuata, abdomen tegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* elongati, tennes, antici approximati; femoribus in medio incrassatis; tibiis omnibus arcuatis, apice interiore unco valido armatis; tarsis elongatis, angustatis, vix spongiosis, articulo ultimo crasso, sublineari, biungiculato.

Typus: — *Rhynchaen. Alismatis* Gyllenb. — Unum solummodo cognosco.

Ab ὕδαρ aqua, νομός pascuum.

Observatio: — A genere *Bagoi*, cui simile, praecipue differt thorace infra non canaliculato. — Supra aquam natans in plantis aquaticis versatur.

Genus 132. *Brachonyx* nob. — *Rhynchaen. Gyll.* — *Rhinodes* Dej. *Sarapus* Schüpp. — *Dorytomus*? Germ. in litt.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtennes; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus

obconicis, 1^o crasso, reliquis brevibus, . nodosis; clava ovata.

Rostrum elongatum, tenue, arcuatum, teres.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax antice angustior, postice bisinuatus, subtus integer.

Elytra elongata, subcylindrica; humeri obtuse angulati.

Tibiae apice muticae; tarsorum unguli brevissimi.

Descriptio: — *Corpus* parvum, elongatum, alatum. — *Antennae* capite rostroque fere longiores, versus medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, apice arcuato, clavato, 2^o incrassato, 3^o angustiore, utrisque longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, nodosis; clava ovata, acuminata, articulis 4 arcte connexis. — *Rostrum* capite thoraceque fere longius, tenue, arcuatum, teres; scrobe lineari, obliqua, ponte canthum oculi inferum exeunte. — *Caput* breve, latum. — *Oculi* distantes, rotundati, prominuli. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus subangustior, antice truncatus, lateribus rotundatus, postice leviter bisinuatus, supra modice convexus, infra antice integer, lobis ocularibus nullis. — *Scutellum* minutum, punctiforme. — *Elytra* thoracis basi paululum latiora, quo vero quintuplo longiora, supra valde convexa, subcylindrica, postice non callosa, apice rotundata, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* breviusculi, validi, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis latiusculis, subrectis, apice muticis; tarsis breviusculis, crassis, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, brevissimo, biunguiculato.

Typus: *Rhynchaenus* indigena Gyllenh. unam solum speciem vidi.

A βραχὺς brevis, ὄνυχῃ unguis.

Observatio: — Ratione faciei simile fere est hoc genus generi *Erirhini* nob., sed oculis rotundatis, prominulis, pedibus breviusculis tarsorumque unguibus brevissimis differt. Proximum quoque *Bradybati* generi, sed, praeter alias

discrepantias, funiculus antennarum in illo tantum 6-articulatus est.

Nomen *Sarapus* a Dom. Schüpp. huic generi impositum. Ab Illustr. Fischer (Ent. Mosq.) antea *Histeri* glabrato Fabr. (*Sphaerites* idem Duft. et Dej.) additum, quare aegre retinendum.

Genus 133. *Bradybatus* Germ. — *Rhinodes* Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 6-articulato: articulo 1^o majore, crasso, subquadrato, 2^o obconico, reliquis brevissimis, subperfoliatis, exterioribus sensim crassioribus; clava crassa, oblongo-ovata.

Rostrum longiusculum, teres, subarcuatum.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax antice angustior, coarctatus, subtruncatus, basi leviter bisinuatus.

Elytra elongata, subcylindrica, pygidium tegentia.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, in medio rostri insertae, validiusculae, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculorum medium attingente, valde clavato, 2^o magno, crasso, subquadrato, 3^o angustiore, obconico, 4-7 brevibus, transversis, subperfoliatis, crassitudine crescentibus; clava crassa, oblongo-ovata, articulis quatuor arcte conjunctis. — *Rostrum* longitudine thoracis, validiusculum, teres, subarcuatum; scrobe recta lineari, brevi, oculos vix attingente. — *Caput* parvum, subelongatum. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, anterieus angustior, antice truncatus, coarctatus, lateribus subrotundatus, postice leviter bisinuatus, supra convexus, infra pone gulam late emarginatus. — *Scutellum* minutum, elevatum, punctiforme. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo quintuplo longiora, supra valde convexa, subcylindrica, postice subcallosa, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* breves, validi, posteriores paullo breviores, antici approximati; femoribus clavatis;

tibiis latiusculis, intus sinuatis, apice oblique truncatis, anterioribus unco minuto intus armatis; tarsis breviusculis, subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo biunguiculato.

Typus: — *Bradybat. Creutzeri* Germ. Ins. sp. nov. — unam tantum speciem vidi.

A βραδὺς tardus, βᾶω eo, vado, scando, vel ab βάρω pervius?

Observatio: — Habitu et statura generi *Brachyonycis* simile, differt vero funiculo tantum 6-articulato, capitulis antennarumque forma, rostri et unguiculorum aliter constructa.

Genus 134. *Derelomus* nob. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, obconicis, reliquis brevibus, subcylindricis, coarctatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, subtenue, arcuatum, teres.

Thorax anterieus angustior, antice posticeque truncatus, lateribus subrotundatus, margines laterales subreflexi, inaequales.

Elytra oblongo-subovata, parum convexa.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, non nimis convexum; alatum — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, pone medium rostri insertae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, tenui, apice clavato, oculos attingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, subaequalibus, reliquis brevibus, subcylindricis, coarctatis, extrorsum vix crassioribus; clava oblongo-ovata, apice acuminata, articulis 4-arcte connexis. — *Rostrum* capitis thoracisque longitudine, subtenue, teres, arcuatum; scrobe pone medium versus apicem incipiente, angusta, profunda, curvata, versus marginem oculi desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, modice prominuli. — *Thorax* longitudine latior, anterieus valde angustior, basi apiceque truncatus, lateribus subrotundatus, marginatus, marginibus subreflexis inaequalis, supra parum

convexus. — *Scutellum* minutum, triangulatum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora et illo quadrupla longiora, parum convexa, oblongo-subovata, antice conjunctim paullatim emarginata, humeris obtuse angulatis; apice rotundata, pygidium tegentia. — *Pedes* mediocres, validiusculi, antici subapproximati, nonnihil distantes; femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis, teretibus, apice truncatis, muticis; tarsis mediocribus, subtus obsolete spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. Chamaeropsis* Fabr. e Mus. I. Lund. — Congenericus: *Derelom. ephippium* nob. n. sp. patria me fugit.

A δέση collum, λῶμα fimbria.

Observatio. — Speciebus nonnullis Generis *Erirhini*, (ex. gr. *Rh. Tortrici* Auctor.) similis, sed minor; antennarum vero diversa structura et thorax conspicue marginatus evidenter distinguunt.

Genus 135. *Anthonomus* Germ. (Magaz. IV. p. 320.)

Dej. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyllenh.

Character generis: — Antennae longae, tenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, reliquis breviusculis, obconicis; clava elongata, angusta.

Rostrum longum, tenue, parum arcuatum, filiforme.

Oculi rotundati, prominuli.

Thorax subconicus, pone gulam late emarginatus.

Scutellum elevatum, distinctum.

Elytra oblongo-obovata, convexa, saepius ampla.

Pedes longiusculi, antici longiores; femora crassa, dentata.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, convexum, alatum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, pone medium rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, 4-8 breviusculis; obconicis; aequalibus; clava elongata, subangusta, apice acuminata, distincte 4-articulata. —

Rostrum dimidii corporis longitudine, tenue, filiforme, parum arcuatum, scrobe infra medium rostri incipiente, subrecta, versus marginem baseos oculorum anticum desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* subconicus, anterieus valde angustatus, postice longitudinis latitudine, antice truncatus, basi subbisinuatus, angulis posticis saepius rotundatus, supra modice convexus, infra pone gulam late emarginatus, pone oculos non lobatus. — *Scutellum* aut oblongum aut rotundatum, plus minusve elevatum. — *Elytra* sat ampla, obovata, basi thoracis dimidio, posterius vero multo latiora, quo quadruplo longiora, supra valde convexa, praesertim posterius, apice obtuse rotundata, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* elongati, subgraciles, antici approximati; femoribus clavatis, anticis longioribus et crassioribus, versus apicem dentatis; tibiis anterioribus intus in medio dilatatis, apice unco minuto armatis, omnibus apice oblique truncatis; tarsorum articulis duobus basalibus triangularibus, subaequalibus, tertio latiore, bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. druparum* Auctor. — *Congenerici*: *Rhynchaen Ulmi* Gyllenh. — *avarus* - *porum* et *varians* Fabr. — *Rubi* Herbst. et Gyllenh. *pubescens* Gyll. — et species plures aliae.

Ab ἄνθος flos, νομὸς pascator.

*** Genus 136. *Erodiscus* nob. — *Lixus* Fabr. — *Rhynchaenus* Oliv.

Character generis: — *Antennae* longae, subtenues; funiculo 7-articulato; articulis subobconicis, subaequalibus; clava oblongo-ovata.

Rostrum longum, filiforme, tenue, subrectum.

Oculi subapproximati.

Thorax subobovatus, posterius angustior.

Elytra oblongo-subovalia, convexa; humeri retusi.

Pedes validi, longiusculi.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, raro pilosum, alatum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, pone medi-

um rostri insertae, subtenues, fractae; scapo tenui, apice clavato, subrecto, oculos subattingente; funiculo 7-articulato: articulis subobconicis, 3bus basalibus apice subtruncatis, reliquis apice rotundatis; clava oblongo-ovata, 4-articulata, articulis connexis. — *Rostrum* dimidio corpore paullo longius, filiforme, tenue, subrectum, subdeflexum; scrobes lineares, in medio rostri incipientes, angustae, profundae; rectae, pone basin rostri subtils convenientes. — *Caput* rotundatum, convexum. — *Oculi* subovati, in fronte vero convenientes, depressi, magni. — *Thorax* latitudine longior, subobovatus, lateribus anticis rotundatus, posterius valde angustior, antice coarctatus, basi apiceque truncatus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* plus minusve distincte perspicuum. — *Elytra* oblonga, subovalia, convexa, antice thoracis basi vix latiora, humeris retusis, oblique subangulatis; lateribus usque ad apicem paullo rotundata, medio latiora, apice aut obtuse rotundata, aut truncata, singulim argute acuminata, pygidium obtegentia. — *Pedes* validi, longiusculi, antici elongati, approximati; femoribus clavatis, subdentatis; tibiis omnibus apice aut unco valido, corneo instructis, aut muticis; tarsis subtils spongiosis, articulo 1^o elongato, 2^o subtrigono, 3^o latiore, bilobo, unguiculo parum clavato, biunguiculato.

Typus: — *Erodiscus Ciconia* nob. — Congenerici: — *Lix. attenuatus* Fabr. — *Rhynchaen. disjunctus* Oliv. (forte hujus generis.)

Erodiscus diminutivum ab *ἐρως* ardea, sic dictus ob rostrum longum, saepius subrectum.

Observatio: — Statura hujus generis valde singularis; rostrum enim longissimum, filiforme; thorax subobovatus, posterius angustatus, ab elytris remotus.

***) 137. *Balaninus* Germ., Dej. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyll. — *Curculio* Linn. De Geer, Panz. et plures alii.

Character generis: — Antennae longae, graciles; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiuscu-

lis, reliquis brevibus, omnibus subobconicis; clava aut oblongo-ovata, aut breviter ovata.

Rostrum longissimum, filiforme, maxime tenue, arcuatum.

Thorax subconicus.

Elytra simul sumta subcordata, postice fastigiata; humeri prominuli.

Descriptio. — *Corpus* breviter ovatum, squamosum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque paullo longiores, pone medium (magis prope apicem) rostri insertae, graciles, fractae, reflexae, 12-articulatae; scapo reflexo, tenui, apice inflato, oculos attingente; funiculo 7-articulato: ant articulis magis elongatis, duobus basalibus subclavatis; reliquis obconicis; aut articulis minus elongatis, duobus basalibus obconicis, reliquis brevissime obconicis; clava aut conoidea, distincte 4-articulata, aut ovata, articulis indistinctis. — *Rostrum* filiforme, valde tenue et arcuatum, maris interdum vix longitudine corporis, ante insertionem antennarum crassius; rostrum feminae interdum toto corpore fere longius; scrobe recta, pone medium incipiente, ante marginem anticum oculi desinente, basi angusta, lineari, versus apicem sensim dilatata. — *Caput* parvum, rotundatum, convexum. — *Oculi* rotundati, depressi, magni. — *Thorax* oblongus, subconicus, anterieus angustior, coarctatus, basi leviter bisinuatus, supra convexus, infra pone gulam exigue emarginatus. — *Scutellum* rotundatum, elevatum. — *Elytra* aplice thoracis basi latiora, quo duplo longiora, humeris prominulis; posterius valde angustata, conjunctim fere triangularia l. subcordata, apice fere singulatim rotundata, fastigiata. — *Pygidium* saepius nudum. — *Pedes* validi, longiusculi, antici approximati; femoribus clavatis, saepius dentatis; tibiis subcylindricis, apice rotundato-truncatis, excavatis, anterioribus unco minutissimo armatis; tarsorum articulis duobus basalibus triangularibus, subinflatis, penultimo dilatato, bilobo, spongioso, ungui brevi, parum clavato, biunguiculato.

Stirps 1^a. (Genuini). Articuli funicularum magis elongati, duo basales subclavati, reliqui obconici; clava conoidea, distincte articulata. Pygidium ab elytris non tectum.

Typus: — Rhynchaen. Nucum. Auctor. — Congenerici: — Bal. venosus Germ. — Rh. villosus, Cerasorum et C. album Fabr.

Stirps 2a. (Spurii.) Articuli funiculorum minus elongati, basales duo obconici, reliqui brevissime obconici; clava ovata, indistincte articulata. Pygidium ab elytris fere tectum.

Typus: — Rhynchaen. Crux Auctor. — Congenerici: Rhynchaen Salicivorus Gyll. — Balanin. pyrrhoceras Germ.

A βάλανος glans.

Observatio: — Forma corporis subtriangularis et rostrum longissimum, maxime tenne, arcuatum hocce genus a caeteris determinant.

Genus 138. Amalus nob. — Rhynchaenus Gyllenh. — Curculio Herbst., Puyk. Marsh.

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenuae; funiculo 6-articulato: articulis 3bus basalibus longiusculis, subobconicis, 1^o crasso, reliquis subrotundatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum subtenuae, cylindricum, arcuatum.

Thorax antèrius angustior, convexus, postice bisinuatus, subtus integer.

Elytra subovata, convexa, abdomine breviora; humeri obtuse angulati.

Descriptio: — Corpus parvum, breviter ovatum, alatum. — *Antennae* rostri capitisque longitudine, pone medium rostri insertae, subtenuae, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o obconico, crasso, 3 et 4 magis tenuibus, etiam obconicis, 5, 6, 7 subrotundatis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capitis thoracisque longitudine vel pro sexu magis, subtenuae, cylindricum, arcuatum; scrobe infra-oculari, lineari, obliqua. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine brevior, antèrius angustior, truncatus, lateribus subrotundatus, basi bisinuatus, in medio subproductus, supra valde convexus. — *Scutellum* vix

conspicuum. — *Elytra* ampla, oblongo-ovata, thoracis basi dimidio fere latiora, quo plus triplo longiora, modice convexa, apice obtuse rotundata, abdomine breviora, humeris obtuse angulatis. — *Pygidium* semirobundatum, nudum. — *Pedes* validiusculi, longiusculi, antici approximati; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis teretiusculis, rectis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo sat elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Scortillum Gyllenh. — Nullam praeter hanc speciem vidi.

Ab ἀμάλος tener.

Observatio: — Insectum respectu habitus Cryptorhynchis simile, sed defectus canaliculae pectoralis atque unius antennarum articuli absentia, proprii generis notas praebent.

Genus 139. *Coryssomerus* nob. — *Poecilma* Subdivis. A. Germ. — Rhynchaenus Beck.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis coarctatis, subglobosis, crassitudine paullulum crescentibus; clava ovata.

Rostrum elongatum, validiusculum, sublineare, arcuatum.

Oculi magni, rotundati, in fronte paullo approximati.

Thorax antice emarginatus, postice versus scutellum valde productus.

Elytra ovalia, apice singulatim obtuse rotundata, abdomine paullo breviora.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, supra minus convexum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, in medio rostri insertae, minus tenuae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 coarctatis, subglobosis, exterioribus paullulum crassioribus; clava subovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* capitis thoracisque longitudine, validiusculum, teretiusculum, sublineare, valde arcuatum; scrobe subtus flexa

in gulam exeunte. — *Caput* convexum, subporrectum. — *Oculi* rotundati, modice prominuli, in fronte paullo approximati, magni. — *Thorax* longitudine latior, anterieus angustior, ibique late emarginatus, coarctatus, lateribus apice rotundatus, ante scutellum in lobum latum productus, supra parum convexus, infra pone gulam non emarginatus. — *Scutellum* rotundatum, elevatum, parvum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo triplo longiora, posterius angustata, humeris obtuse angulatis; supra parum convexa, versus apicem subcallosa, apice ipso singulatim obtuse rotundata. — *Pygidium* nudum, semirotundatum. — *Pedes* breviusculi, longitudine aequales, validiusculi, antici approximati; femoribus in medio valde incrassatis, dente valido instructis; tibiis breviusculis, validiusculis, subcylindricis, basi curvatis, apice unco valido armatis, tarsis angustis, articulis duobus basalibus subelongatis, subtriangularibus, 3^o bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo gracili, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Capucinus Beck. Beytr. — nec plures species vidi.

A $\kappa\omicron\upsilon\epsilon\sigma\sigma\omega$ armo, $\mu\eta\rho\acute{o}\varsigma$ femur.

Observatio: — *Tychii* generi aliquatenus similitudine accedit, abunde tamen differt: capite subporrecto, oculis in fronte subapproximatis, thorace postice lobato, elytrisque apice singulatim rotundatis. Celeb. Dom. Germ. hoc insectum sub genere suo *Poecilma* ponit, at vero similitudinem quandam cum reliquis conspeciebus vix habere videtur.

Genus 140. Hydaticus nob. — Rhynchaenus Gyllenh. Beck. — Ceutorhynchus Fam. 3a Germ.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenuae, funiculo 6-articulato: articulis tribus basalibus longiusculis, subobconicis, reliquis subnodosis, omnibus coarctatis; clava oblongo-subobovata.

Rostrum breviusculum, crassum, arcuatum.

Oculi magni, subrotundati, prominuli.

Thorax transversus; anterieus angustior, convexus.

Elytra ampla, breviter ovata, abdomine breviora.

Descriptio: — *Corpus* breviter ovatum, convexum, durum, alatum. — *Antennae* rostri capitisque longitudine, pone medium rostri insertae, subtenues, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, basi magis tenui, versus apicem paulatim crassiore, 2^o elongato, crassiusculo, subobconico, 3^o et 4^o angustioribus, etiam obconicis, 5, 6 et 7 subnodosis, omnibus coarctatis; clava elongata, oblongo-subobovata, acuminata, articulis arctissime connexis, vix conspicuis. — *Rostrum* capite duplo longius, crassum, teres, arcuatum; scrobes curvatae, in basin rostri subtus coeuntes. — *Oculi* laterales, sat magni, subrotundati, prominuli, margine versus frontem elevato. — *Thorax* longitudine latior, anterior angustior, dein subrotundatus, posterior latior, antice truncatus, postice profunde bisinuatus, supra convexus, inaequalis, saepius tuberculatus, infra pone gulam aut truncatus, aut emarginatus, haud canaliculatus. — *Scutellum* minutissimum, depressum, observantulo difficile. — *Elytra* ampla, thoracis basi dimidio latiora, quo vix triplo longiora, supra convexa, apice obtuse rotundata, abdomine breviora; humeris obtuse angulatis, subrotundatis. — *Pygidium* subtriangulare, nudum. — *Pedes* longiusculi, validiusculi, subaequales, antici approximati; femoribus parum incrassatis, muticis; tibiis rectis, apice truncatis, muticis; tarsi in nonnullis tibiis parum breviores, angustati, setosi, haud spongiosi, articulis duobus, primis obconicis, 3^o brevi, subnodoso, apice emarginato, ultimo sat longo, parum clavato, unguibus duobus validis; in caeteris articulis minus angustatis, duobus basalibus triangularibus, tertio diftato, bilobo, subtus spongioso, unguiculo clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Tarsi longiusculi, angustati, articulo penultimo brevi, subnodoso, apice emarginato.

Typus: — *Rhynchaen. velatus* Beiträge zur Baier. Ins. Faun.

Stirps 2a. — Tarsi longiusculi, articulo penultimo angustato, bilobo.

Huc adnumerantur: — *Rhynchaen. Myriophylli* Gyll. Ins. Sv. — *Curc. leucogaster* Marsh.

Stirps 3a. — Tarsi minus longi, articulo penultimo latiore, distincte bilobo, subtus spongioso.

Huc pertinent: Ceutorhynch. notula Germ. — Rhynchaen. 4-nodosus et Comari Gyllenh.

Ab ὕδατιον aquula seu simpliciter aqua; diminutiv. ab inusitato ὕδας pro ὕδωρ aqua.

Observatio: — Respectu habitus inter hujus generis species et Ceutorhynchum quaedam intercedit similitudo, evidenter tamen distinguuntur funiculo antennarum 6-articulato, thorace subtus hand canaliculato. [H. velatus, observante Dom. Beck, celere natat et sub aqua quoque sese mergit. Hunc Celeb. Germar. inter Zanichellias palustres, plerum quenatantem invenit, sicut etiam Donaciam Equiseti.] Pedum structura hujus speciei a reliquis nonnihil abhorret, et omnes praelerea, quoad mihi cognitum, vitam in plantis aquaticis degunt. Sunt quidem nonnullae etiam species Baridii generis, quarum pedes pariter sen natorii sunt constructae, unde omnes quae sunt generis Hydatici sub uno genere collocandi causa mihi sufficiens fuit.

Genus 141. Anoplus Schupp. Germ. in litt., Dej. — Rhynchaen. Gyllenh. — Curculio Naelzén.

Character generis: — Antennae breves, validiusculae; articulo 1^o oculos attingente, 2^o obovato, crasso, 3-8 brevibus, subperfoliatis, coarctatis; clava ovata.

Rostrum crassum, parum arcuatum.

Thorax apice attenuatus, parum coarctatus, postice bisinuatus.

Elytra ovata, convexa.

Tarsi mutici, unguli omnino nulli.

Descriptio: — Corpus parvum, breviter ovatum, convexum, alatum. — Antennae thoracis medium non superantes, prope medium rostri insertae, validiusculae, 12-articulatae: articulo 1^o crassiusculo, clavato, oculos attingente, 2^o obovato, crasso, 3-8 brevibus, subperfoliatis, coarctatis, exterioribus sensim crassioribus; clava ovata, 4-ar-

ticulata, articulis connexis. — *Rostrum* feminae vix longitudine thoracis, maris paullo brevius, deflexum, crassum, perparum arcuatum; scrobe infra-oculari, obliqua. — *Oculi* laterales, rotundati, depressi, remoti. — *Thorax* latitudine fere longior, antice multo angustior, truncatus, ad latera antica paululum coarctatus, basi bisinuatus, supra convexus. — *Scutellum* parvum, rotundatum. — *Elytra* ampla, thoracis basi multo latiora, quo quadruplo longiora, breviter ovata, supra valde convexa, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* mediocres, validi, antici approximati; femoribus subclavatis, muticis; tibiis feminae omnibus apice interiore unco armatis; tarsis validis, ciliatis, subtilius spongiosis, articulo penultimo dilatato, cordato; unguis omnino caret.

Typus: — *Rhynchaen. plantaris* Gyll. Ins. Sv. — plures species haud vidi.

Ab *ἀνερλος* inermis.

Observatio: — Quoad formam *Orchestidum* generibus simile, defectu vero unguium a consociis distinguitur. Hec quoque insectum ad saltatorios retulit Dom. Gyllenh., at equidem saltantem nunquam observavi.

Genus 142. *Tychius* Germ. in litt. — *Sibinia* Dej. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyllenh.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato; articulis duobus l. tribus basalibus longiusculis, obconicis, 1^o crassiusculo, reliquis brevibus, apice truncatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, arcuatum, aut crassiusculum, apice paullo attenuatum, aut subtenue, sublineare.

Oculi magni, subrotundati.

Thorax transversus, antrorsum angustior, lateribus saepius valde, nonnunquam minus rotundatus.

Elytra subovalia, modice convexa.

Pedes breviusculi, validiusculi; tibiae breves, compressae.

Descriptio. — *Corpus* parvum, oblongo-ovatum, squamosum, alatum. — *Antennae* thoracis medium vix superantes, inter medium et apicem rostri insertae, fractae, validiusculae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o et 3^o, nonnunquam etiam 4^o longiusculis, obconicis, illo crassiusculo, reliquis coarctatis, saepius brevibus apice subtruncatis; in alijs subglobosis, exterioribus non nimis crassioribus; clava oblongo-ovata, 4-articulata, articulis connexis. — *Rastrum* thoracis longitudine, vel saepius longius, arcuatum; aut crassiusculum, versus apicem sensim paullulum angustatum et supra deplanatum, acutum, aut sublineare, subtenue; acrobes ante medium lateris incipientes, sensim subtus flexae, in inferiore rostro coeuntes. — *Caput* parvum, orbiculatum. — *Oculi* magni, laterales, subrotundati, aut prominuli, aut subdepressi. — *Thorax* transversus, aut apice statim angustatus, coarctatus, lateribus valde subaequaliter ampliatus, angulis posticis rotundatus, supra pulvinatus; aut anterieus modice angustatus, vix coarctatus, lateribus parum rotundatus, supra parum convexus, basi saepe biinnatus, infra pone gulam vel late emarginatus, vel subtruncatus, pone oculos nonnunquam lobatus. — *Scutellum* parvum, triangulare, depressum, plus minusve distinctum. — *Elytra* ovalia, thoracis medio paullo latiora, quo triplo longiora, convexa, basi in plerisque subtruncata, in ceteris conjunctim subemarginata; humeris antrorsum subprominulis, obtuse angulatis. — *Pygidium* saepe aliquantulum prominens. — *Pedes* breviusculi, validiusculi, antici approximati, longitudine aequales; femoribus clavatis, crassis, interdum dentatis, tibiis brevibus compressis, apice truncatis, excavatis, intus angulosiis, unco minuto armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo unguiculari, parum clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Rostrum versus basin crassius, apice paullulum attenuatum.

Typus. — *Tychius* 5-punctatus, *Rhynchaen.* idm Auctor. — Congenerici: — *Rh. venustus* et *picirostris* Gyll. — *Cura. juncens* Reich.

Stirps 2a. Rostrum subtenue, sublineare.

Typus: — Rhynchaen. Carpini Herbst. et Gyll. (nec Fabr.) — Curc. Jungermanni Reich. — Curc. pernix Creutz. — Rh. auritus Illig. in litt.

Α τέτυχο fabricor?

Observatio: — Genus Tychius forma rostri, funiculo 7-articulato, corpore oblongo-ovali et squamoso a Sibynia genere facile dignoscitur.

Subgenus Miccotrogus nob. — Heptaphilus Megerle. — Sibinia Germ. — Curculio Panz.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, validiusculae, 11-articulatae; scapo elongato, clavato; funiculo 6-articulato: articulo 1^o et 2^o longiusculis, obconicis, illo crassiusculo, 3-6 subglobosis; clava crassa, oblongo-ovata. — *Rostrum* longitudine thoracis, teres, arcuatum, subtenue. — *Oculi* rotundati, subprominuli. — *Thorax* subtransversus, anterieus angustior, lateribus rotundatus, basi sub-bisinuatus, supra modice convexus, infra pone gulam truncatus. — *Scutellum* parvum, triangulare, distinctum. — *Elytra* oblonga, subovalia, convexa, thoracis medio vix latiora, alas pygidi-umque occultantia.

Typus: — Miccotrogus cuprifer, Curc. idm Panz — Congen. Rhynch. picirostris, var. Gyllenh. Ins. Sv.

Α μικρός parvus, exiguus, Dorice pro μικρός parvus, τρώγω comedo.

Observatio. — Quoad habitum quibusdam generis Tychii genuini speciebus simillimum, sed ob funiculum antennarum solummodo 6-articulatum, hoc tamquam subgenus, pari ratione, ac subgenus Tachyerges ab Orchiastidis genere est distinctum, distinguere quoque volui.

Genus 143. Sibynes nob — Sibinia Germ. Dej. — Rhynchaenus Fabr. Gyllenh.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 6-articulato: articulis tribus basalibus longiusculis, obconicis, 1^o crassiusculo, tribus reliquis brevibus, apice truncatis; clava crassiuscula, oblongo-ovata. —

Rostrum elongatum, parum arcuatum, versus apicem plerumque sensim attenuatum.

Oculi magni, laterales, subrotundati.

Thorax antérieur valde angustior, basi subbisinuatus, saepius in medio paullo productus.

Elytra brevia, lata, dorso saepe planiuscula, apice singulatim rotundata, abdomine breviora.

Pedes breviusculi, validiusculi; tibiae subcompressae.

Descriptio. — *Corpus* minoris magnitudinis, subovatum, depressiusculum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, in medio rostri insertae, validiusculae, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, recto, clavato, 2-4 longiusculis, subobconicis, illo crassiusculo, 5-7 brevibus, coarctatis, apice subtruncatis, gradatim paullo latioribus; clava crassiuscula, oblongo-ovata, 4-articulata. — *Rostrum* capite thoraceque fere longius, fere, parum arcuatum, aut validiusculum, versus apicem sensim attenuatum, aut subfiliforme, subtenue; scrobes mox subtus flexae in basi rostri subtus convenientes. — *Oculi* laterales, subrotundati, subdepressi, magni. — *Thorax* longitudine paullo latior, antrorsum multo angustior, coarctatus, lateribus angulisque posticis rotundatus, supra parum convexus, antice truncatus, basi aut leviter bisinuatus, in medio nonnihil productus, aut subtruncatus, pone oculos non lobatus. — *Scutellum* minutum, rotundatum, distinctum. — *Elytra* in plerisque oblongo-subquadrata, thorace paullo latiora, quo vero triplo longiora, supra planiuscula, humeris antrorsum nonnihil prominulis; in quibusdam oblongo-ovata, basi subtruncata, humeris obtuse angulatis, supra convexiuscula; in omnibus apice singulatim rotundata, abdomine breviora. — *Pygidium* nudum, semirobundatum. — *Pedes* breves, validiusculi, aequales, antici approximati; femoribus clavatis, crassis, muticis, tibiis crassiusculis, subcompressis, apice truncatis, submuticis; tarsis brevibus, articulis duobus basalibus triangularibus, 3^o bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo clavato, binnigulato.

Stirps 1a. Thorax postice leviter bisinuatus, in medio nonnihil productus. Elytra oblongo-subquadrata, planiuscula; humeri antrosum subprominuli.

Typus: — Rhynchaen Viscariae Auctor. — Congen. Rh. canus Oliv. — Sibin. Potentillae et vittata Germ. — Rh. signatus Gyll.

Stirps 2a. Thorax postice subtruncatus. Elytra oblongo-ovata, convexiuscula; humeri obtuse angulati.

Typus: — Sibinia sodalis Schüpp. et Germ.

A *αἰὶον* telum, hastae simile.

Observatio: — Generi Tychii prope accedit, sed thorax postice productus et habitus diversus. Speciebus stirpis nostrae 3ae, generis Gynnetron respectu habitus quoque proximum est, in illo vero funiculus antennarum tantum 5-articulatus, praeterea quidem antennarum tibiarumque structura est diversa.

Genus 144. Acallopiustus nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, validae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus brevibus, obconicis, illo crassiusculo, reliquis transversis, subperfoliatis, gradatim latioribus; clava subovata.

Rostrum subelongatum, validum, parum curvatum.

Thorax basi bisinuatus, anterieus angustior.

Scutellum triangulare, distinctum.

Elytra oblongo-subquadrata, apice obtuse rotundata, abdomine breviora.

Femora antica subtus in medio dentata et pone dentem serrata.

Descriptio: — Corpus minoris magnitudinis, breviusculum, ovato-subquadratum, supra modice convexum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, pone medium ante apicem rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o oculos non attingente, subrecto, clavato, 2^o et 3^o brevibus, obconicis, illo crassiusculo, 4-8 transversis, subperfoliatis, coarctatis, exterioribus sensim multo crassioribus clavamque fere incipientibus; clava crassiuscula,

subovata, 4-articulata. — *Rostrum* capite duplo longius, validum, subangulatum, subcurvatum; scrobe curvata, lineari, profunda, versus apicem incipiente, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* distantes, oblongi, oblique positi, subdepressi, magni. — *Thorax* longitudine latior, antrorsum valde angustior, antice truncatus, lateribus rotundatus, basi hisinatus, supra modice convexus, infra pone gulam late, non vero profunde emarginatus. — *Scutellum* mediocre, triangulare, distinctum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo triplo longiora, oblongo subquadrata, supra modice convexa, humeris obtuse subangulatis; apice ipso obtuse rotundata, pygidio paullo breviora. — *Pedes* breviusculi, robusti; femoribus anticis paullulum longioribus, incrassatis, infra versus apicem canaliculatis, in medio dente valido, acuto, pone quem serie denticulorum 4-5 instructis, posterioribus muticis, minus incrassatis; tibiis subcompressis, anticis intus curvatis, apice oblique truncatis, uncinatis, posterioribus rectis, quarum hae apice muticae sunt: tarsi breviusculi, haud latius, subspongiosis, articulo penultimo bilobo, unguiculari, parum clavato, hiunguiculato.

Typus: — *Acallopietus vellicosus* nov. sp. e Tranquebaria. Unicam speciem vidi.

Ab ἀκαλλώπιστος non comtus, non ornatus.

Observatio: — Respectu faciei intercedit quaedam Sibynēs generis similitudo, rostro vero aliter constructo, valido, subangulato, femoribusque anticis incrassatis, dentatis praecipue dignoscitur.

Genus 145. *Endaeus* nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulo 1^o subobconico, crassiusculo, 2^o elongato, angustiore, etiam obconico, reliquis brevibus, apice truncatis, coarctatis, gradatim latioribus, 8^o clavam incipiente; clava parva, breviter ovata.

Rostrum parum elongatum, crassiusculum, lineare, arcuatum.

Thorax subrotundatus, anterie paullo angustior, supra parum convexus.

Elytra oblongo-subquadrata, apice obtuse rotundata, supra non nimis convexa,

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, latiusculum, modice convexum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, versus medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, subrecto, subclavato, 2^o brevi, crassiusculo, subobconico, 3^o elongato, angustiore, basi tenui etiam obconico, 4-8 brevibus, apice truncatis; coarctatis, crassitudine crescentibus, articulo funiculorum ultimo clavae basin mentiente; clava parva, breviter ovata, 4-articulata. — *Rostrum* (in feminis) capite jam fere duplo longius, in masculis paullo brevius, crassiusculum, lineare, parum arcuatum (supra rugosum); acrothe lineari, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, modice prominuli, magni. — *Thorax* subrotundatus, latitudine brevior, anteriora paullo angustatus, lateribus aequaliter rotundatus, antice posticeque truncatus, supra parum convexus, infra pone gulam truncatus. — *Scutellum* minutum, depressum, apice rotundatum. — *Elytra* oblongo-subquadrata, thoracis medio dimidio latiora, quo plus triplo longiora, antice conjunctim submarginata, humeris subrotundatis; lateribus subrecta, apice obtuse rotundata, pygidium obtegentia, supra perparum convexa. — *Pedes* breves, fortes, longitudine subaequales, antici approximati; femoribus omnibus incrassatis; dente valido instructis, posticis subcompressis; tibiis crassiusculis, compressis, rectis, anterioribus apice intus unco subhorizontali armatis, posticis brevioribus; tarsis subtus apungiosis, articulo unguiculari, parum clavato, biunguiculato,

Typus: — *Eudaeus castus* nob. nova spec. e Sierra Leone, nec plures vidi.

Ab *lyderis* indigus, quod ab *lyderi* deest.

Observatio: — Quoad habitum convenientia quaedam cum genere *Sibynes* intercedit, satis vero distinctum non solum thoracis forma rotundata, sed etiam structura diversae antennarum, putamus.

*****) Genus 146. *Sternechus* nob. — *Orobithis* Germ.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basilibus obconicis, primo longiore, reliquis brevibus, apice truncatis, coarctatis, gradatim crassitudine crescentibus; clava ovalis.

Rostrum crassiusculum, cylindricum, subrectum.

Oculi subconnexi, ovati, immersi.

Thorax transversus, antrosum multo angustior, coarctatus, lateribus posterioribus rectis.

Elytra oblongo-ovata, sub humerum inferne producta, angulato-dentata.

Sternum porrectum, apice obtusum.

Tibiae subcompressae, intus in medio denticulo acule armatae.

Descriptio: — Corpus subovatum, minus convexum, alatum. — *Antennae* thoracis medium vix longitudine superantes, mox pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o, 3^o longiusculis, obconicis, illo longiore, 4-8 brevissime obconicis, coarctatis, gradatim latioribus, ultimo clavae adpresso; clava ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* inflexum, thoracis longitudine, crassiusculum, cylindricum, subrectum: scrobe curvata, lineari, profunda, pone medium incipiente, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* ovales, immersi, in fronte fere contigui. — *Thorax* longitudine latior, basi leviter bisinuatus, lateribus ultra medium rectis, antrosum abrupte angustior, coarctatus, antice in medio productus, supra planiusculus, infra pone gulam profunde et acute emarginatus. — *Scutellum* ovatum, distinctum. — *Elytra* basi thoracis paullo latiora, quo vero plus triplo longiora, pone humeros angulata, sub eosdem inferne producta, angulato-dentata, lateribus versus apicem sensim paullo angustata, supra modice convexa, apice obtuse rotundata, anum occultantia. — *Sternum* inter coxas medii pariter porrectum, breve, crassum, apice obtusum. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validi, antici subapproximati; femoribus parum incrassatis, subtus denticulatis; tibiis angula-

tis, subcompressis, subcrassis, rectis, intus dentē medio denticulo minuto armatis, apice truncatis, unco minuto, acuto intus instructis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, unguiculo clavato, biunguiculato.

Typus: *Orobitis trachyptomus* Germ.

A στέρνον pectus, *εχών* habens.

Observatio: — Cum habitu, tum etiam sterno porrecto, hocce genus *Oxyopis* aliquantum simile est; nec vero antennae, neque reliquorum membrorum formatio propriam huius generis similitudinem exhibent. Mihi videtur rostri elytrorumque forma, conjunctionem cum *Orobitide*, aut *Dionymero*, cum quoniam canalicula quoque pectoralis deest, prohibere posse. Sequentis *Tylomi* generis habitus quaedam est convenientia; antennae vero oculique imprimis aliter compositae constructaeque sunt.

Genus 147. *Tylomus* nob. *Orobitis* Germ.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis lenticularibus, gradatim paullo latioribus; clava ovalis.

Rostrum longiusculum, validum, cylindricum, rectum.

Oculi subapproximati, rotundati, depressi.

Thorax antrorsum multo angustior, basi obsolete bisinatus.

Elytra subovata, sub humeros angulato-producta.

Descriptio: — *Corpus* ovale, breve, convexum, pollinosum, alatum. — *Antennae* thoracis basin fere attingentes, in medio rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, illo majore, 4-8 lenticularibus, gradatim crassitudine crescentibus; clava magna, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite fere duplo longius, subinflexum, validum, cylindricum; rectum; scrobe in medio incipiente, in basi rostri subtus exeunte, curvata, angusta, profunda. — *Caput* parvum, orbiculatum. — *Oculi* magni,

subapproximati, rotundati, depressi. — *Thorax* latitudine postica paullo brevior, anterie sensim angustatus, lateribus rotundatus, subconicus, postice leviter bisinuatus, antice parum productus, subtruncatus, supra modice convexus, infra pone gulam emarginatus. — *Scutellum* rotundatum, distinctum. — *Elytra* basi thoracis paullo latiora, quo vero quadruplo longiora, subovata, convexa, humeris obtuse angulatis, subelevatis; margine sub humero angulata, subspinosa, deinde sensim attenuata, apice rotundata, pygidium obtegentia. — *Pedes* breviusculi, longitudine aequales, validi, antici basi approximati; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis teretibus, linearibus, rectis, subcrassis, canaliculatis, apice truncatis, unco horizontali, acuto, valido intus instructis; tarsis longiusculis, subtus spongiosis, articulo ungiculari valido, clavato, biungiculato.

Typus: — *Orobit. gonopterus* Germ. nec plures species vidi.

Α τῦλος callus ὤμος humerus.

Observatio: — Ad habitum *Orobitidis*, *Dionyeri* et *Cleogoni* generibus proximum, dignoscitur vero pedibus anticis approximatis, antennisque aliter constructis.

*****) Genus 148. *Orchestes* Illig. Oliv. — *Salius* *) Germ. Schrank. — *Rhynchaen.* Clairv. Latr. Fabr. Gyllenh.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtennes, 11-articulatae: funiculo 6-articulato: articulo 1^o majore, crassiusculo, 2^o et 3^o oblongis, reliquis brevibus, apice truncatis; clava crassa, oblongo-ovata.

Rostrum elongatum, validiusculum, subteres, arcuatum, inflexum.

Oculi magni, rotundati, prominuli, approximati.

Thorax parvus, subconicus.

Elytra oblongo-ovata, thorace latiora, apice obtuse rotundata.

*) Nomen genericum: *Salius* in Syst. Piezator: dudum a Fabricio usitatum.

Pygidium plerumque nudum.

Pedes validi; femora postica crassa, saltatoria.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque longiores, aut ante, aut pone medium rostri insertae, subtenues, fractae, deflexae, 11-articulatae: articulo 1^o extrorsum crassiore, recto, oculos subtingente, 2^o magno, obconico, 3^o et 4^o oblonga, etiam conicis, 5-7 brevibus, apice truncatis, subaequalibus; aqua crassa, ovata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine iquanto variat: in plerisque capite thoraceque longius, in incis brevis, validiustulum, subteres, arcuatum, inflexum; rostre recta, lineari, pone canthum oculorum desinente. — *Caput* parvum, subelongatum. — *Oculi* magni, rotundati, prominuli, in fronte fere contigui. — *Thorax* parvus, elytris postice etiam evidenter angustior, transversus, subconicus; antice coarctatus, postice aut leviter bisinuatus, aut subuncatus, supra modice convexus, infra pone gulam non marginatus. — *Scutellum* punctiforme, distinctum. — *Elytra* magna, aut oblongo-, aut breviter ovata, thorace plus innasve latiora, quo triplo l. quadruplo longiora, humeris ruse angulatis; supra parum convexa, apice obtuse rotundata. — *Pygidium* saepius nudum, postice rotundatum. — *Pedes* validi, antici approximati, anteriores multo breviores; femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis apice non unguatis; femoribus posticis saepius valde incrassatis, saltatoribus, aut denticulatis, aut muticis; tibiis extus oblique truncatis, canaliculatis; tarsis duobus basalibus triangularibus, 3^o subelongato, penultimo dilatato, bilobo, omnibus subparum spongiosis, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Orch. Viminalis* Auct. — *Congenerici*: *Orchest. scutellaris*, rufus, *Alni*, *melanocerialus*, *Lonicerae* et *Ilicis* Oliv. — *Fagi* — Auctor. — *h. pilosus* Gyll. — *Curc. Rosae* Herbst. l. *Jota* br. — *Rh. signifer* et *bifasciatus* Gyll. —

Ab *ὀρχηστρίς* saltator.

Observatio: — Facile a reliquis hocce genus dignoscitur: illis approximatis, rostro inflexo femoribusque posticis crassis, saltatoriis.

Subgenus *Tachyerges* nob. — *Orchestes* Illig. Oliv. —
Rhynchaenus Fabr., Gyllenh.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, subtenues, 12-articulatae; scapo extrorsum crassiore, recto; funiculo 7-articulato: articulo 1^o magno, obconico, 2^o et 3^o oblongis, etiam obconicis, 4-7 brevibus, apice truncatis; clava crassa, oblongo-ovata. — *Rostrum* capite duplo longius vel plus pro sexu, validiusculum, subteres, arcuatum, inflexum. — *Oculi* magni, in fronte subcontigui. — *Thorax* parvus, subconicus. — *Elytra* subovata, humeris obtusae angulatis. — *Pedes* validi, saltatorii; femoribus posticis plus minusve incrassatis, muticis; tibiis extus oblique truncatis, canaliculatis.

Typus: — *Rhynchaen. Salicis* Fabr. Gyll. Congenerici: *Rh. Jota* Gyll. — *Rh. Saliceti* Fabr. — *Orch. rufitarsis* Dej. — *Orch. confinis* Megerle.

A ταχυεργς celer in aliquid agendo.

Observatio. — In plurimis cum *Orchestidibus* conveniunt hujus subgeneris species, sed accessio numeri articularum funiculi antennarum distinctionem postulat.

Subdivisio 2^a. Exscutellati - Apteri.

*) Genus 149. *Solenorhinus* nob. — *Curculio* Sparrm.

Character generis: — *Antennae* longae, tenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, reliquis gradatim brevioribus, omnibus obconicis; clava oblonga, subfusiformis.

Rostrum elongatum, validum, lineare, arcuatum, canaliculatum.

Thorax longus, antice posticeque truncatus, lateribus aequaliter rotundatus.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem attenuata.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, apterum. — *Antennae* dimidii corporis longitudine, infra medium rostri in-

sertae, tennes, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, tenui, apice clavato, flexo, 2^o et 3^o elongatis, 4 et 5 paullo, 6-7 et 8 adhuc brevioribus, omnibus obconicis; clava oblonga, fusiformi, 4-articulata, articulis obliquis. — *Rostrum* capite thoraceque paullo longius, validum, arcuatum, perpendiculare, sublineare, versus apicem deplanatum, supra in medio lateribusque canaliculatum; scrobe curvata, profunda, versus apicem rostri incipiente, pone canthum oculi exeunte. — *Oculi* laterales, ovati, parum prominuli, magni, oblique positi. — *Thorax* latitudine longior, antice posticeque truncatus, anterieus subcoarctatus, lateribus aequaliter rotundatus, supra convexus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* oblongo-ovata, thoracis basi dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, basi conjunctim introrsum subemarginata, humeris antrorsum prominulis, obtuse angulatis; supra modice convexa, versus apicem attenuata, non callosa, apice ipso subacuminata, anum obtegentia. — *Pedes* validi, longiusculi, antici subelongati, approximati, femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis, apice truncatis, muticis; tarsis longis, subtus spongiosis, articulo 1^o et 2^o subcordatis, illo magno, 3^o bilobo, ultimo valido, biunguiculato.

Typus: — *Curc. porifer* Sparrm. Act. Holm. — nec plures species vidi.

Α σωλην̄ canalis, ῥιν̄ nasus.

Observatio: — Respectu habitus et staturae *Rhynchaeni* genuini generi similitudine prope accedit, differt vero corpore aptero, haud scutellato.

Genus 150. *Anchonus* nob. — *Rhynchaenus* Fabr. Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculus 8-articulatus: articulo 1^o brevissimo, 2^o elongato, obconico, 4-8 brevibus, perfoliatis, coarctatis; clava breviter ovata.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, arcuatum ante basin constrictum, tumidum.

Oculi laterales, parvi, immersi.

Thorax juxta apicem coarctatus, pone oculos sublobatus.
Elytra ovata, convexa.

Descriptio: — *Corpus* ovatum, rigidum, scabrosum, apterum. — *Antennas* ad thoracis medium pertingentes, prope medium rostri insertae, crassiusculae, 12-articulatae: articulo 1^o clavato, paullulum curvato, oculos haud attingente, 2^o brevissimo, nodoso, 3^o elongato, obconico, 4-9 brevibus, perfoliatis, coarctatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava breviter ovata, 3-articulata, articulis arctissime connexis, vix distinctis. — *Vertex* laevissimus, convexus. — *Rostrum* longitudine capitis thoracisque, crassiusculum, tumidum, teres, arcuatum, ante basin valde constrictum; scrobe infra-oculari, obliqua. — *Oculi* parvi, remoti, sub capite ad basin rostri fere occultati, immersi. — *Thorax* latitudine fere longior, juxta apicem coarctatus, lateribus rotundatus, basi truncatus, supra parum convexus, infra pone gulam profunde emarginatus, lobis minutis pone oculos productis. — *Scutellum* vix conspicuum. — *Elytra* connata, ovata, antice thoracis basi paullo latiora, mox vero pone basin valde ampliata, thorace triplo longiora, supra convexa, postice declivia, apice rotundata, anum obtegentia. — *Pedes* validi, antici approximati; femoribus subclavatis, muticis; tibiis omnibus apice interiore unco valido armatis; tarsis breviusculis, subtus pilosis, unguiculo parum clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. suillus* Fabr. — *Congenericus:* *Rhynch. subspinosus* Fabr.

Ab *dyx* strangulo, fauces constringo.

Observatio: — Hoc genus, praeter consuetudinem, octo articulis funiculi antennarum evidentibus constare, quod vix in ullo alio est observatum, ut et singularem esse capitis structuram, rostri oculorumque, facillime ab reliquis dignoscitur.

**) Genus 151. *Styphlus* nob.

Character generis: — *Antennae* mediocres, subtenues; funiculo 7-articulato: articulo 1^o elongato, clavato, reliquis brevibus, rotundatis; clava subovata.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, parum arcuatum, ante basin subconstrictum.

Thorax longus, subcylindricus.

Elytra oblongo-ovalia, connata; humeri prominuli.

Descriptio: — *Corpus* parvum, elongatum, subcylindricum, rigidum, setosum; apterum videtur. — *Antennae* thoracis medium vix superantes, infra medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o longiusculo, subclavato, 3-8 brevibus, rotundatis, subaequalibus; clava 4-articulata, oblongo-ovata, acuminata, articulis distinctis. — *Rostrum* thoraci longitudine subaequale, crassiusculum, lineare, parum arcuatum, supra 3-carinatum, ante basin subconstrictum; scrobe prope apicem rostri incipiente, lineari, profunda, lata, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* parvi, distantes, subovati, immersi. — *Thorax* latitudine longior, subcylindricus, basi apiceque truncatus, antice coarctatus, infra pone gulam leviter emarginatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* oblongo-ovalia, basi thoracis vix latiora, angulis humeralibus prominulis; lateribus usque ad apicem parum rotundata, medio latiora, connata, abdomine haud breviora. — *Pedes* breves, validi, subaequales, antici approximati; femoribus incrassatis, muticis; tibiis latiusculis, compressis, intus sinuatis, apice truncatis, muticis; tarsis breviusculis, articulis duobus basalibus trigonis, 3^o dilatato, bilobo, omnibus subtus parum spongiosis, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Styphlus penicillus* nob. e Gallia mer. in Mus. Reg. Acad. Scient. Holm. asservatur.

A στύφλος asper.

Observatio: — Hoc genus, si non idem ac *Ortochaetes* (Germ. Ins. sp. I. pag. 302.), simillimum tamen ei videtur; cum vero funiculus antennarum septem-, non sex-articulatus, rostrumque aliquanto aliter constructum, dubium mihi oritur, an hoc possit esse idem, ac a D. Germaro descriptum, etsi descriptio specifica *Ortochaetes tegeri* tam Celeb. Germarii, quam quae in Beytr. zur Bai. In. Fn. p. 21. exstat, maximam cum specimine meo convenientiam habeat.

Genus 152. *Trachodes* Schüpp. Germ. — *Rhynchaenus* Gyll. — *Curtulio* Linn. Payk.

Character generis: — Antennae breviusculae; funiculo 7-articulato: articularis duobus basalibus obconicis, illo paullo crassiore, reliquis rotundatis, gradatim paullo latioribus; clava breviter ovata.

Rostrum elongatum, subtenne, arcuatum, lineare.

Thorax basi apiceque truncatus, antice coarctatus, lateribus rotundatus.

Elytra ovata, convexa, versus apicem attenuata, supra modice convexa.

Descriptio: — *Corpus* parvum, ovatum, hispidum, apterum. — *Antennae* ad thoracis medium vix pertingentes, prope medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subtenni, apice clavato, 2^o et 3^o obconicis, illo majore, 4–8 rotundatis, subaequalibus, exterioribus sensim crassioribus; clava breviter ovata, articulis 4 arcte connexis. — *Rostrum* capite thoraceque fere longius, subtenne, lineare, arcuatum, scrobe profunda, lineari ad basin rostri subtus versus oculi marginem desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, depressi. — *Thorax* latitudine fere longior, antice subangustior, coarctatus, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra convexus, infra pone gulam emarginatus. — *Scutellum* nulum. — *Elytra* basi vix thorace latiora, angulis humeralibus rotundata, ante medium magis ampliata, versus apicem attenuata, thorace triplo longiora, convexa, coadunata, anum obtegentia. — *Pedes* elongati, validi, antici approximati; femoribus valde clavatis, aut dentatis, aut muticis; tibiis crassiusculis, subcompressis, apice haud latioribus, unco valido armatis, omnibus saepius in medio dilatatis; tarsis subtus vix spongiosis, articulo 1^o oblongo, triangulari, 2^o brevi, penultimo bilobo, unguiculo saepius brevi, gracili, interdum elongato, clavato, ungulis binis.

Typus: — *Curc. hispidus* Linn. l. *Rhynch. squamifer* Gyll. Congen. *Trachod. ptinoïdes* Germ.

A *ραχὺς* asper, hispidus.

(*Diagnos. 2.* Cholidēs. Pedes antici basi distantes, inter quos pectus planum, plus minusve immittitur.)

*) Genus 153. Rhinastus neb. — Chols Germ.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus, apice truncatis; clava parva, ovata.

Caput valde elongatum, demissum.

Rostrum longum, validum, arcuatum, angulatum; scrobe lata, non profunda.

Thorax transversus, basi bisinatus, lateribus deplanatus, versus apicem valde angustatus; sternum mucronatum.

Elytra subcordata, deplanata, margine costata.

Descriptio: — Corpus magnum, rhombicum, supra fere planum, squamosum, alatum. — *Antennae* rostro breviores, in medio rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, parum clavato, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, 4-8 brevibus, apice truncatis, sensim paullo crassioribus, illo paullo longiore; clava parva, ovata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Caput* elongatum; demissum, antice sensim in rostrum continuatum. — *Rostrum* magnum, validum, inflexum, dimidio corpore longius, basi capitis fere latitudine, extrorsum sensim angustatum, valde arcuatum, supra subplanum, ad latera angulatum, exinde subtrigonum, subtus saepius denticulatum; scrobe in medio incipiente, subrecta, paullatim versus oculos lata, non profunda, ante marginem oculi desinente. — *Oculi* valde remoti, laterales, minores, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine dimidio latior, basi latus, bi-sinuatus, lateribus rotundatus, deplanatus, versus apicem valde angustatus et coarctatus, subtus inter pedum anticorum basin mucrone magno, truncato instructus. — *Scutellum* rotundatum, depressum, distinctum. — *Elytra* subcordata, thoracis basi vix latiora et illo paullo longiora, versus apicem sinuato-attenuata, margine explanata, costata, dorso planata, ante apicem subcallosa, abdomen subobtegentia. — *Pedes* elongati,

antici longiores, basi distantes, graciles; femoribus rectis, parum clavatis, dentatis; tibiis compressis, anterioribus versus apicem curvatis, intus angulatis, posterioribus ante apicem penicillatis, posticis apice dente perpendiculari armatis; tarsiis latis, subtus spongiosis; ungue parum clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhinastus pertusus* Dalm. — *Congenericus*: *Cholus sternicornis* Germ.

A *ῥιν* nasus, eodem modo, quo *Rhamphastus* formatus est ab *ῥαμφος*.

Observatio: — Insolita corporis forma valde deplanata, caput demissum, rostrum grande singularis structuræ, scrobs lata sed parum profunda, antennarum clava exigua, sternum porrectum; species huc relatas a *Choli* genere abunde distinguunt, ut et in multis illarum characteres sibi invicem sunt oppositi.

Genus 154. *Cholus* Germ. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuæ; funiculo 7-articulato: articulo 1^o elongato, clavato, 2^o brevior, obconico, reliquis brevissime obconicis, gradatim paullo latioribus; clava oblongo-ovalis, acuminata.

Rostrum subtenuæ, longiusculum, versus apicem deplanatum; scrobs angusta, profunda.

Thorax transversus, basi bisinuatus, versus apicem angustatus.

Elytra subobconica ab humeris ad apicem sensim angustata.

Descriptio: — *Corpus* robustum, fere rhombicum, supra parum planiusculum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, infra medium rostri insertae, subtenuæ, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattinente, tenui, versus apicem clavato, paululum arcuato, 2^o elongato, etiam subclavato, 3^o paullo brevior, obconico, 4-8 brevissime subobconicis, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Caput* subexsertum, orbiculatum. — *Rostrum* capite thoraceque longius, deflexum, subtenuæ, mo-

dice arcuatum, teres, saepius apice latius deplanatum; scrobe pone medium incipiente, angusta, profunda, recta, versus marginem anticum oculi desinente. — *Oculi* laterales, majusculi, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latior, basi leviter bisinuatus, versus apicem jam mox angustatus, subcoarctatus, in medio antice subproductus, saepe sinuatus, supra parum convexus, lateribus pone oculos saepius sublobatus, infra late et obsolete canaliculatus, pone gulam emarginatus. — *Scutellum* apice rotundatum, saepius subtransversum, subelevatum. — *Elytra* subobconica, basi thoracis vix latiora, singulatim subrotundata, humeris saepius retusis; ab humero ad apicem sensim angustata, lateribus inflexa, dorso deplanata, apice subacuminata, abdomen obtegentia. — *Pedes* elongati, validi, antici longiores, basi distantes; femoribus clavatis, dentatis; tibiis subcurvatis, apice truncatis, dente horizontali armatis, extus apice ciliatis, unco perpendiculari instructis; tarsis latis, subtus spongiosis, articulo ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Cholus albicinctus* Germ. — Congenerici: *Chol. geometricus* Germ. — *Rh. annulatus* et *Rana* Fabr.

A χολός claudus.

Observatio: — Generi *Dionychi* proxime, praesertim quoad structuram rostri, affinitate accedit. Forma corporis rhombica, rostroque apice deplanato, hoc a *Balanini* et *Baridii* generibus facile dignoscitur.

Subgenus *Callinotus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, subtenues; funiculo 7-articulato: articulo 1° valde elongato, clavato, 2° paullo brevior, 3-6 brevibus, apice subrotundatis, crassitudine crescentibus, 7° crassiore, cyathiformi, clavae basin mentiente; clava ovata, acuminata. — *Rostrum* longiusculum, inflexum, subtenue, teres, sublineare, subarcuatum; scrobe angusta, profunda, sublineari, versus oculi medium desinente. — *Oculi* subovati, vix prominuli. — *Thorax* transversus, basi profunde bisinuatus, anterieus angustior, lateribus rotundatus, antice subproductus, sinuatus,

supra parum convexus, infra pone gulam emarginatus, late et obsolete canaliculatus. — *Scutellum* aut transversum, aut oblongum, apice rotundatum, subelevatum. — *Elytra* basi thoracis vix latiora, oblonga, subovalia, angulis humeralibus subretusis, subrotundatis; antice singulatim rotundata, producta, lateribus inflexa, dorso deplanata, apice aut obtuse rotundata, ant acuminata. — *Pedes* antici basi parum distantes; constructi praeterea ut in genere *Choli* genuini. — *Corpus* oblongo-subovatum, pulchre insignitum, alatum.

Typus: — *Cholus* (*Callinotus*) praefectus nob. e Brasilia a Lib. Bar. D. Gyllenkrok benigne mecum communicatus. Congenericus *Chol.* (*Callin.*) circumscriptus nob.

A κάλλος pulchritudo, ὄπισθος dorsum.

Observatio: — Forma corporis antennarumque nonnihil diversa, rostro tereti, sublineari, pedibusque anticis basi parum distantibus hocce subgenus praecipue a *Cholis* genuinis distinguitur.

Genus 155. *Dionychus* Germ. — *Archarias* Dej. — *Rhynchaenus* Fabr. Oliv.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulo 1^o elongato, clavato, 2^o brevior, obconico, reliquis brevibus, lenticularibus, gradatim paullo latioribus; clava oblongo-ovalis.

Rostrum longum, validum, arcuatum, versus apicem deplanatum.

Thorax transversus, basi subbisinuatus, anterieus valde angustior.

Elytra thoracis basi vix latiora, oblongo-ovalia, dorso parum convexa.

Descriptio: — *Corpus* majusculum, fere ellipticum, parum convexum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, pone medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o elongato, etiam clavato, 3^o brevior, obconico, 4-8 brevibus, transversis, lenticularibus, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava oblongo-ovali, apice saepius obtusa et compressa, raro acuminata, articulis 4 ar-

ctissime connexa. — *Caput* subexsertum, orbiculatum. — *Rostrum* thoraci subaequale vel longius, validum, arcuatum, teres, versus apicem deplanatum; aprobe pone medium incipiente, subrecta, lineari, profunda, pone oculos desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latior, basi leviter bisinuatus, anterieus valde angustatus, parum coarctatus, lateribus rotundatus, dorso non-nihil convexus, infra pone gulam emarginatus, versus oculos non lobatus. — *Scutellum* apice rotundatum, distinctum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo vero triplo longiora, oblongo-ovalia, humeris obtuse rotundatis; basi subtruncata, apice rotundata, supra parum convexa, versus apicem nonnunquam subcallosa, pygidium obtegentia. — *Pedes* elongati, robusti, basi distantes, intermedii breviores; femoribus incrassatis, dentatis; tibiis compressis, apice unguibus duobus acutis terminatis, extus versus apicem penicillatis, anterioribus in paucis intus in medio denticulo magno instructis; tarsis latis, trigonis; articulis tribus primis contiguis, subtus spongiosis, penultimo bilobo, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — *Dionych. parallelogrammus* Germ. — Congenerici: *Dion. platynotus* et *alboguttatus* Germ. — *Rhynchaen. miliaris* Fabr. et Oliv. — *Dion. zonnarius* nob.

Α δις bis ὀνξ unguis.

Observatio. — Generi Choli, a quo forma corporis, rostro antennisque crassioribus, diversa earum structura discrepat, appropinquat.

Subgenus *Homalinotus*. nob. Sahlb. — *Dionychus* Germ. — *Calandra* Fabr. — *Curculio* Linn. De Geer.

Adumbratio: — Antennae mediocres, validae; funiculo 7-articulato: articulo 1^o elongato, clavato, 2^o brevior, obconico, reliquis brevibus, lenticularibus, 7^o latiore, clavae adpresso, sed distincto; exterioribus sensim paullo crassioribus; clava minuta, subovali, apice compressa. — *Rostrum* longum, validiusculum, parum arcuatum, teres,

sublineare. — *Oculi* ovati, subdepressi. — *Thorax* transversus, basi subbisinuatus, lobo medio saepius subrotundatus, antice subproductus, in medio subemarginatus, pone oculos lobatus, supra deplanatus, lateribus in plerisque rotundatus, anterieus angustior, coarctatus; in paucis (*Calandra indus* Fabr.) antice latior, obtuse angulatus, posterius multo angustior. — *Elytra* subovalia, antice conjunctim introrsum subemarginata, humeris antrorsum subprominulis, obtuse angulatis; dorso valde deplanata, versus apicem vix callosa, apice ipso saepius obtuse rotundata, in nonnullis acuminata, anum obtegentia. — *Pedes* pari modo, ac in genere genuini *Dionychi* constructi, at tibiae solummodo in medio intus dilatatae.

Typus: — *Dionychus circumdatus* Germ. l. Homalin. deplanatus Sahlb.

Species mihi cognitae et huc etiam pertinentes: *Dionych.* (Homalin.) *porosus* nob. — *Calandra indus* Fabr. — *Curc. morbillator* Herbst.

Ab ὀμαλὸς planus, ὠτὸς dorsum.

Observatio. — *Dionychi* genuini generi proximum. Corpore supra deplanato, clava antennarum multo minore, rostro lineari, thorace pone oculos lobato, elytrisque antice emarginatis, hocce forsitan distinguitur subgenus. Num proprium posset esse genus?

Genus 156. *Amerhinus* nob., Sahlb. — *Amerhis* Billb. — *Ameris* Germ. — *Rhynchaenus* Kirby.

Character generis: — Antennae mediocres, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, subobconicis, 1^o longiore, reliquis brevibus, apice truncatis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum longiusculum, inflexum, validum, modice arcuatum.

Thorax transversus, antice coarctatus, lateribus rotundatus, supra convexus.

Scutellum oblongum, subelevatum.

Elytra subcylindrica, valde convexa; basi transverse impressa, apice maxime obtuse rotundata.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, subcylindricum, nonnunquam subobconicum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non attingentes, infra medium rostri insertae, validiusculae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, 2^o et 3^o longiusculis, subobconicis, illo longiore, 4-8 brevibus, subcoarctatis, apice truncatis, gradatim paullo latioribus; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arctissime connexis. — *Rostrum* inflexum, thoracis fere longitudine, plus minusve validum, subcylindricum, in paucis teres, subrectum, modice arcuatum, apice subdeplanatum, denudatum; scrobe versus apicem rostri incipiente, subrecta, sensim versus oculos lata, profunda, pone oculos desinente. — *Caput* exsertum hemisphaericum. — *Oculi* laterales, mediocres, subrotundato-ovales, modice prominuli. — *Thorax* latitudine paullo brevior, basi bisinuat, lateribus plus minusve rotundatus, anterieus jam mox angustatus, coarctatus, tubulatus, supra convexus, in quibusdam subglobosus, pulvinatus; pone oculos modice lobatus, infra pone gulam profunde emarginatus, late et obsolete canaliculatus. — *Scutellum* parvum, sed distinctum, oblongum, subelevatum. — *Elytra* thoracis baseos latitudine, illoque triplo longiora, subcylindrica, posterius gradatim parum angustata, supra convexa, basi transverse impressa, prope apicem callo lato, satis elevato, apice ipso maxime obtuse rotundata, fere truncata, anum vix obtegentia; humeris aut obtuse angulatis, aut subprominulis. — *Pedes* validi, antici basi distantes, intermedii breviores; femoribus modice clavatis, dentatis; tibiis subarcuatis, compressis, apice breviter calcaratis; tarsis latis, subtus spongiosis, articulo ultimo elongato, parum clavato, biunguiculato.

Typus: — (Rhynchaen.) *Dufresnii* Kirby l. Rh. *Pardalis* Dalm.

Huc quoque adnumerantur: Amerh. *Ynca* Sahlb. l. *Dionychus* ruidus Germ. — Amerh. *Pavo* et *Pardus* Germ. et species quatuor indeductae.

Ab *Agon* falx messoria, sarculum, *Agon* natus.

Observatio: — Thorax in nonnullis magnus, rotundatus l. sphaerobosus, subtus obsolete canaliculatus, ut et elytra fere cylindrica, posterius parum angustata, faciem huic generi propriam addunt.

Genus 157. *Solenopus* nob. — *Odontoderes* Sahlb. — *Dionychus* Germ.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus clavatis, reliquis brevissime subobconicis, ultimo clavae adnexo; clava oblongo-ovata.

Rostrum longum, cylindricum, subtenue, arcuatum.

Thorax lateribus rotundatus, a medio ad apicem attenuatus.

Scutellum apice rotundatum, planum.

Elytra elongata, convexa, cylindrica.

Tibiae compressae, extus canaliculae.

Descriptio: — *Corpus* majusculum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* longitudine rostri capitisque, infra medium rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, tenui, versus apicem clavato, 2^o et 3^o elongatis, aequalibus, etiam obconicis, 4-8 brevissime subobconicis, subcontractis, 8^o paullo majore clavae basi arcte adpresso, clava oblongo-ovata, acuminata, articulis arctissime connexis. — *Rostrum* capitis thoracisque longitudine, deflexum, cylindricum, subtenue, modice arcuatum; scrobe recta, profunda, sublineari, ad oculum extensa. — *Oculi* laterales, ovati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, basi aliquantulum bisinuatus, angulis posticis atque lateribus rotundatus, (dense granulatus, anterieus granulis dentiformibus sat crebre adspersus,) a medio ad apicem attenuatus, antice parum productus, in medio leviter emarginatus, ad latera contractus, supra parum convexus, pone oculos lobatus, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* apice rotundatum, planum. — *Elytra* thorace paullo latiora, quo duplo et dimi-

dio longiora, subcylindrica, parum convexa, pone apicem callosa, apice ipso rotundata, animum non obtegentia, humeris obtuse angulatis. — *Pedes* validi, antici elongati, basi parum distantes; senioribus clavatis, dentatis; tibiis compressis, intus in medio parum dilatatis, exius profunde canaliculatis, apicē calcaratis; tarsis latis, anterioribus (forsitan pro sexu) villosis, omnibus subtus spongiosis, articulo ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Odontoderes Cacicus* Sahlb. l. *Dionychus granicollis* Germ. — nec plures species vidi.

Α *σάλην* canalis, *πὺς* pes.

Observatio: — Habitu et statura Amerhini generi appropinquat. Ex antennis longioribus, magis tenuibus aliterque constructis, ut et tibiis extus canaliculatis, differentia essentialis elucet.

Genus 158. *Nettarhinus* nob.

Character generis: — Antennae brevēs, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus longioribus, clavatis, reliquis brevissimis, subperfoliatis, crassitudine parum crescentibus; clava subovata, acuminata.

Rostrum breviusculum, crassiusculum, sub capite insertum, versus apicem sensim ampliatum, supra deplanatum, rectum.

Thorax transversus, convexus, basi subtruncatus, lateribus aequaliter valde rotundatus, antèrius coarctatus.

Elytra cylindrica, apice acuminato-spinosa.

Pedes breviusculi, validi; tibiae compressae.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, cylindricum, rigidum, scabrosum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, infra medium rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, clavato, subrecto, 2 et 3 longiusculis, clavatis, 4-8 brevissimis, subperfoliatis, crassitudine paullo crescentibus, articulo ultimo clavae adnexo; clava subovata, apice acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Caput* exsertum, hemisphaericum: — *Rostrum* capite paullo longius, crassiusculum,

sub capite insertum, inflexum, basi latiusculum, exinde parum angustatum, versus apicem iterum ampliatur, supra deplanatum, subdepressum, omnino rectum; scrobe subrecta, versus apicem rostri incipiente, angusta, profunda, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* magni, laterales, perpendiculares, ovati, parum prominuli. — *Thorax* latitudine paullo brevior, basi subtruncatus, vel potius late introrsum submarginatus, angulis posticis acutis productus, lateribus aequaliter valde rotundatus, anterie subito angustatus, valde coarctatus, antice in medio productus, supra valde convexus, inaequalis, pone oculos lobatus, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* satis distinctum, apice rotundatum, depressum. — *Elytra* medio thoracis haud latiora eoque duplo longiora, cylindrica, valde convexe, inaequalia, versus apicem callosa, lateribus recta, apice obtuse rotundata, in spinam parvam internam, acutam, rectam excurrentia; humeris acute angulatis. — *Pedes* validi, antici elongati, basi distantes, posteriores breves; femoribus parum incrassatis, dentatis; tibiis subcrassis, compressis, subrectis, intus pone medium dente, in apice unco horizontali armatis; tarsis latis, subtus spongiosis, articulo ultimo parum clavato, biunguiculato.

Typus: — *Nettarh. anthribiformis* nob e Brasilia. — Unam tantum speciem vidi.

A *νηττα* anas, *ῥιν* nasus.

Observatio. — Ex brevitate rostri dubium oritur, an ad *Brachyrhynchos* hoc genus sit referendum, nec ne; facies enim exterior *Amerhinis* propinqua, unde ad hoc retuli; habitus quoque est plurium e *Divisione Anthribidum* generum, essentielles vero notae sunt omnino aliae.

**) Genus 159. *Alcides* Dalm., Sahlb. — *Lixus* Fabr. Wiedem. Megerle. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — *Antennae* breviusculae, validae; funiculo 6 articulo: articulis duobus basalibus obconicis, 1^o subelongato, reliquis brevibus, subrotundatis; clava subovata.

Rostrum mediocre, teres, lineare, subrectum.

Thorax postice latior, trilobus, antice angustatus.

Elytra aut subovalia, gibba, aut elongata, subcylindrica, basi singulatim valde producta, thoracis emarginaturas replentia, eique arcte applicata.

Descriptio: — *Corpus* aut ovale, gibbum, aut oblongum subcylindricum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, versus medium rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, valde clavato, recto, 2 et 3 obconicis, illo subelongato, 4-7, subrotundatis, subaequalibus, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava subovata, apice acuminata, 5-articulata, articulo basali elongato, reliquis brevibus, arcte connexis. — *Rostrum* thoracis longitudine, validiusculum, inflexum, teres, lineare, in plerisque subrectum, in nonnullis parum arcuatum; scrobe in medio incipiente, lineari, flexa, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, ovales, depressi. — *Thorax* postice latior, trilobus, lateribus rotundatus, antice angustatus, coarctatus, supra convexus, pone oculos in lobum obtusum protractus, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* minutum, transversum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo autem fere triplo longiora, basi singulatim valde producta, thoracis emarginaturas implentia, eique arcte applicata, apice rotundata, anum obtegentia; aut subovalia, gibba, posterius sensim atque paullulum angustata, aut elongata, subcylindrica. — *Pedes* robusti, antici longiores, basi distantes; femoribus parum clavatis, acute dentatis; tibiis inflexis, crassiusculis, parum compressis, subrectis, apice unco armatis; tarsorum articulis duobus basalibus trigonis, penultimo latiore, bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo clavato, biunguiculato, ungulis brevibus.

Typus: — *Lix. trilobus* Fabr. — Congenerici: *Alcides senex* Sahlb. — *Rhynch. Fabricii*, *sulcatus*, *dentipes*, *Angulus* et *Bubo* Fabr. *Lix. alboguttatus* Wiedem. — *Curc. laniger* Sparrm.

Ab αλκην̄ robur, vires.

Observatio: — Thorax postice profunde bis-emarginatus, et elytra antice producta, emarginaturas thoracis implentia, manifestam huic generi faciem reddunt.

***) Genus 160. *Platyonyx* nob. — Baris Dejean.

Character generis: — Antennae longae, subtenues; funiculo 7-articulato; articulo 1^o subelongato, obconico, reliquis brevissime obconicis; clava valde elongata, fusiformi.

Rostrum longum, subfiliforme, arcuatum.

Thorax antice angustatus, postice bisinuatus, in medio lobatus.

Elytra subovata, planiuscula, pygidium vix obtegentia.

Tarsi antici lati; unguiculus trigonus, valde dilatatus.

Descriptio: — *Corpus* breviter subovatum, supra depressiusculum, alatum. — *Antennae* thoracis medium vix superant, pone medium rostri ante apicem insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculorum marginem inferiorem attingente, tenui, apice inflato, 2^o subelongato, obconico, 3-8 brevissime obconicis, subaequalibus; clava valde elongata, fusiformi, 4-articulata, articulis difficile discernendis — *Rostrum* thoraci subaequale, subtenue, subteres, arcuatum; scrobe versus apicem incipiente, lineari, angusta, cito deorsum flexa et in inferiore parte rostri desinente. — *Oculi* laterales, ovati, depressi, magni. — *Thorax* longitudine fere latior, anterieus angustior, truncatus, lateribus subrotundatus, basi bisinuatus, ante scutellum subproductus, supra parum convexus, infra in medio obsolete depressus. — *Scutellum* apice rotundatum, distinctum. — *Elytra* antice thoracis basi vix latiora, quo duplo longiora; angulis humeralibus rotundatis; posterius angustata, subovata, apice rotundata, abdomine paullo breviora. — *Pedes* mediocres, validiusculi, antici distantes, (postici in nostro absunt;) femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis teretibus, rectis, apice truncatis, muticis: tarsis anticis latis, articulis duobus basalibus trigonis, penultimo latiore, bilobo, omnibus subtus spongiosis, unguiculo trigono, versus apicem satis lato, lateribus dilatato, supra in medio carinato, apice biunguiculato, ungulis gracilibus; tarsi intermediarii structura solita.

Typus: — *Baris ornatus* Dej. Catal. — Unicam speciem vidi.

Δ πλάτεις latus, *ὄνυχ* unguis.

Observatio: — Quoad antennis intercedit magna cum *Madari* genere similitudo, habitu autem *Balamini* generi proxime accedit. Singularis et insolita unguicularis tarsorum anticorum articuli structura, manifestum reddit hoc genus.

Genus 161. *Madarus* nob. — *Calandra* Fabr.

Character generis: — Antennae longiusculae, validae; funiculo 7-articulato: articulo 1^o subelongato, obconico, reliquis brevissime obconicis, gradatim paullo latioribus; clava elongata, subfusiformi.

Rostrum elongatum, validiusculum, subcylindricum, arcuatum.

Thorax subobconicus, postice bisinuatus, in medio lobatus, supra deplanatus.

Elytra oblongo-subquadrata, plantuscula, abdomine breviora.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, planum, glabrum, durum, alatum. — *Antennae* capite rostroque fere longiores, in medio rostri insertae, validae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, subrecto, clavato, 2^o subelongato, obconico, 3-8 brevissime obconicis, coarctatis, crassitudine crescentibus; clava elongata, subfusiformi, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Caput* convexum. — *Rostrum* thoracis longitudine, validiusculum, subcylindricum, arcuatum, ab antennarum insertionem versus basin crassius; scrobe pone medium incipiente, lineari, angusta, profunda, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, ovati, immersi, magni. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus angustior, truncatus, lateribus subrotundatus, subconicus, postice bisinuatus, ante scutellum subproductus, supra deplanatus, infra convexus, in quibusdam ante pedum insertionem bi-aut quadrispinosus. — *Scutellum* parvum, immersum. — *Elytra* thorace fere latiora, quo vix duplo longiora, angulis humeralibus prominulis; posterius subangustata, oblongo-subquadrata, apice retundata, supra depla-

nata, abdomine breviora. — *Pygidium* semirobundatum, nudum. — *Pedes* mediocres, validi, antici basi valde distantes; femoribus in medio incrassatis, muticis; tibiis subteretibus, parum compressis, rectis, apice oblique truncatis, unco minuto subdeflexo armatis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulis duobus basalibus trigonis, penultimo profunde bilobo, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Calandra corvina* Fabr. — *Congenericus*: *Madar: pectoralis* nob.

A μαδαρὸς glaber, laevis.

Observatio. — Respectu habitus cum *Rhynchophorae* (*Calandra*) genere, quodam modo quoque cum Subgen. *Cyphirhini*, etsi statura longior, convenit. — Antennae, quoad proportionem articularum, iisdem, ac in genere *Platyonyxis* simillimae sunt; partium vero reliquarum discrepantia conjunctionem prohibet. — *Pedes* antici basi valde remoti insignem efficiunt characterem.

Genus 162. *Baridius* nob. — *Baris* Germ. Dej. Billb. — *Michorhynchus* et *Stenorhynchus* Megerle. — *Rhynchaenus* Fabr. Oliv. Gyll. — *Calandra* Fabr.

Character generis: — Antennae breviusculae, validiusculae; funiculo 7-articulato: aut solummodo articulo 1^o, aut 1^o et 2^o elongatis, obconicis, reliquis brevibus, subaequalibus, coarctatis, gradatim paullo latioribus; clava obtuse ovalis.

Rostrum elongatum, subcylindricum, arcuatum.

Oculi remoti, immersi, magni.

Thorax basi leviter bisinuatus, supra parum convexus.

Elytra oblonga, supra parum convexa, apice obtuse rotundata, pygidium in plerisque hand tegentia.

Pedes breves, fortes, tibiae apice intus unco valido armatae.

Descriptio: — *Corpus* ellipticum, supra depressiusculum, alatum. — *Antennae* thoracis medium non superantes, aut pone, aut ante medium rostri insertae, vel sub-

crassae, vel *validiusculae*, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o saepius parum, nonnunquam modice elongato, clavato, recto, oculos non attingente, 2^o plus minusve elongato, obconico, 3^o in paucis etiam obconico, reliquis brevibus, coarctatis, subaequalibus, versus apicem sensim crassioribus; clava obtuse ovali. — *Rostrum* thoraci subaequale l. longius, saepius validiusculum, teres, arcuatum; scrobe profunda, angusta, lineari, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* distantes, ovati, immersi, magni. — *Thorax* latitudine fere longior, supra parum convexus, saepius subplanus, aut subquadratus, apice jam cito angustatus, aut subconicus, basi vel leviter, vel profunde bisinuatus, subtruncatus, pone oculos non lobatus; subtus pone gulam leviter emarginatus, in plerisque obsolete canaliculatus, et in quibusdam canalicula determinata praeditus. — *Scutellum* parvum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo fere triplo longiora, in plerisque oblongo-subquadrata, in aliis elongata, sublinearia, supra aut subplana, aut perparum convexa, basi vel singulatim rotundata, vel subtruncata, apice ipso rotundata, pygidium in nonnullis prominens, in aliis obtectum; angulis humeralibus rotundatis. — *Pedes* breves, fortes, longitudine subaequales, antici basi distantes; femoribus compressis, clavatis, muticis, infra versus apicem, pro receptione tibiaram profunde canaliculatis, exinde paullo sulcatis; tibiis apice dilatatis, truncatis; intus unco valido, horizontali armatis; tarsorum articulis duobus basilibus saepissime triangularibus, 3^o profunde bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo elongato, tenui, acute biunguiculato. (Tarsis in nonnullis, ex. gr. *Baridio* loricato angustatis, magis tenuibus, subtus haud spongiosis. Insectum forsitan in aquis natat?)

Stirps 1a (Genuini). — Antennae pone medium rostri insertae; funiculo crassiusculo, articulo 1^o parum elongato, obconico, reliquis brevibus, subaequalibus, coarctatis; clava breviter ovata.

Typus: — *Barid. nitens*, *Calandra* eadm Fabr. *Rhynch. timidus* Oliv. — Congenerici: *Calandra* Saba

Fabr. — *Baris picina* Germ. — Rhynch. analis Oliv. — Rhynch. Artemisiae auctor. — Attelab. cuprirostris Fabr. — Rhynchaenus chloris Fabr. aliaeque plures species.

Stirps 2a. — Antennae in medio rostri insertae; funiculo validiusculo, articulo 1^o elongato, subclavato, reliquis brevissime obconicis, coarctatis; clava ovata, acuminata.

Typus: — *Baris interpunctata* Germ. — Congenerici: *Baris metallica* Dej. — *Curcul. cyaneus*? Herbst.

Stirps 3a. — Antennae in medio rostri insertae; funiculo subtenui, articulo 1^o et 2^o obconicis, hoc minore, reliquis brevibus, transversis, coarctatis; clava subovata, acuminata.

Typus: — Barid; *T. album*, Rhynchaen. idem Auctor. — Congenerici: Rhynchaen. famulus Fabr. — Lix. loricatus Schneid. — Barid. punctatissimus nob.

A βασις navigium et *ἔδος* forma.

Subgenus *A. Cyphirhinus* nob.

Adumbratio: — Antennae breves, prope medium rostri insertae, validiusculae; scapo brevissimo, clavato; funiculo 7-articulato: articulo basali obconico, reliquis subperfoliatis, contractis, crassitudine crescentibus, clava crassiuscula, breviter ovata. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, subteres, valde arcuatum, infra versus apicem deplanatum; scrobe profunda, curvata, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* satis magni, ovati, immersi. — *Thorax* subquadratus, versus apicem mox angustatus, postice bisinuatus, ante scutellum productus, infra obsolete canaliculatus. — *Elytra* thorace fere latiora, quo vix duplo longiora, oblengo-subquadrata, apice obtuse rotundata. — *Pygidium* nudum semitundatum, basi carinatum. — *Pedes* breves, fortes; tarsis gracilibus, articulo penultimo bilobo, subtus spongioso.

Typus: — Barid. (*Cyphirhinus*) *uncinatus* Gyllenh. n. sp. nec plures species vidi.

Α κυφός curvus, ῥῖν nasua.

Observatio: — Corpus supra depressiusculum, facies Baridii genuini similis; forma vero rostri et articulorum antennarum praecipue distinguere videtur.

Subgenus B. Solenosternus nob.

Adumbratio: — Antennae breviusculae, ante medium rostri insertae; scapo brevi, clavato; funiculo subtenui; articulo 1^o elongato, obconico, reliquis brevissime obconicis, coarctatis, gradatim paullo latioribus; clava ovata, acuminata. — *Rostrum* capite thoraceque longius, subteres, arcuatum, basi supra gibbum, deinde versus apicem sensim angustius, planiusculum, lateribus basi compressum. — *Oculi* sat magni, ovati, immersi. — *Thorax* subconicus, anterieus angustior, postice bisinuatus, ante scutellum subproductus, supra parum convexus, infra distincte canaliculatus. — *Elytra* thoracis basi perparum latiora, quo vix duplo longiora, oblongo-subquadrata, apice obtuse rotundata; pygidium prominens. — *Pedes* breves, fortes, compressi; tarsis longiusculis, articulo penultimo dilatato, bilobo, subtus spongioso, ciliato.

Typus: — Barid. (Solenosternus) puncticolis nob. n. sp. ex Amer. merid.

Α σωλήν canalis; στέρνον pectus inferius.

Observatio. — Ad habitum non solum subgeneri praecedenti (Cyphirhino) sed etiam quibusdam Baridii genuini generis speciebus simillimum est hoc subgenus; at vero diversa rostri structura atque perspicua canalicula pectoralis essentialem efficiunt differentiam. Propter canaliculam jam memoratam pectoralem, hoc subgenus transitum quasi et seriem inter Cholidum et Cryptorhynchidum divisiones constituit.

(*Divisio* 3a. Cryptorhynchides. Rostrum inflexum, in canaliculam pectoralem, plus minusve distincte profundam, applicandum. Pedes antici basi saepissime distantes.)

*) Genus 163. *Cratosomus* nob. — *Cryptorhynchus* Germ.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis 1-4 elongatis, obconicis, ultimis lenticularibus; clava minuta, ovalis.

Rostrum in plerisque latum, complanatum, subrectum, in aliis teres, arcuatum, aut supra aequale, aut inaequale.

Oculi plus minusve remoti, ovati.

Thorax antèrius angustior, antice non sinuato-lobatus, pectus subtus semper canaliculatum,

Elytra oblongo-ovata, convexa, apice obtuse rotundata.

Descriptio: — *Corpus* magnum, oblongo-ovatum, varicolor, alatum. — *Antennae* thoracis medium pertingentes, ante medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o breviusculo, oculos non attingente, clavato, 2-5 elongatis, obconicis, exterioribus sensim paullo brevioribus, 6-8 brevibus, aut apice truncatis, aut subrotundatis; clava minuta, breviter ovata, acuminata, 4-articulata, articulis arcte connexis. — *Rostrum* longitudine thoracis, inflexum, in plerisque sublatum, complanatum, subrectum, aequale, in nonnullis arcuatum aut crassiusculum, inaequale, aut teres, aequale; scrobe brevi, ante medium incipiente, subrecta, in basi rostri desinente. — *Caput* parum exsertum, convexum. — *Oculi* aut subremoti, aut parum approximati, ovati, modice prominuli, parvi. — *Thorax* longitudine vix latior, antèrius angustior, truncatus, non sinuato-lobatus, ad latera antica subcoarctatus, lateribus rotundatus; postice leviter hisinuatus, supra convexus, subtus profunde canaliculatus; canalis usque inter pedes secundi paris in pectus protensus, argute marginatus. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum. — *Elytra* thorace paullo latiora, quo triplo longiora, oblongo-ovata, convexa, versus apicem subcallosa, humeris obtuse angulatis; apice ipso obtuse rotundata, abdomen tegentia. — *Pygidium* apterum, semirotundatum, in medio carinatum, deflexum, extra apicem elytrorum non prominens. — *Pedes* validi, longitudine subaequales; femoribus in medio incrassatis.

satis, subtus dente minuto saepius instructis; tibiis teretibus, anticis basi interdum curvatis, omnibus apice unco valido intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo lato, bilobo, ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Rostrum sublatum, complanatum, aequale, parum arcuatum.

Typus: — Rhynch. herculeanus Dalm. Anal. — Huc quoque pertinent: Cryptorh. sticticus et ej. var. Crypt. impluviatus Germ. — Cratos. heros nob. n. sp.

Stirps 2a. — Rostrum arcuatum, inaequale.

Typus: — Cratosom: pterygomalis nob.

Stirps 3a. — Rostrum arcuatum, subtenne, teres, aequale; scapus antennarum subelongatus. Pygidium hand apterum.

An huius generis — Rhynchaen. pusio Fabr.?

A κράτος robur, σῶμα corpus.

Observatio: — Maximae in hac divisione sunt huius generis species; quod, praeter jam designatos rostri antennarumque characteres facile cognoscitur per formam pygidii in plerisque huc pertinentibus speciebus, evidenter distinctam, quod sextum quasi articulum abdominis format, non tamen ultra elytrorum apicem prominens.

Subgenus Gorgus nob. — Cryptorhynchus Germ. — Rhynchaenus et Lixus Fabr.

Adumbratio: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis 1-4 elongatis, subobconicis, apice subinflatis, exterioribus sensim brevioribus, 5-7 lenticularibus, subrotundatis; clava minuta, breviter ovata. — Rostrum robustum, basi teres, apice deplanatum, arcuatum, aequale, nonnunquam utrinque pone basin cornibus, validis armatum. — Oculi magni, in vertice conniventes. — Thorax in plerisque breviter subconicus, in nonnullis medio subangulatus, antice truncatus, postice leviter bisinuatus, supra parum convexus; rima pectoralis profunda, inter pedes intermedios distincte terminata. — Elytra subovata, humeris

angulatis; supra convexa, apice aut mucronata, aut obtuse rotundata. — *Pygidium* saepius distinctum, abdomini contiguous. — *Pedes* ita, ut in genere *Cratosomi* genuini compositi. — *Corpus* robustum, durum, inaequale, aut tuberculatum, aut exsculptum, alatum.

Stirps 1^a. Thorax supra inaequalis. Elytra apice mucronata.

Typus: — *Cryptorh. lentiginosus* Germ. Congenerici: *Rhynchaen. Taurus* Fabr. Oliv. — *Rhynchaen. vaginalis* et *scaber* Fabr. — *Cratosomus* (*Gorgus*) *cornutus* et *lacrymans* nob.

Stirps 2^a. — Thorax supra laevis. Elytra apice obtuse rotundata.

Typus: — *Lixus dubius* Fabr. Curc. idm Herbst. — Huo quoque pertinet: *Cratosomus* (*Gorgus*) *minax* nob.

A γοργός terribilis.

Observatio: — Etsi habitus, et praesertim situs oculorum in his a *Cratosomis* genuinis abhorreat, magnam tamen reliquae notae magis essentielles cum illis habent convenientiam; idoneum igitur mihi visum, unum tantum ex his speciebus constituere subgenus. A Genere *Cryptorhynchi*, praeter insignem magnitudinem, praecipue etiam quoad antennis ante medium rostri insertas, scapum breviusculum clavamque minorem, et thoracem antice non sinuato-lobatum, diversum redditur.

Genus 164. *Cryptorhynchus* Illig. Germ. — *Rhynchaenus* Fabr. Oliv. Gyllenh.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articuli primi reliquis paullo longiores, subobconici, ultimis lenticularibus; clava aut oblongo-ovata, aut ovalis.

Rostrum aut longum, aut breviusculum, arcuatum, saepissime teres.

Oculi laterales, plus minusve remoti.

Thorax saepius transversus, subconicus, versus apicem angustatus, antice pone oculos saepissime lobatus; rima thoracis infera, aut ad pedes secundi paris in pectus continuata, aut plus minusve abbreviata.

Elytra subovata, convexa, posterius attenuata, anum obtegentia; humeri angulati.

Descriptio: — *Corpus* mediocris magnitudinis, statura varians, alatum. — *Antennae* capitis thoracisque longitudinem vix adaequantes, saepius pone medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae; scapo elongato, clavato, oculos subattingente; funiculo 7-articulato; articulis basalibus 2 vel 4 elongatis, obconicis, exterioribus sensim brevioribus, reliquis brevibus, aut subrotundatis, aut apice truncatis; clava 4-articulata, articulis saepissime arcte conjunctis, vel oblongo-ovata, acuminata, vel ovali. — *Rostrum* crassitate longitudineque varians: plerumque thorace fere longius, inflexum, saepe arcuatum; in aliis longitudinem dimidii corporis adaequans, vel amplius, teres, minus orassum; in paucis filiforme, nonnunquam basi teres, versus apicem ampliatum, complanatum, (ex. gr. *Cryptorh. piger* Fabr.); scrobes pone medium incipientes, lineares, curvatae, in basin rostri subtus coeuntes. — *Oculi* laterales, plus minusve remoti, ovati, oblique positi, parum prominuli, majusculi. — *Thorax* in plerisque longitudine latitudinem vix superans, antice angustatus, coarctatus, in apicis medio saepius sinuato lobatus, in plerisque exigue pone oculos lobatus, lateribus rotundatus, postice leviter bisinuatus, supra parum convexus; rima infera, aut usque ad intermedium pedum parem in pectus continuata, argute marginata, aut abbreviata, apice sensim explanata. — *Scutellum* rotundatum, distinctum. — *Elytra* thoracis basi fere dimidio latiora, quo fere quadruplo longiora, posterius attenuata, supra in multis valde convexa, interdum gibba, in aliis minus convexa, dorso deplanata, versus apicem declivia, callo tuberante instructa, apice ipso rotundata, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis, in quibusdam elevatis, rectangulatis. — *Pedes* elongati, validi, medii saepius breviores; femoribus clavatis, aut dentatis, aut muticis, in nonnullis infra canaliculatis;

tibiis compressis; apice unco, interdum deflexo, intus armatis; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulis duobus basalibus trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo valido, clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. (Genuini) — Rima thoracis infra, usque ad pedes intermedios, protensa, apice argute marginata.

Manipulus 1s. Lobi thoracis pone oculos distincti.

Typus: — Cryptorh. Lapathi Auctor. — Congenerici: Rh. piger, Mangiferae, aspis et areneus Fabr. — Crypt. ochroleucus. Germ. — Coelosternus balteatus Sahlb. — et species multo plures.

Manipulus 2s. Lobi thoracis pone oculos aut obsoleti, aut nulli.

Typus: — Rhynchaenus haemorrhoids Fabr. — et species plures aliae.

Stirps 2a. (Spurii) — Rima thoracis infera, abbreviata, apice sensim explanata.

Manipulus 1s. Lobi thoracis pone oculos distincti.

Typus: — Rhynchaenus hebes Auctor. — Congenerici: Rh. palpebra, argula et abdominalis Fabr. et multae aliae.

Manipulus 2s. Lobi thoracis aut obsoleti, aut nulli.

Typus: — Rhynchaenus calidus Fabr. — Congenerici: Rh. metallinus et irroratus Fabr. — Orbitis novalis Germ. aliae ne enumerentur.

A $\alpha\phi\upsilon\pi\tau\alpha$ abscondo, $\rho\upsilon\chi\eta\varsigma$ rostrum.

Observatio: — Hoc genus quoad habitum multo variat. Plurimas hujus familiae species huc retuli, in quibus duo priores. l. quatuor funiculorum articuli sunt obconici et sequentibus paullo longiores, oculi non conniventes, scutellum distinctum, elytra totum abdomen obtegentia. —

Observationes, quas potui singulis huic Divisioni adscriptis generibus adjicere, differentias certe, quibus a genere Chryptorhynchi abhorreant, facillime indicabunt. —

Etsi multam quidem adhibuerim diligentiam in formando stirpes in hoc numeroso genere, aut secundum numerum

articulorum obconicorum, aut secundum diversam rostri, oculorum et corporis habitualem structuram, hoc tamen nequicquam conatus fui; Sectiones igitur ab Sollertiss. Dom. Geriario propositas retinere coactus sum.

Subgenus A. *Mecocorynus* nob. — *Cryptorhynchus* Wiedem.

Adumbratio: — *Antennae* mediocres, prope medium rostri insertae, subtenues; scapo oculos subattingente, lavato; funiculo 7-articulato: articulis 1-4 elongatis, obconicis, 5-7 brevibus, subglobosis; clava elongata, subcylindrica, apice oblique acuminata, articulis aegre distinctis. — *Rostrum* longitudine capitis una cum thorace, subtenue, perarum arcuatam, ante medium paullulum crassius, cylindricum, exinde versus apicem sensim complanatum. — *Oculi* laterales, perpendiculares, ovati, vix prominuli, majusculi. — *Thorax* basi bisinuatus, antrorsum angustatus, coarctatus, lateribus rotundatus, apice productus, pone oculos lobatus, praemodice convexus, subtus pro receptione rostri profunde canaliculatus; canalis in pectus haud continuatus. — *Elytra* subovata, humeris latis, acutangulatis; supra convexa, rursus apicem callosa. — *Pedes* elongati, validi; femoribus rotatis, muticis; tibiis rectis, subteretibus, apice unco subflexo armatis; tarsis ut in *Cryptorhynchis* genuinis.

Typus: — *Cryptorh. varipes* Wiedem. Unam tantam speciem vidi.

A μήκος longitudo, κορυφή clava.

Observatio: — Generi *Cryptorhynchi* proximum; ipsa vero antennarum aliter constructa praecipue differt.

Subgenus B. *Camptorhinus* nob. — *Rhynchaenus* Fabr. Oliv.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, minus testes; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, obconicis, reliquis brevibus, apice subtruncatis, parum coarctatis, crassitudine paullatim crescentibus; clava oblique ovali, 3 l. 4 articulata, articulis arctissime conjunctis. — *Rostrum* elongatum, validiusculum, subteres, parum arcuatum. — *Oculi* distantes, demissi, infra caput fere connexi,

ovati, depressi. — *Thorax* latitudine longior, pulvinatus, basi obsolete bisinuatus, anterius paullo angustior, antice productus, lateribus aequaliter rotundatus, pone oculos lobatus; canalis inferus in plerisque, inter pedes anticos protensus, argute marginatus, in paucis ante pedes anticos abbreviatus. — *Elytra* medio thoracis haud latiora, quo triplo l. quadruplo longiora, in plerisque subcylindrica, lateribus subrecta, in paucis oblongo-subovata, supra convexa. — *Pedes* antici, praesertim vero postici longi, intermedii breviores, validi; femoribus saepius parum inorassatis, subtus denticulo instructis; tibiis apice unco minuto armatis, aut teretiusculis, anticis arcuatis, intus pilosis, posterioribus rectis, aut omnibus validis, compressis.

Stirps 1^a. — Canalis thoracis inferus, inter pedes anticos protensus, argute marginatus. *Elytra* subcylindrica.

Typus: — *Rh. pilipes* Fabr. — Congenerici: — *Cura tibialis* Sparrm. *Rhynchaen.* *Statua* Fabr.

Stirps 2^a. — Canalis thoracis inferus, apice ante pedes anticos abbreviatus. *Elytra* oblongo-subovata.

Typus: — *Cryptorh. (Camptorh.) inquinatus*, nob. e Sierra Leone.

Α καμπή incurvus, flexus, *ἔν* naus.

Observatio: — Multa cum *Cryptorhynchis* genitibus communia quidem hoc subgenus habet, propriam vero et singularem, ab eodem genere diversam faciem reddunt: forma longior corporis magisque cylindrica et femora postica elongata.

Subgenus *C. Coelosternus* nob. *Cryptorhynchus* Germ. Dej.

Adumbratio: — *Antennae* breviusculae, minus tenues; funiculo 7-articulato: articulis 2 l. 4. basalibus obconicis, reliquis subrotundatis, paullulum coarctatis; clava elongata, cylindrica. — *Rostrum* longum, arcuatum, aut subcomplanatum, aut teres, subfiliforme. — *Oculi* laterales, ovati, modice prominuli. — *Thorax* basi bisinuatus, antrorsum valde angustatus, coarctatus, apice productus, lateribus rotundatus, pone oculos lobatus, supra convexus, aut canaliculatus, aut carinatus, canalis inferus in pectus continua-

tus. — *Scutellum* rotundatum, distinctum. — *Elytra* in ple-
risque medio thoracis haud latiora eoque triplo longiora, a
basi ad apicem parum sensimque attenuata; humeris saepius
obsolete subangulatis, in nonnullis distincte obtuse angula-
tis. — *Pedes* elongati, antici praesertim in masculis valde
longi; femoribus anticis bidentatis; tarsis in masculis saepius
villosis, in nonnullis articulis duobus basalibus elongatis,
penultimo in omnibus semper dilatato, subtus spongioso.

Stirps 1a. Antennarum funiculi duo articuli basales
oblongi, subobconici. Rostrum validiusculum, subcompla-
natum.

Typus: — *Cryptorh. asperatus* Dej. Catal. Con-
generici: *Cryptorh. cylindricornis* et *occatus*
Germ.

Stirps 2a. Articuli quatuor funiculi basales oblongi,
obconici. Rostrum teres, subfiliforme, basi carinatum.

Typus: — *Cryptorh. compennis* Germ. — Con-
gen. *Cryptorh. alternans* et *dentipes* Dej. Catal.

A *κοῖλος* cavus, *στέρον* pectus inferius.

Observatio: — Clava antennarum cylindrica pedibusque
anticis elongatis hoc subgenus a *Cryptorhynchis* genui-
nis praecipue dignoscitur.

Genus 165. *Macromerus* nob. — *Poecilma* Germ. —
Cryptorhynchus Dej. — *Rhynchaenus* Fabr.
Oliv.

Character generis: — Antennae breviusculae, sub-
tenues; funiculo 7-articulato: articulis 1-4 elongatis, ob-
conicis, 2° longiore, 5-7 brevibus, subglobosis; clava ob-
longo-ovata.

Rostrum longum, subfiliforme, basi teres, apice non-
nihil deplanatum, arcuatum.

Oculi laterales.

Thorax subconicus, antrorsum coarctatus, antice et pone
oculos saepissime lobatus; canalis inferus in pectus conti-
nuatus.

Elytra oblongo-triangularia.

Femora antica saepius valde elongata.

Tarsorum articulus basalis satis elongatus.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-subovatum, alatum. — *Antennae* capitis thoracisque longitudinem vix adaequantes, ante medium rostri insertae, subtenuae, fractae, 12-articulatae: articulis funiculi 1-4 elongatis, obconicis, 2^o longiore, 5-7 brevibus, subrotundatis; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulo ultimo minuto, aegre perspicuo. — *Rostrum* capite thoraceque longius, subfiliforme, basi teres, apice perparum deplanatum, arcuatum; scrobe in medio incipiente, lineari, angusta, profunda, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* magni, laterales, parum remoti, ovati, nonnihil prominuli. — *Thorax* latitudine postice brevior, basi leviter bisinuatus, versus scutellum anguste productus, lateribus a medio ad apicem attenuatus, antice coarctatus, in medio saepius productus, pone oculos lobatus, supra in medio nonnihil deplanatus; canalis inferus inter pedes intermedios in pectus protensus, argute marginatus. — *Scutellum* rotundatum, distinctum. — *Elytra* basi thoracis paullo latiora, quo vix triplo longiora, oblongo-triangularia, humeris subretusis, obtuse angulatis; dorso deplanata, versus apicem callosa, apice ipso rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* elongati, medii breviores, antici, praesertim in masculis, maximi; femoribus parum incrassatis, subtus dentatis; tibiis anticis saepius bisinuatis, intus denticulatis, apice extus unco deflexo armatis; tarsis longis, gracilibus, in masculis saepius villosis, articulo 1^o in plerisque valde elongato, basi subtereti, in aliis elongato, trigono, penultimo latiore, bilobo, omnibus subtus spongiosis, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Poecilma crinitarse* Germ. — Congenerici: *Rhynchaen. Chimaris* Fabr. — *Macromerus Monachus* nob.

Α μακρὸς longus, μηδὲς femur.

Observatio: — Respectu habitus *Cryptorhynchi* generi simile est, differt vero secundo funiculi articulo reliquis omnibus longiore, articulo etiam primo tarsorum valde

elongato. Cum subgenere *Coelostorni* quidem in multis conveniunt hujus generis species, dignoscuntur autem diversa antennarum structura ut et forma corporis alia.

Genus 166. *Arthrostenus* nob.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues; funiculo 7-articulato: articulo 1-4 longiusculis, obconicis, 5-7 brevissime obconicis; clava elongata, fusiformis.

Rostrum longiusculum, teres, subtenue.

Oculi laterales, rotundati, prominuli.

Thorax subconicus, antice in medio productus, pone oculos vix lobatus; canalis inferus brevis.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem non callosa.

Tibiae subrectae, intus crenulatae, apice unco horizontali armatae.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, alatum; facies generis *Erirhini*. — *Antennae* thoracis medium fere superantes, pone medium rostri insertae, tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos subattingente, recto, clavato, 2-5 longiusculis, obconicis, 6-8 brevissime obconicis, gradatim paullulum latioribus; clava elongata, fusiformi, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* thorace longius, subtenue, teres, parum arcuatum; scrobe lineari, pone canthum oculi inferum in basin rostri subtus exeunte. — *Oculi* laterales, rotundati, prominuli. — *Thorax* latitudine fere longior, anterieus angustatus, lateribus parum rotundatus, subconicus, basi obsolete bisinuatus, apice in medio nonnihil productus, supra modice convexus, lobis ocularibus magis obsoletis; canali infero, brevi, profunde exarato, ante pedum anticorum basin desinente. — *Scutellum* distinctum, aut triangulatum, aut apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi vix dimidio latiora, quo vere triplo l. quadruplo longiora, oblongo-ovata, humeris obtuse angulatis; supra modice convexa, versus apicem haud callosa, apice ipso subacuminata, abdomen obtegentia. — *Pedes* elongati, subtenues, antici approximati; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, subrectis, intus evidenter crenulatis, apice unco horizontali intus armatis; tarsi tibiis paullo bre-

viores, articulis 1,2 elongato trigonis, penultimo latiore, cordato, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Fullo Boeb. in litt. —

Congenerici: Arthrosten. spadiceus et cinereus nob.

Ab ἀρθρον artus, στενός angustus, arctus.

Observatio: — Cum forma habituali generis Erirhini, tum oculis rotundatis, prominulis, pariter ac tibiis intus evidenter crenulatis, hoc genus, tam a Cryptorbynchis, quam a reliquis hujus Divisionis generibus, dignoscitur.

**) Genus 167. Lyprus nob. — Rhynchaen. Gyll. —
Lixus Ahrens.

Character generis: — Antennae breves, subtenues; funiculo 6-articulato: articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, 3-6 brevibus, coarctatis, subperfoliatis; clava ovalis, magna.

Rostrum elongatum, cylindricum, arcuatum.

Thorax subcylindricus, in medio paullo rotundatus, antice posticeque truncatus.

Elytra elongata, cylindrica, versus apicem attenuata, compressa.

Tarsi angustati, compressi.

Descriptio: — *Corpus* angustum, cylindricum, parvum; alae abbreviatae. — *Antennae* longitudinem rostri thoracisque vix aequantes, ante medium rostri insertae, subtenues, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos attingente, clavato, 2 et 3 longiusculis, obconicis, 2^o majore, 4-7 brevibus, coarctatis, subperfoliatis, crassitudine crescentibus; clava ovali, magna, 4-articulata, articulis arcte conjunctis. — *Rostrum* thorace paullo brevius, validiusculum, cylindricum, deflexum, arcuatum; scrobe brevi, ante medium incipiente, versus apicem sensim ampliata, recta in margine oculi antico desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, perparum prominuli. — *Thorax* latitudine longior, angustior, lateribus ante medium nonnihil ampliatus, basi apiceque truncatus, obsolete pone oculos labatus, supra parum convexus, infra pone gulam profunde emarginatus, sulco pro receptione rostri brevi,

ante pedum anticorum basin desinente. — *Scutellum* minutum, aegre observatu. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo vero triplo longiora, subcylindrica, versus apicem attenuata, compressa; apice ipso obtuse rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* mediocres, intermedii paullo breviores, antiqui approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, intus subbisinuatis, omnibus interiore apice unco valido armatis; tarsis angustatis, compressis, haud spongiosis, articulo ultimo elongato, vix clavato, binnguiculado.

Typus: — *Rhynchaen. cylindrus* Gyll. Ins. Sv. vel *Lix. attenuatus* Ahrens. nec plures species vidi.

A λυγρός gracilis, tenuis, vilis.

Observatio. — Statura *Lixi* generi fere appropinquat, thorax autem infra canaliculatus atque aliter antennae sunt constructae.

Genus 168. *Bagous* Germ. — *Rhynchaenus* Gyllenh. Oliv. — *Curculio* Fabr. Herbst.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, obconicis, reliquis subperfoliatis, coarctatis, versus apicem gradatim latioribus; clava ovalis, magna.

Rostrum breviusculum, arcuatum, robustum, teres.

Thorax subcylindricus, antice late emarginatus, exigue pone oculos lobatus; canalis inferus, brevis.

Elytra oblongo-ovata, versus apicem valde callosa, abdomen obtegentia; humeri obtuse angulati.

Tibiae longae, versus apicem arcuatae, apice ipso unco acuto armatae; tarsi angustati.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-subovatum, squamulis saepius etiam luto adglutinato obductum; minoris magnitudinis, alatum. — *Antennae* capite rostroque paullo longiores, pone medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1° oculos subattingente, clavato, 2° et 3° elongatis, obconicis, illo crassiusculo, 4-8 brevibus, coarctatis, quorum duo ultimi subperfoliati, clavam fere incipientes; clava ovali, magna, 4-articulata, articulis difficile

observandis. — *Rostrum* thorace fere brevius, crassiusculum, arcuatum, teres; scrobe versus apicem incipiente, profunda, recta, ad oculum protensa. — *Oculi* laterales, ovati, parum prominuli, magni. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, subcylindricus, anterieus angustior, antice pro receptione capitis late, nec profunde emarginatus, saepius pone apicem transversim impressus, unde margo elevatus videtur, basi truncatus, supra parum convexus, lobis pone oculos magnis productus, infra pone gulam profunde emarginatus; canalis inferus, profundus, brevis, ante pedum anteriorum basin desinens. — *Scutellum* parvum, rotundatum. — *Elytra* thorace fere duplo latiora, quo vix quadruplo longiora, humeris obtuse angulatis; versus apicem attenuata, dorso antico depressa, posterius valde declivia et versus apicem callosa, apice ipso obtuse rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* elongati, tenues, antici approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis longis, versus apicem arcuatis, apice intus unco acuto armatis; tarsis longiusculis, angustatis, subtus vix spongiosis, articulo ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. binodulus* Gyll. Ins. Sv. — Species mihi cognitae et huc pertinentes, sunt: *Rhynchaen. luteolentus* et *lutosus* Gyll. — *Curc. collignensis* Herbst. — *C. cnemerythrus* Marsh.

Bagous nomen Persicum: spado, castratus.

Observatio: — Antennae breves, clava magna, tibiae longae, arcuatae, tarsi angustati, hoc genus distinctu facile reddunt.

Genus 169. *Scleropterus* nob. — *Cryptorhynchus* Germ.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; funiculo 7-articulato: articulis omnibus obconicis, versus apicem gradatim brevioribus; clava oblongo-ovata.

Rostrum sat elongatum, robustum, arcuatum, teres.

Thorax longus, ante apicem valde coarctatus, antice parum productus.

Elytra thorace latiora, breviter ovata; humeri lati, obtuse angulati.

Tibiae anticae elongatae, ante apicem curvatae.

Descriptio. — *Corpus* parvum, subovatum, durum, forte apterum. — *Antennae* capite rostroque vix longiores, in medio rostri insertae, sublenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculos subattingente, 2^o obconico, reliquis paullo crassiore, 3-7 versus apicem paullulum latioribus et gradatim brevioribus, etiam obconicis, 8^o multo brevior et latior, clavam fere incipiente; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata, articulo ultimo minutissimo. — *Rostrum* thoracis longitudine, crassiusculum, teres, modice arcuatum; scrobe obliqua, ad oculum protensa. — *Caput* aliquantulum prominulum, convexum. — *Oculi* laterales, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* latitudine longior, antorsum multo angustior, in medio apicis vix productus, ante apicem valde coarctatus, medio parum ampliatus, basi subtruncatus, pone oculos lobis minutis, productis; canalis inferus usque inter pedum intermediorum basin in pectus protensus, profundus, argute marginatus. — *Scutellum* haud observandum. — *Elytra* basi thoracis dimidio latiora, eoque duplo longiora, breviter ovata, convexa, humeris latis, obtuse angulatis; lateribus versus apicem sensim angustata, apice obtusa, abdomine nonnihil breviora, nec alas ulla obtegere videntur. — *Pedes* validi, antici longiores; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis anticis elongatis, ante apicem curvatis, posterioribus subrectis, omnibus apice truncatis, intermedioribus; tarsis subtus spongiosis, articulis 1 et 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato, unguibus brevibus.

Typus. — *Cryptorh. serratus* Eschsch. et Germ.
Hanc unicam vidi speciem.

Α σκληρός durus, πτερόν ala.

Observatio. — Structura antennarum, rostri tibiisque anteriorum, quae in his ab structura *Cryptorhynchi* generis longe est diversa, separationem ab eodem merito potulare videtur.

Genus 170. *Tapinotus* nob.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues; funiculo 6-articulato: articulis tribus basalibus elongatis, subobconicis, 4-6 brevibus, apice truncatis; clava ovali, acuminata.

Rostrum subelongatum, robustum, teres, arcuatnm.

Thorax basi bisinuatus, anterie paullo angustior, apice reflexus, lobis ocularibus exiguis; canalis inferus abbreviatus.

Elytra oblongo-subquadrata, dorso antico deplanata, apice ipso singulatim rotundata, abdomine breviora.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, minoris magnitudinis, alatum, — *Antennae* rostro capiteque fere longiores, pone medium rostri insertae, subtenues, articulo 1° elongato, oculos subattingente, clavato, 2-4 elongatis, subobconicis, 2° paullo majore, 5-7 brevibus, apice truncatis; clava ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capite duplo longius, robustum, teres, modice arcuatnm; scrobe curvata, lineari, haud profunda, ante marginem anticum oculi desinente. — *Oculi* laterales, subrotundati, parum prominuli. — *Thorax* latitudine fere longior, anterie paullo angustior, subconicus, basi bisinuatus, lobo scutellari minuto productus, lateribus paullulum rotundatus, margine antico truncato, reflexo; supra modice convexus, pone oculos lobis exiguis instructus, infra pone gulam profunde emarginatus; canalis inferus obsoletus, ante pedum anticorum basin desinens. — *Scutellum* minutissimum, triangulare, vix conspicuum. — *Elytra* thorace dimidio latiora, quo fere triplo longiora, oblongo-subquadrata, humeris obtuse angulatis, subretusis; dorso praesertim antice, deplanata, versus apicem valde callosa, apice ipso singulatim rotundata, abdomen haud obtegentia. — *Pygidium* semitotundatum, nudum. — *Pedes* longiusculi, validiusculi, subaequales, antici distantes; femoribus clavatis, subtus dentatis; tibiis rectis, teretiusculis, apice mucicis; tarsi tibiis parum breviores, articulo penultimo dilatato, bilobo, subtus spongioso, ultimo clavato, valido, biungiculato.

Typus: — *Tapinotus ephippiger* nob. ex Europa temperata. Hanc unicam vidi speciem.

A *ταπεινός* humilis, *πῶτος* dorsum.

Observatio: — Articulorum funiculi numero et forma, thoracis margine antico reflexo elytrisque dorso deplanatis, abdomine brevioribus, hoc genus a reliquis hujus Divisionis generibus dignoscitur. Canalis inferus thoracis abbreviatus quidem est et obsoletus, unde hocce genus ad Cholidis Divisionem referri posse videretur; cum vero canalicula tamen adsit, hoc genus heic sibi locum occupet volui. Quaedam quoque, respectu thoracis elytrorumque formae, etsi corpus longius ceteraeque partes aliter sint constructae, Centorhynchi generi similitudo intercedit.

Genus 171. *Ulosomus* nob.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 6-articulato: articulis duobus basalibus elongatis, obconicis, reliquis brevibus, lenticularibus, crassitudine crescentibus; clava subovata.

Rostrum elongatum, minus tenue et arcuatum, versus apicem deplanatum.

Thorax longus, antrosum multo angustior et coarctatus, basi truncatus, convexus; canalis inferus, in pectus continuatus.

Elytra subovata, posterius attenuata, valde convexa.

Descriptio: — *Corpus* subovatum, dense squamosum, asperum, minoris magnitudinis, alae abbreviatae. — *Antennae* capite rostroque longiores, in medio rostri insertae, subtenues, fractae, 11-articulatae: articulo 1^o oculos haud attingente, subclavato, 2 et 3 elongatis, subobconicis, illo crassiusculo, 4-7 brevibus, lenticularibus, exterioribus sensim paullo crassioribus; clava subovata, 4-articulata, articulis discretu difficilibus. — *Rostrum* longitudinem capitae thoracisque vix aequans, crassiusculum, modice arcuatum, versus apicem parum deplanatum, nonnihil ampliatum; scrobo lineari, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* laterales, rotundati, depressi, parvi. — *Thorax* latitudine postica longior, antrosum multo angustior et coar-

etatus, basi truncatus, apice rotundato-productus, lateribus parum rotundatus, supra convexus, lobis ocularibus obsolete; rima thoracis infera usque ad pedes intermedios continuata, argute marginata. — *Scutellum* minutum quidem, tamen distinctum, punctiforme. — *Elytra* breviter subovata, antice thoracis basi paullo latiora, ante medium ampliata, thorace vix triplo longiora, posterius attenuata, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, abdomen obtegentia. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales; femoribus in medio parum incrassatis, muticis; tibiis validiusculis, subcompressis, apice intus uncinatis; tarsorum articulo penultimo bilobo, subtus spongioso, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Ulosomus Erinaceus* nob. ex. Ins. St. Barthol.

Ab οὐλός crispus, σῶμα corpus.

Observatio. — A *Cryptorhynchidibus* caeteris differt: funiculo tantum 6-articulato, oculis rotundatis aliisque notis minoris momenti, quare ut proprium genus hoc constitui. Quandam cum *Acallis* subgenere et praesertim cum *Tylodia* (*Acall.*) *Ptinoide* hoc genus respectu habitus affinitatem habere videtur: cum vero scutellum vere adsit, et funiculus antennarum minori articulorum numero gaudeat, hoc videtur essentialem differentiam posse efficere.

Genus 172. *Tylodes* nob. — Sahlb.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; funiculo 7-articulato: articulis 3¹. & basalibus, elongatis, subobconicis, reliquis brevioribus; clava ovalis.

Rostrum validum, subteres; parum arcuatum.

Thorax anterieus angustior, parum productus, basi subtruncatus; canalis inferus in pectus continuatus.

Scutellum nullum.

Elytra connata, oblongo-ovata, basi coarctata.

Descriptio: — *Corpus* oblongo-ovatum, durum, rigidum, obscurum, squamosum, apterum. — *Antennae* capitis rostrique longitudine, in medio rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae; articulo 1^o elongato, cla-

vato, oculos subattingente, 2, 3, 4 interdum etiam 5 elongatis, subobconicis, l. apice inflatis, reliquis breviusculis ovalibus; clava ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* longitudine thoracis, validum, subteres, parum arcuatum, versus apicem sensim paululum ampliatus; scrobe recta, profunda, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* laterales, ovati, subdepressi. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, antice angustatus, parum productus, lateribus rotundatus, postice subtruncatus, supra modice convexus, pone oculos lobatus, subtus pro receptione rostri profunde exaratus; canalis per pectus inter pedes medios continuatus, argute marginatus. — *Scutellum* omnino nullum. — *Elytra* thoracis basi haud latiora, quo fere triplo longiora, oblongo-ovata, antice truncata, mox pone basin transversim coarctata, supra convexa, versus apicem attenuata, subcompressa, declivia, apice ipso rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* elongati, validi, medii breviores; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis saepius crassiusculis, subcompressis, subrectis, apice unico valido intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo valde clavato, biunguiculato.

Typus: — *Tylodes Armadillo* Sahlb. n. sp. Ins. f. p. 49. 82. — Hujus generis tres species, adhuc indescriptas, vidi.

Α τυλώδης callosus.

Observatio: — Corpus robustior, habitualis forma diversa et scutelli defectus praeter alias, minus essentielles differentias, genus hocce a *Cryptorhynchis* genuinis distinguere mihi videntur.

Subgenus *Acalles* nob. — *Rhynchaenus* Fabr.

Adubratio: — *Antennae* mediocres, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus obconicis, reliquis subrotundatis, subcoarctatis; clava breviter ovata. — *Rostrum* thorace longius, validum, subteres, nonnihil arcuatum, versus apicem sensim parum ampliatus. — *Oculi* laterales, ovati, subdepressi, minuti. — *Thorax* sublongus, convexus, basi subtruncatus, antice productus, pone oculos exigue lobatus, lateribus in plerisque subaequaliter rotundatus, in paucis antice latior, posterius multo angustior, cana-

lis inferus inter pedum anticorum basin desinens, profundus, argute marginatus. — *Scutellum* nullum. — *Elytra* ovata, basi thoracis vix latiora, lateribus usque ad apicem rotundata, medio latiora, apice ipso aut rotundata, aut obtusa, supra valde convexa, abdominis latera subincludentia. — *Pedes* ita ut in genere *Tylodis* constructi, praeter articulum ultimum tarsorum minus clavatum. — *Corpus* oblongo-ovatum, durum, inaequale, apterum.

Typus: — *Rhynchaen. Camelus* Fabr. — Huc quoque referuntur: *Rhynchaen. Ptinoides* Gyllenh. Ins. Sv. — *Rhynchaen. hypocritus*. Crentz. et praeter has tres indescriptae species.

Ab *anallus* deformis, haud elegans.

Observatio: — Antennarum elytrorumque structura aliquanto diversa ut et canali infero thoracis magis abbreviato, hoc subgenus a *Tylode* distinguitur.

***) Genus 173. *Centorhynchus* Schüpp. Germ. — *Nedysus* et *Rhinoncus* nob. olim. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyllenh. Oliv. — *Falciger* Meg. Dej. — *Campylirhynchus* Meg. Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, graciles; funiculus 7-articulatus: articuli primi reliquis longiores, subobconici, ultimi aut breves, apice truncati, aut lenticales; clava ovata, acuminata.

Rostrum arcuatum, in alijs elongatum, filiforme, in alijs breviusculum, teres.

Thorax anterieus valde attenuatus, coarctatus, postice hisinuatus, pone oculos saepius lobatus; canalis inferus aut in pectus continuatus, aut plus minusve abbreviatus.

Scutellum minutum, vix conspicuum.

Elytra subtriangularia, apice singulatim rotundata, abdomine breviora.

Tibiae apice truncatae, muticae.

Descriptio: — *Corpus* breve, parvum, rigidum, contractum, ovatum l. subquadratum, alatum, supra aut

squamulosum, aut scabrosum, nunquam politum. — *Antennae* rostro capiteque longiores, aut inter medium et apicem, aut in medio rostri insertae, graciles, fractae, 12-articulatae; scapo clavato, oculus vix attingente; funiculo 7-articulato: articulis basalibus 2 l. 3 elongatis, subobconicis, reliquis aut brevibus, apice truncatis, aut lenticularibus; clava ovata, acuminata, in plerisque 4-in paucis 5-articulata, tunc articulo basali minuto aucta, (ex. gr. *Ceuthocarpus*, *gramineus* et *inconspicuosus*,) articulis semper arcte connexis. — *Caput* in plerisque convexum, in quibusdam depressum. — *Rostrum* crassitudine longitudineque variat, vel capitis thoracisque longitudine, filiforme, subtenue, in aliis teres, validiusculum, in aliis breviusculum, crassiusculum, semper arcuatum, in rimam thoracis inferam versus apicem explanatam sese inserit; scrobe lineari, pone canthum oculi inferum exeunte. — *Oculi* semper remoti, rotundati, plus minusve prominuli. — *Thorax* longitudine fere lator, subconicus, antrosum valde angustior, coarctatus, basi bisinuatus, saepius dorso spinosus, vel tuberculatus, margo anticus saepissime elevatus, reflexus, nonnunquam subaequalis, lobis ocularibus aut obsoletis, aut modice productis; subtus sulco pro receptione rostri exarato, vel in pectus continuato, manifesto, vel magis obsoleto, abbreviato instructus, et tunc coxae pedum anticorum tuberosae, elongatae, crassae sulcum praebent. — *Scutellum* minutum, profunde impressum. — *Elytra* thoracis basi multo latiora, humeri prominuli, obtuse angulati; thorace triplo longiora, posterius angustiora, apice ipso singulatim rotundata, supra aut convexa, aut dorso planiuscula, abdomine paullo breviora. — *Pygidium* evidenter distinctum. — *Pedes* mediocres, validi, antiqui magis approximati, plerumque paullo longiores; femoribus clavatis, aut dentatis, aut muticis; tibiis teretibus, in nonnullis subcompressis, apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculate.

Stirps 1a. (Genuini: *Nedyus* nob. olim.) Rostrum longius, tenue.

Manipulus 1s. Thoracis canalis inferus pectus transit et usque inter basin pedum intermediorum protenditur, argute marginatus.

†) Thorax subaequalis, non tuberculatus, nec antice reflexus. Femora semper mutica.

Typus: — Rhynchaenus Quercus Auctor. Rh. rubicundus Gyll.

††) Thorax inaequalis, aut tuberculatus, aut margo anticus elevatus, reflexus.

*) Femora mutica.

Typus: — Rhynchaen. Geranii Gyll. — Congenerici: — Rh. Epilobii Gyll. — Rhynch. umbraculatus Fabr. — Curc. subrufus Herbst.

**) Femora dentata.

Typus: — Rh. didymus Auctor. — Congenerici: — Rh. Guttula et Lamii Fabr. — Rh. globulus Gyll. et species plures aliae.

Manipulus 2s. — Thoracis canalis inferus, plus minusve abbreviatus.

†) Thorax subaequalis, nec tuberculatus, nec antice reflexus.

*) Femora mutica.

Typus: — Rhynchaen. Sisymbrii Auctor.

**) Femora dentata.

Typus: — Centorh. Napi Germ. Beck.

††) Thorax inaequalis, aut tuberculatus, aut margo anticus elevatus, reflexus.

*) Femora mutica.

Typus: — Rhynch. assimilis Fabr. — Rh. Erysimi, Auct. Rh. contractus - depressicollis et Ericae Gyll. et aliae plures.

**) Femora dentata.

Typus: — Rh. Echii Auctor. — Congenerici: Rhynchaen. abbreviatulus, Litura et trimaculatus

Fabr. — Rh. viduatus et Asperifoliarum Gyll. — Curc. horridus Panz. et multo plures aliae.

Stirps 2a (Spurii. Rhinoncus nob. olim.) — Cam-pylirhynchus Megerle. Dej. — Rostrum brevius, incrassatum. Femora semper mutica.

Typus: — Rhynch. 4-tuberculatus Fabr. — Huc referendae sunt: Rh. 4-cornis, inconspectus et subfasciatus Gyll. — Rh. pericarpus, Castor et gramineus Fabr. — guttalis Grav. — tessellatus Sturm.

Α πύδα occulto, ῥυγχος rostrum.

Observatio: — Hoc genus a natura satis distinctum videtur, species amplectens plurimas parvas, statura simillimas; huic sunt pygidium nudum, tibiae apice muticae corpusque rhombicum. Hae vero species, ratione rostri longiores l. brevioris, thoracis mutici l. tuberculati et femorum armaturae, in stirpes etc. facile dividuntur. At Stirps 2a huius generis aliquanto aliter constructa est, habet enim rostrum brevius et crassius, caput saepius depressum et oculos magis prominulos, unde ab Ceutorhynchis gennina 1ae Stirpis manifeste distinguitur.

Genus 174. Mononychus Schüpp. Germ. — Rhynchaenus Fabr. Oliv. — Falciger Dej.

Character generis: — Antennae breves, graciles; funiculo 7-articulato: articulis obconis, exterioribus gradatim brevioribus; clava oblongo-ovalis.

Rostrum elongatum, subtenne, arcuatum, cylindricum.

Thorax transversus, antro-^{rum} valde attenuatus, coarctatus, versus scutellum productus; canalis inferus in pectus continuatus.

Elytra subquadrata, pone scutellum impressa, antice posticeque singulatim rotundata, abdomine breviora.

Tibiae ante apicem extus calcaratae; unguiculus tarsorum unicus et simplex.

Descriptio: — Corpus breve, subquadratum, subdepressum, dense squamosum, alatum. — Antennae rostro fere breviores, ante medium rostri insertae, graciles, fractae,

12-articulatae; scapo longiusculo, oculos non attingente, recto, clavato; funiculo 7-articulato: articulis exterioribus sensim brevioribus, subobconicis; clava oblongo-ovali, acuminata, 4-articulata, articulo basali magno. — *Caput* antice impressum, postice convexum, longitudinaliter carinatum. — *Rostrum* thoracis longitudine, subtenne, cylindricum, modice arcuatum; scrobe angusta, sublineari, recta, ante medium incipiente, pone canthum inferiorem oculi excurrente. — *Oculi* laterales, distantes, rotundati, parum prominuli. — *Thorax* longitudine latior, antice multo angustior, truncatus, ad latera antica valde coarctatus, pone oculos vix lobatus, lateribus rotundatus, postice bisinuatus, versus scutellum productus, acuminatus, supra convexus, in medio saepius leviter canaliculatus, versus apicem profunde impressus, subtus pro receptione rostri canaliculatus; canalis in pectus continuatus, apice argute marginatus. — *Scutellum* vix conspicuum, profunde impressum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quae vix triplo longiora, subquadrata, angulis humeralibus rotundatis: basi apiceque singulatim rotundata, in regione scutellari profunde impressa, postice convexa, abdomine breviora. — *Pygidium* apertum, semirobundatum. — *Pedes* breves, validi, subaequales, antici magis approximati; femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis, subcompressis, apice truncatis, ante apicem extus calcaratis l. penicillatis; tarsis subtus spongiosis, articulo ultimo parum clavato, unguiculato.

Typus: — Rhynch. Pseudacori Auct. — Congenerici: Rh. vulpeculus Fabr. — Monou. Salviae Germ. — Curc. Ixeos Pall.

A μύνας unus, δρυξ unguis.

Observatio. — Statura et facies ita, ut in Centorhynchi genere sunt comparatae; differt vero: magnitudine paullo majore, antennis semper ante medium rostri insertis, thorace versus scutellum in medio acuminato, tibiis ante apicem extus calcaratis et unguiculo tarsorum tantum uno.

****) Genus 175. *Zygops* nob. — *Poecilma* Germ. — *Eccoptus* Dej. *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae longiusculae, tenues, ante medium rostri insertae; funiculo 7-articulato: articulo 1^o breviusculo, obconico, 2^o et 3^o elongatis, subcylindricis, illo longissimo, reliquis brevibus, lenticularibus; clava ovalis.

Rostrum elongatum, subtenue, arcuatum, basi carinatum, versus apicem deplanatum.

Caput exsertum, hemisphaericum.

Oculi ovati, maximī, supra subcontigui.

Thorax oblongus, conicus, ante apicem transversim impressus.

Elytra thoracis basi vix latiora, oblongo-quadrata, apice subtruncata, abdomine breviora.

Pedes elongati; femora postica reliquis longiora.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* thoracis basin vix attingentes, ante medium rostri insertae, tenues, fractae, reflexae, 12 articulae: articulo 1^o clavato, oculum haud attingente, 2^o breviusculo, obconico, 3 et 4 elongatis, subcylindricis, illo longissimo, 5-8 brevibus, lenticularibus; clava oblongo-ovali, 4-articulata, articulos aegre discernendis. — *Caput* exsertum, hemisphaericum. — *Rostrum* thorace paullo longius, inflexum, arcuatum, subtenue, teres, basi paullo crassius, carinatum, versus apicem laeve, denudatum, complanatum; scrobe lineari, ante medium incipiente, pone gulam in basi rostri exeunte. — *Oculi* ovati, convexi, supra fere coeuntes; totam capitis partem anticam occupantes. — *Thorax* longus, subconicus, antice late emarginatus, pone oculos sublobatus, postice in plerisque bisinuatus, ante scutellum productus, in quibusdam subtruncatus, supra modice convexus, ante apicem transversim impressus; canalis inferus, ante pedum anticorum basin terminatus, haud profunde exaratus, lateribus vero saepius distincte marginatus. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum, saepius elevatum. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo vero bis et dimidio longiora, oblongo-quadrata, apice subtruncata, supra modice convexa, abdomine breviora. — *Abdomen* aequale, in medio depla-

natum. — *Pygidium* nudum, semirobundatum. — *Pedes* elongati, validi, antici approximati, postici valde distantes; femoribus parum clavatis, dentatis; postici fere elytris duplo longiores; tibiis breviusculis, compressis, apice unco valido, deflexo armatis; tarsis subtus exigue spongiosis, articulis 1, 2 trigonis, illo longiore, penultimo latiore, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Poecilma Wiedii* Germ. — Congenerici: *Rhynchaen. Strix* Fabr. et octo adhuc indesscriptae species. —

A ζεύς jungo, ὤψ oculus.

Observatio: — Ad hoc genus omnes hujus divisionis retuli species, in quibus articulus secundus funiculi tertio multo longior, oculi maximi, in fronte subconnexi, totam fere capituli superficiem occupantes, et femora postica elongata, abdomen superantia. Insignes quaedam differentiae habituales praecipue in causa fuerunt, cur subgenera sequentia, a quibus gentini praesertim corpore magis cylindrico distinguuntur, proposuerim.

Subgenus *A. Coptorus* nob. — *Poecilma* Germ. —
Rhynchaenus Fabr. — *Coptopygus* nob.
olim.

Adumbratio: — *Antennae* ut in genere *Zygopis* gentini, praeter articulos funiculorum 2 et 3 paullo breviores. — *Caput, Rostrum* et *Oculi* ita etiam ut in genere *Zygopis* sunt constructi, differt vero thoracis basi in medio semper sinuato-lobata et canali infero profundiore, pectus transeunte et usque inter pedum intermediarum basin protenso, lateribus argute marginato. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, latitudine vix longiora, humeris obtuse angulatis; versus apicem parum et sensim attenuata, apice aut obtuse rotundata, aut pone suturam mucronata, supra pluinacula; abdomen et alas obtegentia. — *Abdomen* basi subinflatum, postice retusum. — *Pygidium* haud apertum. — *Pedes* elongati, angusti, antici nonnihil, postici valde distantes; femoribus vix clavatis, acute dentatis, posticis valde elongatis; tibiis et tarsis ut in *Zygope* gentino. — *Corpus*

breviusculum, rhombicum, supra saepius depressum, alatum.

Typus: — *Poecilma papaveratum* Germ. — Congenerici: Rh. *Lamella* Fabr. et tres indescriptae species.

A $\alpha\alpha\tau\omega$ scindo, amputo, $\omicron\upsilon\phi\alpha$ anus.

Observatio: — Huc pertinentes species structura sunt singulari, antice angustata, abdomine retuso, femoribus posticis longioribus, vix clavatis.

Subgenus B. *Piazorus* nob. — *Poecilma* Germ. — *Cryptorhynchus* Dej. — *Rhynchaenus* Fabr.

Adumbratio: — *Antennae*, *Caput*, *Rostrum* et *Oculi* ut in subgenere *Coptori*. — *Thorax* subconicus, basi leviter bisinuatus, apice late, non vero profunde subemarginatus, supra modice convexus; canalis inferus in pectus continuatus, apice distincte terminatus. — *Scutellum* distinctum, apice rotundatum. — *Elytra* thoracis basi fere duplo latiora, humeris rectangulatis; latitudine duplo fere longiora, versus apicem sensim angustata, oblongo-triangularia, supra aut modice convexa, aut planiuscula, apice vel obtuse rotundata, vel mucronata, anum tegentia. — *Abdomen* basi subinflatum, apice non retusum. — *Pygidium* vix conspicuum. — *Pedes* elongati, validi, distantes; femoribus manifeste clavatis, posticis elongatis, dente valido acuto, armatis; tibiis et tarsis ut in genere *Zygopis*. — *Corpus* subovatum, alatum.

Typus: — *Rhynchaen. pleuronectes* Fabr. — Congenerici: — *Poecilma stipitosum* et *ciliatum*? Germ. — *Rhynch. Cerastes* Fabr. — *Crypt. compactus* Dej.

A $\mu\alpha\acute{\iota}\zeta\omega$ premo, $\omicron\upsilon\phi\alpha$ anus.

Observatio: — Subgeneri praecedenti *Coptori* proximum, a quo tamen facile dignoscitur elytrorum exactius fere forma triangulari, abdomine apice haud retuso, femoribus valde clavatis, praesertim posticis, subtus dente valido, acute armatis.

Subgenus C. *Coryssopus* nob.

Adumbratio: — *Antennae* longiusculae, tenues, ante medium rostri insertae; funiculo 7-articulato: articulis om-

nibus obconicis, exterioribus sensim brevioribus; clava oblonga, obovata. — *Rostrum* vix longitudinem capitis thoracisque adaequans, arcuatum, subtenue, teres, basi paullo crassius, carinatum, versus apicem laeve, complanatum; scrobe pone gulam exeunte. — *Oculi* breviter ovati, convexi, supra subconjuncti. — *Thorax* transversus, anterieus valde angustior, subconicus, basi subbisinuatus, ante scutellum productus, apice subtruncatus, sup̄e convexus; canalis inferus usque inter pedum intermediorum basin continuatus, profundus, argute marginatus. — *Scutellum* distinctum, apice truncatum. — *Elytra* basi thoracis haud latiora, quo duplo longiora, pone basin ampliata, dein ad apicem usque sensim angustata, subtrigona, apice singulatim rotundata, paullulum gibba, abdomen tegentia. — *Pedes* validiusculi; femoribus anterioribus parum clavatis, posticis ultra elytrorum apicem protensis, sublinearibus, omnibus bidentatis; tibiis subteretibus, apice unco valido, deflexo armatis. — *Corpus* breve, valde convexum praesertim posterius, alatum.

Typus: — *Zygops* (*Coryssopus*) *hexastichus* nob. e Sierra Leona. — Nec plures species vidi.

Α κορύσσω armo, ποὺς pes.

Observatio. — Antennae generis *Zygopis* aliter formatae suadere quidem videntur, ne hoc genus generi illi adscribatur; tam vero oculorum, quam rostri pedumque forma haud parum ei similis est, maxima tamen est similitudo cum subgenere *Coptoro*.

Genus 176. *Mecopus* Dalm. — *Poecilma* Germ. — *Rhynchaenus* Fabr., et Weber.

Character generis: — Antennae mediocres, tenues, versus apicem rostri insertae; scapus in mare vix ultra medium rostri extensus; funiculo 6-articulato: articulo 2^o elongato; clava elongata, articulo 1^o longo, basi angusto. —

Rostrum longissimum, filiforme.

Oculi maximi, subconnati.

Thorax transversus, pulvinatus; maris pectus subtus hispinosum, obsolete canaliculatum.

Elytra thoracis medio non latiora, oblongo-subquadrata.
Pedes longissimi, graciles.

Descriptio: — *Corpus* suboblongum, alatum. — *Antennae* in mare vix oculos attingentes, versus apicem rostri adnexae; in femina ultra oculos se extendentes, pone medium rustri insertae, tennes, fractae, reflexae, 12-articulatae; scapo in mare vix ultra medium rostri extenso, recto, clavato; funiculo 6-articulato: articulo 1^o obconico, 2^o elongato, clavato, 3-6 brevissime obconicis; clava elongata, acuminata, 5-articulata, articulo 1^o longo, basi tenui, reliquis brevibus, intermediis crassioribus, arcte connexis. — *Caput* exsertum, hemisphaericum. — *Rostrum* dimidio corporis longius vel magis, filiforme, basi rectum, apice arcuatum; scrobe versus apicem incipiente, angusta, obsoleta, sub basi rostri desinente. — *Oculi* maximi, convexi, subconjuncti, totam capitis anticam superficiem occupantes. — *Thorax* longitudine latior, basi bisinuatus, apice late sed non profunde emarginatus, antice paullo angustior, coarctatus, lobis ocularibus nullis, lateribus subaequaliter rotundatus, supra pulvinatus; maris antice a pectore spinis duobus porrectis validis, acutis armatus; canalis inferus, obsoletus, feminae thorax muticus; canalis vix ullus. — *Scutellum* distinctum, oblongum. — *Elytra* thoracis medio non latiora, sed illo fere duplo longiora, oblongo-subquadrata, versus apicem sensim paullo angustata, apice ipso subtruncata, supra planiuscula; anus aliquantum prominens. — *Abdomen* postice quam maxime retusum. — *Pedes* longissimi, graciles, antici approximati, postici valde distantes; femoribus linearibus, denticulatis, intermediis brevibus; tibiis teretibus, apice unco valido, deflexo armatis, anticis intus crenulatis; tarsi tibiis paullo breviores, antici in mare subtus plumati, articulo 1^o longissimo, gracili, 2^o breviusculo, trigono, 3^o paullo latiore, bilobo, ultimo brevi, clavato, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen. hispinosus* Fabr. et Web.
Unam speciem vidi.

A μήχος longitudo, πούς pes.

Observatio: — Oculi magni et ipsa corporis forma magnam cum genere *Zygopis* indicant convenientiam, sed dis-

simillima antennarum pedumque structura, a ceteris omnibus, mihi notis, Curculionibus diversitatem efficit. Hoc quidem genus, etsi canalicula in inferiore latere thoracis haud satis conspicua sit et masculo solum adsit, heic tamen ponendum duxi, respectu partium quarundam cum genere supra dicto congruentia.

Genus 177. *Lechriops* nob. *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtennes, versus medium rostri insertae; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus obconicis, reliquis brevibus, nodosis; clava ovata.

Rostrum longiusculum, validiusculum, subteres, parum arcuatum.

Oculi oblongo-subovati, margine inferiore acuminati, in fronte fere connexi, magni.

Thorax transversus, anterieus paullo angustior, basi bisinuatus.

Elytra thoracis basi dimidio latiora, versus apicem parum angustata, oblongo-subquadrata, apice valde obtuse rotundata.

Tibiae breves, apice unco acuto, subdeflexo armatae.

Descriptio: — *Corpus* breve, oblongo-subquadratum, supra subdepressum, parvum, alatum. — *Antennae* rostro paullo longiores, versus medium rostri insertae, subtenuae, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos haud attingente, clavato, 2 et 3 obconicis, illo crasso, 4-8 brevibus, nodosis, gradatim paululum latioribus; clava ovata, subacuminata, 4-articulata. — *Caput* exsertum, hemisphaericum. — *Rostrum* thorace vix longius, validiusculum, subteres, inflexum, parum arcuatum; scrobe in medio incipiente, angusta, ante gulam exeunte. — *Oculi* valde oblongi, subovati, convexi, infra acuminati, in fronte fere connexi, dimidiam partem capitis anticam occupantes. — *Thorax* longitudine latior, antrosum paullo angustior, ante apicem nonnihil coarctatus, subtruncatus, basi bisinuatus, lobis ocularibus caret, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus; canalis inferus profundus, per totum pectus usque

ad intermediorum pedum basin exaratus, longitudinaliter protenditur. — *Scutellum* punctiforme, minutum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, thorace duplo longiora, versus apicem parum angustata, oblongo-subquadrata, apice obtusissime rotundata, supra parum convexa, dorso deplanata, abdomen obtegentia; humeris obtuse angulatis. — *Abdomen* basi subinflatum, postice retusum. — *Pedes* mediocres, validiusculi, postici valde distantes; femoribus parum clavatis, denticulatis, posticis paullo longioribus; tibiis breviusculis, subcompressis, apice unco acuto, subdeflexo armatis; tarsis breviusculis, articulis 1, 2 trigonis, penultimo latiore, bilobo, subtus spongioso, ultimo parum clavato, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Sciurus? Fabr. — Unam tantum speciem a Dom. T. Lund Hafniae sub hoc nomine communicatam habeo.

A λέξις obliquus, ὡς ὁculus.

Observatio. — Quoad habitum inter hoc et genus Ceutorhynchi pariter ac Baridii quaedam intercedit similitudo; magni autem, ovati et convexi oculi, quorum inferior sinus in acutum apicem protenditur, aliquid ab hisce generibus diversum indicant. Caput hemisphaericum et abdomen retusum hoc genus generi Mecopi et subgeneri Coptori similitudine admovet.

Genus 178. Pinarus nob. — Poecilma Germ. — Cryptorhynchus Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, tenues, ante medium rostri insertae; funiculo 7-articulato; articulo 1^o breviusculo, obconico, 2 et 3 elongatis, subcylindricis, illo longissimo, 4-7 brevibus, nodosis; clava ovalis, acuminata.

Rostrum elongatum, minus tenue, subarcuatum, teres.

Caput exsertum, antice depressum.

Oculi laterales, breviter ovati.

Thorax longus, subconicus.

Elytra oblongo-ovata, apice mucronata; humeri re-ctangulati.

Pedes mediocres, aequales.

Descriptio: — *Corpus* oblongum, convexum, inaequale, squamosum, alatum. — *Antennae* ultra thoracis medium vix pertingentes, ante medium-rostri insertae, tenues, fractae, reflexae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o breviusculo, obconico, 3 et 4 elongatis, subcylindricis, illo longissimo, 5-8 brevibus, nodosis, aequalibus; clava ovali, acuminata, distincte 4-articulata. — *Caput* exsertum, inter oculos depressum, supra deplanatum. — *Rostrum* capitis thoracisque longitudine, minus tenue, basi parum crassum, teres, versus apicem paulatim complatum, arcuatum, denudatum; scrobe profunda, ante medium incipiente, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* laterales, breviter ovati, modice prominuli. — *Thorax* latitudine longior, subconicus, basi leviter bisinuatus, apice in medio subemarginatus, supra modice convexus, inaequalis, pone oculos obsolete lobatus; canalis inferus, totum pectus longitudinaliter percurrit, profundus, argute marginatus. — *Scutellum* distinctum, rotundatum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora et illo triplo longiora, humeris rectangularibus; oblongo-ovata, supra convexa, inaequalia l. gibbosa, apice mucronata, dehiscentia, abdomen obtegentia. — *Pedes* mediocres, validi, distantes, longitudine subaequales; femoribus clavatis, obsolete l. vix dentatis; tibiis breviusculis, subcompressis, apice unco valido, deflexo armatis; tarsis subtus spongiosis, articulo 1^o longiusculo, subtrigono, ultimo clavato, valido, biunguiculato.

Typus: — *Poecilma spiculum* Germ. vel *Cryptorh. squalidus* Dej. Nullam aliam vidi.

Α *πικρός* sordidus.

Observatio: — Ut subgenus *Zygopis* hoc ponere non sum ausus, etsi antennae hujus cum illis maximam habeant similitudinem. Differt praecipue: oculis distantibus, minoribus, femoribus vix dentatis, posticis abdomine brevioribus. Facies generis genuini *Cryptorhynchi*.

*****) Genus 179. *Centrinus* nob. — *Baris* Germ. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres, subtennes; funiculo 7-articulato: articulo 1^o elongato, subclavato, 2^o paullo brevior, obconico, 3-7 multo brevioribus, etiam obconicis; clava ovalis, acuminata.

Rostrum saepius longissimum, filiforme.

Thorax basi bisinuatus, versus apicem valde attenuatus, pone caput tubulatus; canalis inferus, aut valde obsoletus, aut distinctus; pectus in mare saepius antrorsum bispinosum.

Elytra thoracis basi paullo latiora, a basi ad apicem sensim angustata, oblongo triangularia.

Tibiae apice truncatae, anticae unco minuto intus armatae.

Descriptio: — Corpus ovale, alatum. — Antennae thoracis medium non superantes; versus medium rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae; scapo elongato, clavato, basi tenui, oculos non attingente; funiculo 7-articulato: articulo 1^o longiusculo, aut subclavato, aut subobconico, 2^o paullo brevior, obconico, reliquis multo brevioribus, etiam obconicis; clava elongata, ovali, acuminata, 4-articulata. — Rostrum in plerisque corporis longitudine, saepius filiforme, tenue, fere subulatum, valde arcuatum, inflexum; scrobes curvatae, basi rostri subtus coeuntes. — Caput parvum, rotundatum, convexum. — Oculi ovati, distantes, demissi, depressi. — Thorax longitudine duplo fere latior, anterieus valde angustior, pone caput tubulatus, subtruncatus, lobis ocularibus caret, lateribus rotundatus, postice plus minusve profunde bisinuatus, ante scutellum aliquantum productus, supra aut modice, aut valde convexus et pulvinatus; subtus pro receptione rostri canalis aut obsoletus, aut distinctus; in mare saepe ante pedum anticorum originem duae spinae longissimae, acutae, porrectae sunt. — Scutellum distinctum, aut apice truncatum, aut rotundatum. — Elytra thoracis basi paullo latiora, sed illo fere duplo longiora, a basi ad apicem sensim angustata, oblongo-triangularia, dorso saepius planiuscula, ante apicem callosa, pygidium obtegentia; humeris obtuse angulatis. — Pedes mediocres, validiusculi, longitudine subaequales, distantes; fe-

moribus clavatis, aut mutuis aut subdentatis; tibiis plerumque subcompressis, in aliis teretibus, apice truncatis, extus excavatis, anticis unco minuto intus armatis; tarsis subtus spongiosis, articulis duobus prioribus triangulatis, tertio multo latiore, bilobo, ultimo clavato, breviter binnguiculato.

Stirps 1^a. Thorax pro receptione rostri obsoletissime infra canaliculatus. Femora semper mutica.

Typus: — *Baris bicuspis* Germ. — Congenerici: *Baris Olfersii*, *squamipes* et *gibbirostris* Germ. — *Rhynchaen. 4-vittatus* Fabr. et octo adhuc indescriptae species.

Stirps 2^a. (*Xystus* nob. olim.) — Thorax plus minusve distincte infra canaliculatus. Femora plerumque subdentata.

Typus: — *Ceutorhynchus sanguinicollis* Germ. Congenerici: *Centrinus Elephas* et *corruscus* nob. *Cryptorh. Leachii*, Kirby et plures aliae species indescriptae.

A. xerophilus aculeatus.

Observatio: — Respectu habitus generi *Balanini* simillimum, sed thorax ad basin magis sinuatus est et juxta caput tubulatus, elytra apice non singulatim rotundata, pedes distantes. A genere *Baridii* differt: forma corporis magis triangulari, elytris versus apicem sensim angustatis, antennis longioribus et minus crassis, articulisque funiculi non coarctatis, scapo oculos haud attingente. Cum genere *Ceutorhynchi* hoc genus apte conjungi, non mihi, ut Dom. Germaro, videtur; habent enim *Ceutorhynchi* scutellum vix conspicuum, elytra apice singulatim rotundata, pygidium distinctum, quae omnia haec aliter sunt. Potius ad genus *Dionymeri* nob. applicari posset, videtur tamen forma rostri, antennarum et femorum haud parum differre.

Subgenus *Cylindrocerus* nob.

Adumbratio: — Antennae longiusculae, subtennes; funiculo 7-articulato: articulis duobus basalibus obconicis, reliquis brevibus, nodosis, coarctatis; clava longissima, cylindrica, apice acuminata. — *Caput, Rostrum* et *Oculi* ut

in genere *Centrinii*. — *Thorax* longitudine latitudinem baseos vix superans, basi bisinuat, anterie valde et pone caput manifeste angustus, coarctatus, apice truncatus, subtus vix canaliculatus; pectus antice spinis duabus aut longissimis, acutis, recurvatis, aut brevibus, obtusis, rectis armatum. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo sesqui longiora, a basi ad apicem sensim angustata, oblongo-triangularia, dorso planiuscula, ante apicem non callosa; humeris obtuse angulatis. — *Pedes* elongati, distantes; femoribus clavatis, muticis; tibiis rectis, versus apicem sensim incrassatis, extus pro receptione tarsorum excavatis, anticis intus plumatis; tarsis latiusculis, subtus spongiosis.

Typus: — *Centrinus* (*Cylindroc.*) *Commia* nob. e Brasilia, plures species haud vidi.

A *κύλινδρος* cylindrus, *κέρας* cornu.

Observatio: — Forma licet antennarum longe alia sit, ac in *Centrinis* genuinis, magna tamen intercedente convenientia non solum habitus, sed et partium quarundam aliarum, hoc ut diversum genus constituere non sum ausus.

Genus 180. *Diorymerus* nob. — *Orobitis* Germ. — *Rhynchaenus* Fabr.

Character generis: — Antennae breves, validiusculae; funiculo 7-articulato: articulis brevissime obconicis, coarctatis, crassitudine crescentibus; clava elongata, ovalis.

Rostrum longiusculum, crassiusculum; scrobs pone medium incipiens, curvata, versus gulam desinens.

Thorax ante scutellum productus, a medio ad apicem angustatus, deflexus, apice tubulatus, supra gibbus; canalis inferus, profundus, in pectus haud continuatus.

Elytra triangularia, gibba, pone humerum rotundato-ampliata.

Pedes compressi; femora subtus canaliculata; tibiae apice intus dente armatae.

Descriptio: — *Corpus* breve, subovatum, valde convexum l. gibbum, alatum. — *Antennae* rostro vix longiores, in medio rostri insertae, validae, fractae, 12-articula-

tae; articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2^o obconico, 3-8 brevissime obconicis, coarctatis, gradualim paullo latioribus; clava magna, elongata, ovali, acuminata, 4-articulata, articulis difficile discernendis — *Rostrum* thorace vix longius, crassiusculum, arcuatum, inflexum, teres; acrothe pone medium incipiente, curvata, versus gulam desinente. — *Caput* minutum, convexum. — *Oculi* ovati, distantes, demissi, depressi, magni. — *Thorax* latitudine longitudinem vix superans, subconicus, antrosum angustior, basi obsolete bisinnotatus, ante scutellum productus, lateribus subcompressis; pone caput tubulatus, in medio productus, lobis ocularibus nullis; supra aut gibbus, aut valde convexus, subtus pro receptione rostri exaratus; canalis profundus in pectus haud continuatus, coxae pedum anticorum tuberosae, inaequales, margo rimae ante coxam acutus. — *Scutellum* distinctum, apice subtruncatum. — *Elytra* basi thoracis latiora, quo fere sesqui longiora, triangularia, angulis humeralibus rotundatis, ampliatis, lateribus usque ad apicem sensim angustata, supra convexa, abdomen obtegentia. — *Pedes* breviusculi, robusti, longitudine subaequales, anticae basi distantes; femoribus compressis, parum clavatis, haud dentatis, pro receptione tibiarum sulcatis; tibiis compressis, rectis, apice intus horizontaliter dentatis, posterioribus basi extus saepius angulatis; tarsis subtus spongiosis, articulis duobus basalibus triangularibus, penultimo multo latiore, bilobo, ultimo clavato, breviter biunguiculato.

Typus: — *Orobittis* altus Germ. — Congenerici: *Orob.* anceps, cardinatus et repens Germ. — *Rhynchaen.* gagates Fabr.

Α δωρύς canalis, ὑπὸς femur,

Observatio: — Habitus valde congruit cum speciebus quibusdam generis *Centrinus*, breviores tamen sunt antennae itemque rostrum, et structura robustiores, femora infra canaliculata.

Genus 181. *Eurhinus* nob. — *Eurhin.* Illig. Germ.

Character generis: — Antennae breves, subcrassae; funiculo 7-articulato, extus longitudinaliter impresso,

articulis transversis, latis, perfoliatis; clava conoidea, acuminata.

Rostrum elongatum, crassiusculum, teres, parum arcuatum, scrobe profundissima, pone medium incipiens, versus gulam excurrente.

Thorax basi profunde bisinuatus, ante medium mox angustatus, pone caput tubulatus, infra minus distincte canaliculatus.

Elytra subtriangularia, pone humerum ampliata, pygidium haud obtegentia.

Tibiae apice intus dente horizontali armatae.

Descriptio. — *Corpus* subovale, convexiusculum, alatum. — *Antennae* thoracem subattingentes, pone medium rostri insertae; saepius crassae, nonnunquam validae, fractae, 12-articulatae; scapo oculos haud attingente, clavato, funiculo 7-articulato, extus longitudinaliter plus minusve profunde impresso, aut crasso, subfusiformi, articulis transversis, brevissimis, latis, contractis, perfoliatis, aut valido, versus apicem sensim incrassato, articulis brevissime subobconicis, coarctatis; clava conoidea, acuminata, 4-articulata, articulis vix conspicuis. — *Rostrum* thoracis longitudine, crassiusculum, lineare, supra teres, subtus canaliculatum, parum arcuatum, inflexum; scrobe profundissima, pone medium incipiente, mox subtus flexa, pone gulam exeunte. — *Oculi* laterales, ovati, depressi, minores. — *Thorax* transversus; valde convexus, basi profunde bisinuatus, lateribus antrosum lente, apice jam cito angustatus, pone caput tubulatus et truncatus, versus oculos non lobatus, infra pone gulam profunde emarginatus; canalis pro receptione rostri latus, minus vero profundus, inter pedes primarios desinens, immarginatus. — *Scutellum* triangulare, sat distinctum. — *Elytra* basi thoracis paullo latiora, quo vix longiora, mox pone basin supra transverse impressa, pone humeros subangulato-ampliata, versus apicem valde angustata, cordato-triangularia, convexiuscula, apice ipso singulatim rotundata, pygidium haud obtegentia. — *Pedes* breviusculi, antici paullo longiores, distantes; femoribus subcylindricis, ante apicem

coarctatis; tibiis compressis, apice truncatis, intus dente horizontali armatis; tarsis subtus spongiosis, articulis 2 et 3 latis, hoc bilobo, ultimo vix clavato, breviter biunguiculato.

Typus: — Eurhin cupratus Illig. — *Congenerici*: Eurh. flaturarius Germ. — Rhynch. festivus Fabr.

Ab *eu* bene et *ps* nasus.

Observatio: — Statura et facies ut in genere Diorymeri, antennae vero aliter sunt constructae; thorax infra minus profunde canaliculatus, pygidium apertum.

***** Genus 182. Orobitis Germ. — Rhynchaenus Oliv. Gyll. — Atelabus Fabr. — Curculio Linn. Herbst. Payk.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenues, in medio rostri insertae; funiculo 7-articulato: articulis basalibus obconicis, reliquis lenticularibus; clava ovata, acuminata.

Rostrum elongatum, subtenue, teres, arcuatum, inflexum.

Oculi supra subcontigui, magni.

Thorax brevissimus, transversus, anterieus angustior, basi apiceque subtruncatus.

Elytra subrotundata, valde convexa, posterius attenuata, apice singulatim rotundata, deliscentia.

Pedes demissi, femora subtus canaliculata.

Descriptio: — *Corpus* ovale, subglobosum, contractum, gibbum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque longiores, in medio rostri insertae, subtenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o elongato, oculos haud attingente, clavato, 2^o longiusculo, obconico, 3-6 brevissime obconicis, 7 et 8 subrotundatis; clava ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* dimidii corporis longitudine, subtenue, teres, arcuatum, pectori arcte applicatum; scrobes lineares, subtus flexae, in basin rostri subtus coeuntes. — *Caput* intra thoracem fere retractum, fronte solum conspicua, parum convexum. — *Oculi* magni, depressi, in fronte approximati. — *Thorax* longitudine multo latior, anterieus angustior, lateri-

bus rotundatus, antice posticeque subtruncatus, supra convexus; subtilis canalis sensim explanatus, in pectus laud continuatus. — *Scutellum* distinctum, elevatum, punctiforme. — *Elytra* antice thoracis basi latiora, quo triplo longiora; humeris rotundatis; posterius attenuata, apice singulatim obtuse rotundata, dehiscencia, supra valde convexa, praesertim antierius gibbosa. — *Pedes* elongati, retractiles, basi distantes; femoribus curvatis, modice incrassatis, subina pro-receptione tibiaram, apice canaliculatis; tibiis rectis, tetratibus, apice truncatis, muticis; tarsis subtilis spongiosis, articulo penultimo bilobo, ultimo parum clavato, biunguiculato.

Typus: — *Attelab. globosus* Fabr. sen *Rhynchaen. globosus* Fabr. Gyll. — *Curc. cyaneus* Linn. Unica species mihi cognita.

Ab *οροβίτης* l. *οροβοειδής* ervo similis, quod ab *οροβος* ervum, *είδος* similis.

Observatio: — Forma singularis, contracta, globosa; in statu trepido femora perpendiculariter dimittit, tibiae et tarsos remissas seu reclinatatas occultat.

Genus 183. *Cleogonus* nob. — *Orobitis* Germ. —

Rhynchaenus Fabr. Oliv.

Character generis: — Antennae breviusculae, minus tenues, versus apicem rostri insertae; funiculo 7-articulato, articulis duobus basalibus obconicis, reliquis brevibus, apice truncatis; clava oblongo-ovata.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, teres, versus apicem arcuatum.

Oculi et supra et infra subcontigui, magni.

Thorax subconicus, basi in medio et pone oculos lobatus.

Elytra ovata, convexa, antice singulatim producta, apice obtuse rotundata.

Descriptio: — *Corpus* ovale, convexum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque longiores, versus apicem rostri insertae, minus tenues, fractae, 12-articulatae: articulo 1^o oculos vix attingente, recto, clavato, 2^o et 3^o breviusculis,

obconicis, 4-8 brevibus, apice truncatis, gradatim paullo latioribus; clava oblongo-ovata, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* thoracis longitudine, crassiusculum, lineare; inflexum; supra teres, subtus deplanatum, versus apicem arcuatum; scrobe versus apicem incipiente, profunda, subtus flexa, in basi rostri pone gulam desinente. — *Caput* exsertum, convexum. — *Oculi* et supra et infra subcontigui, convexi, magni. — *Thorax* longitudine latitudinem vix superans, conicus, convexus, antrosum sensim attenuatus, postice vix sinuatus, pone scutellum prominenter lobatus, antice parum prominulus, lobis pone oculos exiguis, subtus pro receptione rostri profunde exaratus; canalis inter pedum anteriorum basin evanescit. — *Scutellum* distinctum, oblongum, supra planum. — *Elytra* basi thoracis latiora, quo triplo longiora, ovata, convexa, antice singulatim aliquantum producta, humeris retusis, obtuse angulatis; apice ipso obtuse rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* longiusculi, perpendiculariter demissi, basi distantes; femoribus sublineariibus, rectis, muticis, subtus pro receptione tibiaram sulcatis; tibiis compressis, rectis, posterioribus apice intus dente horizontali, minuto instructis; tarsis subtus spongiosis, articulo penultimo lato, bilobo, unguiculo brevi, biunguiculato.

Typus: — *Rhynchaen*, rubetra Fabr. — *Rhynch. gagates* Oliv. — Nec plures praeter hanc vidi.

Α κλήω ἀδstringo γόνυ genu.

Observatio: — Quoad habitum cum generi *Orobitidis*, tum *Ocladii* simile, sed ab illo differt antennarum insertione prope apicem rostri, capite, elytris et tibiis longe aliter constructis. — Genus *Ocladii* alia scutelloque conspicuo caret; antennae et elytra aliter formata.

Genus 184. *Ocladius* nob. — *Rhynchaenus* Oliv.

Character generis: — Antennae mediocres, subtenuae; funiculo 7-articulato; primis insequentibus articulis paullo longioribus, obconicis, reliquis brevibus, apice truncatis; clava ovalis, acuminata.

Rostrum elongatum, teres, arcuatum, minus tenue.

Oculi parvi, subrotundati, immersi.

Thorax aut conicus, aut subglobosus; lobi oculares distincti.

Elytra subovata, lateribus abdomeni subincludentia, supra valde convexa.

Femora subtus canaliculata; tibiae inflexae.

Descriptio: — *Corpus* ovale, breve, valde convexum, fornicatum, durum, apterum. — *Antennae* capite rostroque longiores, in medio rostri insertae, subtenues, fractae; 12-articulatae: articulo 1^o oculos non attingente, clavato, 2 et 4 subelongatis, obconicis, reliquis brevibus, apice truncatis, exterioribus paulatim crassioribus; clava oblonga, ovali, acuminata, 4-articulata. — *Rostrum* capituli thoracis-que longitudine, validiusculum, teres, lineare, modice arcuatum, sulcatum; scrobe recta, ad oculum protensa. — *Oculi* laterales, subrotundati, immersi, parvi. — *Thorax* in plerisque conicus, modice convexus, basi truncatus, antice supra caput productus, pone oculos lobatus in nonnullis subglobosus valde convexus; canalis subtus sensim explanatus. — *Scutellum* obsoletum, saepius haud observandum. — *Elytra* ampla, subovata, connata, basi thoracis haud latiora, quo duplo longiora, mox pone basin nonnihil ampliata, lateribus abdomen subincludentia, versus apicem sensim angustata, supra, praesertim posterius, valde convexa. — *Pedes* longiusculi, validiusculi, demissi, longitudine subaequales; femoribus rectis, sublinearibus, muticis, subtus pro receptione tibi-
arum sulcatis; tibiis inflexis, validis, aut subangulatis, aut subteretibus, apice truncatis, unco minuto intus instructis; tarsis reflexis, subtus minus spongiosis, articulis duobus prioribus subtriangulatis, tertio paullo latiore, bilobo, unguiculari articulo parum clavato, breviter biunguiculato.

Typus: — Rhynch. Salicorniae Oliv. — Congener. Oclad. pertusus nob. patria me fugit, forte Arabia e Mus. Reg. Holm. — Oclad. glomeris nob. ex Ind. orient.

Ab *ὀκλαδίας* qui genua flectit.

Observatio: — Quae primum nominantur species respectu habitus quandam habent congruentiam cum Cleogoni

genere; defectus vero scutelli et alarum, elytrorumque latera, quae ad partem abdomen includunt, nec non antennae longae aliter constructae, essentialia differentia efficiunt.

Sectio 2^a. Antennae 10 vel 9 articulatae. (Funiculus semper 5-articulatus.)

(*Divisio 4^a.* Cionides. Antennae breviusculae; funiculus 5-articulatus; clava 3 l. 4 articulata.)

Genus 185. *Cionus* Clairv., Latr., Germ., Dej. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyll. Oliv. — *Curculio* Linn. — *Cleopus* Dej.

Character generis: — Antennae breviusculae, subtenues; funiculo 5-articulato: articulis duobus basalibus obconicis, reliquis brevibus, apice subtruncatis; clava oblongo-ovalis, indistincte articulata.

Rostrum elongatum, teres, arcuatum.

Thorax parvus, transversus, anterieus angustior, basi apiceque subtruncatus.

Elytra ampla, convexa, quadrato-ovata, anum obtegentia.

Tibiae apice truncatae, muticae.

Descriptio: — *Corpus* quadrato-ovatum, paullo longius quam latius, fornicatum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque paullo longiores, versus medium rostri insertae, subtenues, fractae, reflexae, 10-articulatae: articulo 1^o elongato, oculos subattingente, recto, parum clavato, 2 et 3 obconicis, reliquis brevibus, subnodosis l. apice subtruncatis; clava oblongo-ovali, apice acuminata, articulis 4 arcte connexis. — *Rostrum* capite thoraceque longius et ultra, subtenue, teres, modice arcuatum, inflexum; scroba lineari, pone gulam exeunte. — *Oculi* majusculi, ovati, parum prominuli, aut laterales, aut in fronte parum approximati. — *Thorax* parvus, longitudine latior, anterieus angustior, truncatus, basi subbisinuatus, supra modice convexus, infra pone gulam profunde emarginatus. — *Scutellum* distinctum, oblongum, apice rotundatum, depressum. — *Elytra* magna,

quadrato-ovata, thoracis basi fere duplo latiora, quo plus quadruplo longiora, humeris elevatis, rectangulatis; supra convexa, dorso antico tamen deplanata, pygidium obtegentia. — *Pedes* breviusculi, longitudine subaequales, validi, antiqui approximati; femoribus clavatis, incrassatis, dentatis; tibiis subteretibus, apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 triangularibus, 3^o dilatato, bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Cionus Scrophulariae* Auctor. — Congenerici: *Cion. Verbasci*, *Thapsi*, *olens*, *Blattariae*, *Fraxini*, *pulchellus*, *Solani* et *setiger*. Germ. *Cionus* nomen antiquum, teste Oliv.

Genus 186. *Gymnaetron* nob. — *Cionis* Germ. — *Rhynchaenus* Fabr. Gyll. — *Cleopus* Dej.

Character generis: — Antennae breves, subtenuae; funiculo 5-articulato: articulis 1 et 2 obconicis, 3-5 brevibus, apice subtruncatis, in plerisque versus apicem gradatim paullo latioribus; clava ovata, 4-articulata.

Rostrum elongatum, aut teres, arcuatum, aut subrectum, versus apicem attenuatum.

Thorax brevissimus, transversus, anguli postici saepius rotundati; supra parum convexus; in paucis subtus canaliculatus.

Elytra aut subovata, modice convexa, aut planiuscula, subquadrata, pygidium plus minusve obtegentia.

Tibiae anteriores apice unco minuto intus instructae.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, subovatum, in plerisque minus convexum; alatum. — *Antennae* vix rostri capitisque longitudine, in nonnullis subtenuae, in ceteris validae, fractae, 10-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculos vix attingente, 2 et 3 obconicis, 4-6 brevibus, apice subtruncatis, aut subrotundatis, crassitudine sensim saepius crescentibus; clava majuscula, breviter ovata, 4-articulata, articulis arcte conjunctis. — *Rostrum* in masculis thoracis longitudine, in feminis paullo longius, subtenuae, inflexum; in plerisque teres, arcuatum, in quibusdam subrectum, versus apicem attenuatum; scrobe lineari, in basi

rostri subtus desinente. — *Oculi* majusculi, laterales, aut rotundati, prominuli, aut ovati, subdepressi. — *Thorax* brevissimus, longitudine latior, antice angustior, basi apiceque subtruncatus, lateribus angulisque posticis rotundatus, supra in aliis modice, in aliis parum convexus, subtus in nonnullis pro receptione rostri profunde canaliculatus; canalis in pectus haud continuatus. — *Scutellum* apice rotundatum. — *Elytra* forma variant: aut subovata, thoracis basi paullo latiora, sed illo triplo longiora, humeris obtuse angulatis; supra modice convexa, anum subobtegentia; aut subquadrata, thoracis medio paullo latiora, quo plus triplo longiora, humeris antrorsum subprominulis; supra dorso depressa, pygidium haud obtegentia. — *Pedes* mediocres, longitudine subaequales, validi; femoribus clavatis, in nonnullis subtus denticulatis; tibiis subteretibus, apice subtruncatis, anterioribus apice interiore denticulo minuto armatis; tarsis subtus spongiosis, articulis duobus basalibus triangularibus, penultimo dilatato, bilobo; ultimo elongato, clavato, biunguiculato.

Stirps 1a. — Rostrum filiforme. Elytra subovata, convexa. Pygidium ab elytris vix tectum.

Typus: — *Rhynchaen. Beccabungae* Fabr. Gyll. — *Congenerici:* *Cion. Veronicae*, pascuorum, rostellum et labialis Germ.

Stirps 2a. — (*Miarus* nob. olim.) Rostrum filiforme, in canalicula pectorali immersum. Elytra planiuscula, subquadrata. Pygidium apertum.

Typus: — *Rhynchaenus Campanulae* Auct. — *Congenerici:* *Rhynch. graminis* Gyll. — *Cionus plantarum* et *micros* Germ.

Stirps 3a. — Rostrum liberum, versus apicem saepius attenuatum. Elytra planiuscula, subquadrata; humeri antrorsum subprominuli. Pygidium apertum.

Typus: — *Rh. teter.* Fabr. — *Congenerici:* *Cion. Antirrhini* et *Linariae* Germ. — *Rhynchaen. collinus* Gyll. — *Cion. noctis* Germ. I. *Rh. Antirrhini* Gyllenh.

A. γυμνός nudus, ἥρπον imus venter.

Observatio. — Quibusdā in partibus hoc quidem genus cum genere Cioni valde convenit; cum vero antennae paullo breviores sint, funiculus saepissime crassior et extrorsum densior, clava antennarum breviter ovata, tibiae anteriores apice intus denticulo instructae, thorax et elytra longe sint aliis structurae; has omnes dissimilitudines ut characteres diversi generis statuendas esse, putaverim.

Genus 187. *Mecinus* Germ. Dej. — *Rhynchaenus* Gyllenh.

Character generis: — Antennae breves, minus tenues; funiculo 5-articulato: articulis 1 et 2 obconicis, illo longiore, 3-5 transversis; clava ovalis, subsolida.

Rostrum breviusculum, validiusculum, deflexum, teres.

Thorax subcylindricus, summo apice attenuatus.

Elytra elongata, subcylindrica, anum obtegentia.

Tibiae apice unco intus armatae.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* capite rostroque paullo longiores, in medio rostri insertae, minus tenues, fractae, reflexae, 10-articulatae: articulo 1^o elongato, clavato, oculos haud attingente, 2^o et 3^o longiusculis, obconicis, illo majore, 4-6 brevibus, transversis; clava ovali, subsolida, articulis 4 artissime conjunctis. — *Rostrum* thoracis longitudine vel brevius, validiusculum, teres, plus minusve arcuatum, deflexum; scrobe pone medium incipiente, in basi rostri subtus desinente. — *Oculi* majusculi, ovati, parum convexi. — *Thorax* longitudine vix latior, subcylindricus, antice summo apice paullo angustior, basi apiceque truncatus, supra modice convexus. — *Scutellum* triangulare. — *Elytra* thoracis basi vix latiora, quo triplo longiora, linearia, subcylindrica, convexa, apice obtuse rotundata, anum obtegentia. — *Pedes* breviusculi, validi, antici approximati; femoribus crassis, aut armatis, aut muticis; tibiis omnibus compressis, apice oblique truncatis, intus unco horizontali armatis; tarsis sub-

tus spongiosis, articulis duobus basalibus triangulatis, 3^o latiore, bilobo, ultimo gracili, elongato, biunguiculato.

Typus: — *Mecin. Pyraastre* Germ. l. *Rhynchaen. semicylindricus* Gyll. — Congenerici: *Mecin. marginatus* et *collaris* Germ.

A μήκος longitudo.

Observatio. — Habitu haud dissimile generi *Baridii*. Quoad formam antennarum quandam habet cum *Cioni* et *Gymnetronis* convenientiam, sed clava antennarum subsolida est. Omnes tibiae ad apicem intus unguiculo instructae sunt.

Genus 188. *Nanodes* nob. — *Cionus* Clairv. Germ. — *Orebitis* Dej. *Rhynchaenus* Fabr. — Gyll. *Sphaerula* Megerle.

Character generis: — Antennae longiusculae, subtenuae; funiculo 5-articulato: articulo primo insequentibus paullo longiore; clava majuscula, oblongo-ovalis, apice acuminata, distincte 3-articulata.

Rostrum elongatum, teres, parum arcuatum.

Thorax conicus, antrorsum valde angustatus.

Elytra gibba, subovata.

Tibiae apice truncatae, muticae.

Descriptio: — *Corpus* minoris magnitudinis, valde convexum l. gibbum, ovale, utrinque attenuatum, alatum. — *Antennae* capite rostroque longiores, pone medium rostri insertae, tenues, fractae, 9-articulatae: articulo 1^o elongato, oculos subattingente, recto, sublineari, 2^o oblongo-ovato, 3^o brevioris, obconico, 4-6 paullo brevioribus, nodosis; clava majuscula, oblongo-ovali, 3-articulata, articulis distinctis, duobus basalibus subtransversis, apice truncatis, ultimo parum elongato, versus apicem sensim angustato, acuminato. — *Rostrum* capite thoraceque fere longius, validum, teres, lineare, parum arcuatum; scrobe angusta, pone gulam exeunte. — *Caput* minutum, angustum. — *Oculi* laterales, rotundati, parum convexi. — *Thorax* fere conicus,

antrorsum valde angustatus, truncatus, basi subbisinnatus, supra convexus. — *Scutellum* minutissimum, vix conspiciuum. — *Elytra* antice vix thoracis basi latiora, quo plus triplo longiora, humeris subelevatis; supra anterieus valde convexus, subgibbosa, posterius attenuata, subovata, pygidium obtegentia. — *Pedes* longiusculi, antici approximati; femoribus in medio valde incrassatis, muticis; tibiis rectis, teretibus, subtenuibus, apice truncatis, muticis; tarsis subtus spongiosis, articulis 1, 2 triangularibus, 3^o bilobo, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — Rhynchaen. Lythri Auctor. — Congenerici: Cion. Ulmi-pallidulus et globulus Germ. — Orob. Tamarisci Dej.

A *νανίδης* pumilio, pumilionis formam habens.

Observatio. — A genere Cioni mox dignoscitur: clava antennarum majuscula, oblongo-ovali, distincte 3-articulata, forma corporis valde convexus, utrinque attenuata.

Sectio 3a. Antennae 10, 9, 8, 7 articulae. (Funiculus variat numero articularum: 6, 7 et 4.)

Divisio 5a. Calandraeides: Antennae mediocres; funiculus 6-articulatus, clava aut biarticulata, aut indistincte articulata, subsolida. Rostrum aut deflexum, aut porrectum.)

Subdivisio 1a. (Cryptopygi). Pygidium elytra tegunt.

Genus 189. Rhina Latr. Oliv. Illig. Lixus Fabr.

Character generis: — Antennae mediocres; funiculo 6-articulato; clava elongata, cylindrica, apice compressa, subsolida.

Rostrum elongatum, porrectum, subteres, supra inaequale, apice utrinque reflexum.

Thorax subovatus, perparum convexus.

Elytra elongata, cylindrica.

Pedes praecipue antici elongati.

Descriptio: — *Corpus* majoris magnitudinis, oblongo-subcylindricum, convexum, alatum. — *Antennae* thoracis medium pertingentes, in medio rostri insertae, subtenues, fractae, 9-articulatae; scapo elongato, oculos attingente, clavato; funiculo 6-articulato: in uno sexu, (quem opinor esse marem) articulis subobconicis, secundo longiore, clavato, in altero (femina) 2^o et 3^o obconicis, illo brevi, 3-6 aequalibus, subglobosis; clava elongata, ovali, cylindrica, apice compressa, subacuta, excorticata, subsolida, vel molliore substantia, nec (interna solum basi excepta), cute coriacea vestita. — *Rostrum* longitudine, variat: in uno sexu capitis thoracisque longitudine in altero brevius, porrectum, subterea, supra inaequale, apice utrinque reflexum; scrobe in medio incipiente, subtus flexa, ante basin rostri desinente. — *Oculi* maximi, oblongi, modice convexi, et supra et infra subconnati, totam anticam capitis superficiem occupantes. — *Thorax* latitudine longior, subovatus, basi obsolete bisindatus, antice subtruncatus, in medio leviter emarginatus, supra nonnihil convexus. — *Scutellum* triangulatum. — *Elytra* thoracis medio vix latiora, quo vero plus duplo longiora, humeris obtuse angulatis; subcylindrica, convexa, apice obtuse rotundata. — *Pygidium* saepius nudum, semiotundatum. — *Pedes* elongati, antiqui reliquis longiores, distantes; femoribus simplicibus, subcylindricis, compressis; tibiae intus spinis paucis instructae, et apice unco magno, subhorizontali armatae; tarsis elongatis, subtus spongiosis, articulis duobus prioribus subclavatis, 3^o latiore, bilobo, ultimo longiore, subclavato, unguitibus duobus validis praedito.

Typus: — *Rhina barbirostris* Latr. Oliv. (♂?) — *Rhina verrirostris* (♀?) Illig. — Huc, opinor referri quoque posse: *Rhina scrutator* Oliv.

A *qiv* nasus.

Genus 190. *Sipalus* nob. — *Calandra* Fabr.

Character generis: — *Antennae* breviusculae, validae; funiculo 6-articulato: articulis brevibus, apice truncatis, 8^o et 9^o clavam pyriformem construentibus.

Rostrum elongatum, teretiusculum, deflexum.

Thorax subovatus, basi truncatus, pone oculos plus minusve lobatus.

Elytra oblongo-ovata, convexa.

Pedes longi; tarsi angustati, subtus haud spongiosi.

Descriptio: — *Corpus* convexum, rigidum, oblongum, subcylindricum, alatum. — *Antennae* thoracis medium vix pertingentes, versus medium rostri insertae, validae, fractae, 9-articulatae; scapo elongato, aut clavato, aut obconico, oculorum marginem inferiorem subattingente; funiculo subcylindrico, 6-articulato: articulis aut 1^o et 2^o obconicis, aut omnibus aequalibus, brevibus, apice truncatis; clava pyriformi, bi-articulata, articulo basali rigido, saepius apice utrinque rotundato-producto, in aliis truncato, ultimo spongioso, breviter ovato, acuminato. — *Rostrum* thoracis longitudine, validum, teretiusculum, ante antennarum insertionem crassius, arcuatum, deflexum; scrobes profundae, sensim subtus flexae, in medio incipientes, in basin rostri subtus coeuntes. — *Oculi* oblongi, infra caput conniventes, depressi, magni. — *Thorax* latitudine longior, aut subcylindricus, aut subobovatus, basi truncatus, ad latera antica coarctatus, supra parum convexus, versus oculos plus minusve distincte lobatus. — *Scutellum* triangulare, distinctum. — *Elytra* thoracis basi dimidio latiora, quo triplo longiora, humeris obtuse angulatis; oblongo-ovata, convexa, versus apicem subcallosa, pygidium tegentia. — *Pedes* longi, validi, antici reliquis longiores, approximati; femoribus simplicibus, sublinearibus, versus apicem vix incrassatis; tibiis teretibus, omnibus apice inflexis, interiore unco valido armatis; tarsis angustatis, subtus canaliculatis, haud spongiosis, articulis subtrigonis, penultimo haud distincte bilobo, ultimo elongato, subclavato, biunguiculato, unguibus longis, gracilibus.

Typus: — *Calandra granulata* Fabr. — Congenerici: *Sipal. mendicus* et *porriginosus* nob.

Α σικαλός, difficilis, deformis.

Observatio: — Hoc genus habitu generi Heilipi aliquanto simile est. Constructione verò antennarum ad Calandram propius accedit. Valde quoque affine generi Oxyrhinchi, sed antennae fractae, haud porrectae, scutellum triangulare, tarsi angustiores, subtus canaliculati.

Subdivisio 2a. (Gymnopygi.) Pygidium nudum, seu ab elytris non tectum.

Genus 191. Rhynchophorus Herbst. — Calandra Clairv. Fabr. Oliv. Latr. — Curculio Linn. De Geer. — Cordyle Thunb. Billb.

Character generis: — Antennae versus basin rostri insertae, funiculo 6-articulato; clava biarticulata, aut brevis, aut magis elongata, compressa, truncata, articulo ultimo spongioso.

Rostrum elongatum, teres, ante insertionem antennarum incrassatum.

Thorax subovatus, antice angustior, collo quasi annulari caput arcte cingens, postice rotundatus, supra planiusculus.

Elytra plana, anum non obtegentia.

Pedes plerumque breviusculi; tarsi subtus spongiosi, articulus penultimus cordatus, haud distincte bilobus.

Descriptio: — Corpus elliptico-ovatum, supra planum, alatum; species plures amplexus maximas. — *Antennae* thoracis medium vix superantes, prope basin rostri sub tuberculo laterali insertae, validiusculae, fractae, 9-articulatae; scapo elongato, thoracem attingente, versus apicem sensim incrassato; funiculo reflexo, 6-articulato; articulis brevibus, 1 et 2 turbinato-obconicis, reliquis aut apice truncatis, aut subglobosis; clava biarticulata, aut brevi, subsecuriformi, aut magis elongata, subovata, articulo ultimo spongioso, truncato, compresso-acuminato l. cultrato, retractili. — *Rostrum* longitudine thoracis, validum, subde-

flexum, teres, ante insertionem antennarum crassius, saepius arcuatum, rarius rectum; scrobe ad basin rostri laterali-ter posita, brevissima, profundissima, curvata. — *Oculi* oblongi, caput subtus cingentes, immersi. — *Thorax* magnus, latitudine longior, subovatus, anterieus angustior, truncatus, coarctatus, linea transversa impressa, collum quasi annuli-forme formante notatus, postice semirotundatus, supra planiusculus, subtus integer. — *Scutellum* in plerisque elongatum, acuminatum, in paucis punctiforme. — *Elytra* thoracis basi paullo latiora, quo sesqui longiora, humeris obtuse subangulatis, prominulis; antice simul introrsum rotundato-emarginata, apice abbreviata, truncata, supra planiuscula, lateribus rectis. — *Pygidium* apertum, acute prominulum. — *Pedes* in plerisque breviusculi, validi, basi distantes, subtus saepius ciliati; femoribus modice incrassatis, compressis, muticis; tibiis valde compressis, uncovalido, corneo, ad apicem subdeflexo armatis; tarsis gracilibus, articulo 1^o elongato, subclavato, 2^o trigono, 3^o latiore, cordato, supra ad sequentis insertionem excavato, subtus spongioso, non distincte bilobo, 4^o elongato, clavato, biunguiculato.

Stirps 1^a. — Clava antennarum brevis.

Typus: — *Calandra palmarum* Auctor. — Congenerici: *Cal. serrirostris* — Borassi, *Phoenicis*, Schach, *longipes* et *ferruginea* Fabr. — *rubiginea* et *haemorrhoidalis* Wiedem.

Stirps 2^a. — Clava antennarum magis elongata.

Typus: — *Calandra abbreviata* Auctor. — Congenerici: *Rhynchophag. gages* Hbst. — *Cal. picea* Oliv. — *Cal. sordida*, subclavata, et *Carmelita* Germ. — *Cal. funebris* Illig. — *Cal. limbata*; 4-punctata, hemiptera et cribraria Fabr. et plures aliae species.

A ῥυγχος rostrum, φορὸς ferens.

Observatio: — Hoc genus valde conspicuum reddunt antennarum insertio prope basin rostri, elytra abbreviata et clava antennarum, cujus articulus extremus spongiosus est,

sed forma longe alia ac ceterorum ad hanc Divisionem pertinentium generum.

Optaverim quidem, ut huic generi nomen vulgo usitatum Calandra retinere potuissem; sed Calandrae granariae hoc, proprie competit jus, cum ita nominetur in ple-risque Galliae regionibus, et Meriana Curculionem granarium prima ita dixit; antiquam igitur Herbstii denominationem reposui.

Cordyle Thunb. nomen antea impositum, ut opinor, generi cuidam piscium.

Larvae maximam ad partem in medulla quarundam arborum, imprimis palmarum vivunt, paucae tamen species sub lapidibus in terra inveniuntur.

Subgenus Calandra. Clairv. Fabr. Oliv. Latr. Gyll. — Rhynchophorus Herbst. — Curculio Linn. De Geer.

Adumbratio: — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, prope basin rostri insertae; scapo thoracem attingente, versus apicem sensim incrassato; funiculo 6-articulato, minus tenui: articulis brevibus, subcoarctatis, apice truncatis; clava elongato-subovata, subacuminata, articulo ultimo spongioso. — *Rostrum* elongatum, teres, subdeflexum, saepius parum arcuatum. — *Thorax* valde elongatus, anterieus paullo angustior, basi apiceque truncatus, supra subdepressus. — *Elytra* thoracis basi hand latiora, quo vix longiora, lateribus rectis; supra parum convexa, apice rotundata, abdomine breviora. — *Pedes* breviusculi; tibiis intus saepius denticulatis, apice intus unco armatis; tarsis reflexis, subtus vix spongiosis, articulo penultimo subbilobo. — *Corpus* subdepressum, alatum, minoris magnitudinis.

Typus: — Calandra granaria Auctor. — Congenerici: Cal. frumenti et Oryzae Fabr.

Α καλῆν vocare et ἀνὴρ homo; (Liungh in Web. et Mohr Arch. I. 1. p. 71.

Observatio: — Species hujus subgeneris in seminibus frumentariis vitam degunt. — Forma clavae antennarum, thorax apice truncatus hoc subgenus a Rhynchophoris distinguunt.

(*Divisio* 6^{ta}. C o s s o n i d e s. Antennae breves; funiculus 7-articulatus; clava aut biarticulata, aut subsolida. Rostrum subdeflexum. Pygidium elytra tegunt.)

Genus 192. Amorphocerus nob.

Character generis: — Antennae breves, crassae; funiculus 7-articulatus: articulis transversis, perfoliatis; clava breviter subovata, biarticulata, articulo ultimo spongioso.

Rostrum longiusculum, subcrassum, arcuatum.

Thorax antrorsum paullo angustior, basi apiceque truncatus.

Elytra elongata, linearia, supra modice convexa.

Tibiae versus apicem dilatatae, unco magno, subdeflexo armatae; articulus penultimus tarsorum latior, bilobus.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, angustum, supra parum convexum, alatum. — *Antennae* rostro capiteque vix longiores, in medio rostri insertae, crassae, fractae, 10-articulatae; scapo oculos superante, crasso, clavato, versus apicem in latere interiore angulato - dilatato; funiculo 7-articulato: articulo 1^o brevissime obconico, crasso, reliquis multo brevioribus, transversis, perfoliatis; clava breviter subovata, biarticulata, articulo basali rigido, ultimo spongioso, extus subcompressa. — *Caput* porrectum, subconvexum. — *Rostrum* vix capite duplo longius, deflexum, subcrassum, subteres, nonnihil complanatum, arcuatum; scrobe pone medium incipiente, profunda, latiuscula, infra oculos desinente. — *Oculi* laterales, rotundati, modice convexi, magni. — *Thorax* oblongus, antrorsum paullo angustior, coarctatus, antice posticeque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra parum convexus, subtus integer. — *Scutellum*

parvum, rotundatum, vix conspicuum. — *Elytra* thorace vix latiora, sed fere duplo longiora, linearia, supra modice convexa, apice rotundata, abdomen obtegentia. — *Pedes* breviusculi, validi, distantes, longitudine subaequales; femoribus valde clavatis, compressis; tibiis versus apicem dilatatis, anticis supra excavatis, tarsos recipientibus, apice subtruncatis, denticulis extus et intus instructis, et praeterea in medio unco magno subdeflexo armatis; tarsis brevibus, articulis 1 et 2 subtriangularibus, 3^o manifeste latiore, distincte bilobis, subtus spongioso, ultimo clavato, biunguiculato.

Typus: — *Amorphocer. Talpa* nob. e Cap. h. sp. hanc unam vidi.

Ab ἄμορφος deformis, κέρας cornu.

Observatio: — Quoad habitum generi *Cossoni* valde simile, dissimile vero antennarum, tibiarum et tarsorum structura, ut etiam clava antennarum distincte biarticulata, clavam indicat diversitatem.

Genus 193. *Cossonus*. Clairv. Fabr. Latr. Germ. Gyll. — *Curculio* Linn. Herbst. Panz. Payk. — *Hylesinus* Fabr.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; funiculo 7-articulato: articuli basales sequentibus paullo longiores, subobconici, reliquis brevibus, transversis, subperfoliatis; clava magna, ovata, subsolida.

Rostrum elongatum, apice dilatatum.

Thorax oblongus, subquadrangulatus, supra subplanus.

Elytra elongata, linearia, supra modice convexa.

Tarsi graciles, articulus penultimus angustatus.

Descriptio: — *Corpus* parvum, valde elongatum, sublineare vel subcylindricum, antice angustatum, durum, alatum. — *Antennae* capite rostroque fere longiores, pone medium rostri insertae, inflexae, fractae, crassiusculae; articulo 1^o oculos attingente, clavato, 2 et 3 longiusculis, sub-

obconicis, 4-8 brevibus, transversis, apice truncatis vel subperfoliatis; clava magna, ovata, quasi subspongiosa, subso-
lida, articulis 3 l. 4 indistinctis, interdum haud omnino discernendis. — *Rostrum* vix capite duplo longius, subdeflexum, basi in plerisque angustum, extrorsum aut valde incrassatum, aut dilatatum, parum arcuatum, in paucis lineare, subteres; scrobes prope apicem incipientes, profundae, lineares, statim subtus flexae, in basin rostri coeuntes. — *Caput* porrectum, convexum. — *Oculi* laterales, rotundati, depressi. — *Thorax* latitudine multo longior, subquadrangulatus, juxta apicem jam cito angustior, coarctatus, basi apiceque truncatus, lateribus et angulis posticis parum rotundatus, supra aliquantisper convexus, saepius dorso postice longitrorsum impresso. — *Scutellum* parvum, rotundatum. — *Elytra* thorace vix latiora, sed plus duplo longiora, linearia, supra modice convexa, apice obtuse rotundata, anum occultantia. — *Pedes* breviusculi, validi, distantes, subaequales; femoribus clavatis, muticis; tibiis subteretibus, basi angustatis, apice extus unco magno, deflexo armatis, anticis extus excavatis, tarsos recipientibus; tarsis gracilibus, articulo basali longiusculo, obconico, 2 et 3 brevibus, angustatis, subcylindricis, ultimo clavato, biungiculato.

Typus: — *Cosson linearis* Auctor. — Congenerici: — *C. ferrugineus* Clairv. — *Hylesinus brevipēs* et *canaliculatus* Fabr. — *Cossonus Squama* et *elongatulus* Fabr. —

A *Cossus* seu *Cossis* nomen antiquum apud Plinium.

Observatio: — Valde affine videtur generi *Hylesini* (*Hylurg.* Latr.) ex familia *Xylophagorum* et sicut hi in annosis truncis arboreis vivunt. Horum vero antennae haud fractae sunt, tarsique habent quinque articulos, quorum tamen quatuor solum conspicui sunt; articulus minus evidens proxime ad articulum unguicularem locum sibi vindicat, tenuis est, interdum quidem conspicitur, sed saepissime sub articulum tertium retractus. Eandem cum *Bostrichi* genere (*Tomicus* Latr.) rationem inveni.

Subgenus *Rhyncholus*. Crenz. Megerle, Dej. — *Cossonus* Germ. Gyll. — *Hylesinus* Fabr. — *Curculio* Linn. Payk. Herbst.

Adumbratio: — Antennae breves, crassiusculae, in medio rostri insertae; funiculo 7-articulato: articulo basali majore, obconico, reliquis brevibus, subperfoliatis; clava minuta, aut oblongo-ovali, aut brevi, obtusa, indistincte articulata, quasi spongiosa. — *Rostrum* lineare, in plerisque brevissimum, latitudine capitis, quo vix longius; in aliis capite duplo longius, cylindricum. — *Oculi* rotundati, laterales, modice prominuli. — *Thorax* oblongus, convexus. — *Elytra* elongata, convexa, subcylindrica. — *Tarsi* graciles, in plerisque articuli omnes angustati, in nonnullis (ex. gr. *Rh. chloropo*) articulus penultimus paullo latior, bilobus. — *Corpus* minutum, subcylindricum, durum, alatum.

Typus: — *Cossonus* (*Rhyncholus*) *chloropus* Gyll. — Congenerici: *Coss. lignarius* Gyll. — *Rhynchol. crassirostris* Crenz. — *Rhynch. brevirostris* Megerle, aliaeque plures.

Α ῥυγχος rostrum, ὄλος atramentum.

Observatio: — Videtur essentialiter differre a *Cossonis* genuinis, quod primus tantum articulus in funiculo antennarum ceteris longior est, clava minor, rostrum aliter constructum et corpus magis convexus.

(*Divisio 7a. Dryophthorides*. Antennae breves; funiculus 4-articulatus. Rostrum subdilexum. Pygidium elytra tegunt.)

Genus 194. *Dryophthorus*. Schüpp. et Germ. in litt. *Lixus* Fabr. — *Cossonus* Gyll. — Oliv. — *Curculio* Herbst. Payk. Panz. *Bulbifer*. Meg. Dej.

Character generis: — Antennae breves, crassiusculae; funiculo 4-articulato; clava ovalis, subsolida, apice pubescens.

Rostrum longiusculum, crassiusculum, teres.

Thorax oblongus, basi apiceque truncatus, ante apicem subconstrictus.

Elytra elongata, convexa, versus apicem attenuata, ad latera apicis utrinque carinata.

Tibiae angustatae, apice unco subdeflexo armatae; tarsi graciles, 5-articulati.

Descriptio: — *Corpus* elongatum, exsculptum, durum, pulvere griseo plerumque obductum, alatum. — *Antennae* breves, rostro paullo longiores, ante medium rostri insertae, validae, fractae; scapo supra oculos sese extendente, versus apicem incrassato, subclavato, parum recurvato: funiculo 4-articulato: articulis 1 et 2 breviusculis, subobconicis, 3 et 4 paullo brevioribus, subcylindricis, coarctatis, gradatim crassitudine crescentibus; clava ovali, subso-lida, apice ex substantia molliore veluti spongiosa, pubescente, setis 4-6 subtilibus instructa. — *Rostrum* capite duplo longius, crassiusculum, teres, subarcuatum; scrobe brevi, curvata, pone marginem oculi desinente. — *Caput* porrectum, modice convexum. — *Oculi* laterales, oblongi, depressi, parvi. — *Thorax* latitudine longior, antice angustior, ante apicem transversim impressus, fere constrictus, basi apiceque subtruncatus, supra modice convexus, subtus integer. — *Scutellum* haud observandum. — *Elytra* thoracis basi latiora, quo plus duplo longiora, humeris obtuse angulatis; versus apicem attenuata, utrinque ad latera apicis carina obliqua argute elevata, apice ipso obtuse rotundata, subtruncata, anum occultantia. — *Pedes* breviusculi, subtenues, aequales, parum distantes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis angustatis, teretibus, apice unco valido, subdeflexo armatis; tarsis gracilibus 5-articulatis, articulo 1^o subobconico, 2, 3 et 4 subcylindricis, hoc paullo minore et angustiore, 5^o seu ultimo elongato, sublineari, biungiculato.

Typus: — *Lixus Lymexylon* Fabr. vel *Cossonus* idm. Gyll. — Hanc unam vidi speciem.

Α δρῦς arbor, quercus, φθίρω rodo, edo.

334 GONATOCERI. DRYOPHTHORIDES.

Observatio: — Habitu haud multum differt a genere *Ba-*
goi, sed ab omnibus, quæ ad hanc familiam numerantur ge-
neribus, evidentissime discrepat; tarsi enim quinque articu-
lis valde conspicuis instructi sunt. Tales aberrationes natu-
rae, etsi raræ sint, plures tamen afferendas habemus. Ge-
nus *Platypi* quinque habet articulos conspicuos in omni-
bus tasis, cum e contrario *Apate*, *Cis*; *Phloeotribus*
et *Coptogaster* quatuor modo; quin immo vèro nonnun-
quam fit, ut diversi sexus ejusdem speciei ipaequalem habe-
ant numerum articulorum in tasis, ex. gr. *Cucujus de-*
pressus, species quaedam generis *Cryptophagi*.

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM, LEGIONUM, DIVISIONUM, GENERUM ET SUBGENERUM.

Obs. Nomina Legionum, Divisionum Ordinumque litteris grandioribus, nomina Generum litteris minoribus et subgenerum obliquis litteris designantur.

	Pag.		Pag.
<i>Acalles</i>	295	<i>Aterpus</i>	156
<i>Acallopius</i>	249	<i>ATTELABIDES</i>	42
<i>Alcides</i>	270	<i>Attelabus</i>	43
<i>Alophus</i>	166	<i>Auletes</i>	46
<i>Amalus</i>	240	<i>Bagous</i>	289
<i>Amblyrhinus</i>	183	<i>Balaninus</i>	238
<i>Amerhinus</i>	266	<i>Baridius</i>	274
<i>Amorphocerus</i>	329	<i>Barynotus</i>	164
<i>Amysteus</i>	202	<i>BELIDES</i>	73
<i>Anacmerus</i>	126	<i>Belus</i>	73
<i>Anchonus</i>	257	<i>Blosyrus</i>	99
<i>Anoplus</i>	244	<i>Bothynoderes</i>	147
<i>Anthonomus</i>	236	<i>Brachonyx</i>	232
<i>ANTHRIBIDES</i>	32	<i>BRACHY CERIDES</i>	78
<i>Anthrribus</i>	32	<i>Brachycerus</i>	79
<i>ANTLIARHINIDES</i>	67	<i>Brachyderes</i>	102
<i>Antliarhinus</i>	67	<i>BRACHYDERIDES</i>	94
<i>Apion</i>	47	<i>Brachypus</i>	217
<i>APIONIDES</i>	47	<i>BRACHYRHYNCHI</i>	80
<i>Apoderus</i>	42	<i>Brachysomus</i>	99
<i>Araecerus</i>	40	<i>Brachytarsus</i>	38
<i>Arrhenodes</i>	70	<i>Bradybatus</i>	234
<i>Arthrostenus</i>	287	<i>BRENTIDES</i>	68
<i>Artipus</i>	133	<i>Brenthus</i>	68
<i>Asemus</i>	129	<i>BRUCHIDES</i>	27
<i>Astycus</i>	129	<i>Bruchus</i>	27

	Pag.		Pag.
<i>Calandra</i>	328	<i>Derelomus</i>	235
CALANDRAEIDÆ	323	<i>Dereodus</i>	125
<i>Callinotus</i>	263	<i>Diaprepes</i>	116
<i>Callizonus</i>	123	<i>Dionychus</i>	264
<i>Camptorhinus</i>	283	<i>Diorymerus</i>	311
<i>Centrinus</i>	308	DRYOPHTHOEIDÆ	332
<i>Centorhynchus</i>	296	<i>Dryophthorus</i>	332
<i>Cherrus</i>	89	<i>Elytrodon</i>	209
<i>Chloebius</i>	211	<i>Eudæus</i>	250
<i>Chlorophanus</i>	53	ENTIMIDÆ	80
CHOLIDÆ	261	<i>Entimus</i>	83
<i>Cholus</i>	262	<i>Eutyus</i>	141
<i>Chrysolopus</i>	148	<i>Epichthonius</i>	200
CIONIDÆ	318	<i>Epirthynchus</i>	86
<i>Cionus</i>	318	<i>Episomus</i>	185
<i>Cleogonus</i>	315	<i>Episus</i>	78
CLEONIDÆ	145	<i>Ereinnus</i>	200
<i>Cleonus</i>	145	ERIRHINIDÆ	215
<i>Cneorhinus</i>	96	<i>Erirhinus</i>	229
<i>Coelosternus</i>	284	<i>Erodiscus</i>	237
<i>Compus</i>	109	<i>Eucorynus</i>	41
<i>Coniatus</i>	176	<i>Euderes</i>	227
<i>Coptorus</i>	302	<i>Euparius</i>	56
<i>Corrhæcerus</i>	40	<i>Eurhinus</i>	312
<i>Coryssomerus</i>	241	<i>Eurylobus</i>	152
<i>Coryssopus</i>	303	<i>Eusomus</i>	103
<i>Cosmorhinus</i>	196	<i>Eustales</i>	113
COSSONIDÆ	329	<i>Exophthalmus</i>	115
<i>Cossonus</i>	330	<i>Geophilus</i>	161
<i>Cratopus</i>	120	GONATOCERI	80
<i>Cratosomus</i>	278	<i>Gorgus</i>	279
<i>Cryptops</i>	65	<i>Gronops</i>	157
CRYPTOPSIDÆ	65	<i>Grypidius</i>	231
CRYPTORHYNCHIDÆ	277	<i>Gymnaetron</i>	319
<i>Cryptorhynchus</i>	280	<i>Gymnognathus</i>	37
CYCLOMIDÆ	185	<i>Hadromerus</i>	136
<i>Cyclomus</i>	198	<i>Hadropus</i>	111
CYLADEΣ	74	<i>Heilipus</i>	221
<i>Cylas</i>	74	<i>Herpisticus</i>	101
<i>Cylindrocerus</i>	310	<i>Hipporhinus</i>	85
<i>Cyphicerus</i>	182	<i>Holcorhinus</i>	194
<i>Cyphirhinus</i>	276	<i>Homalinotus</i>	265
<i>Cyphus</i>	107	<i>Hormocerus</i>	70
<i>Deracanthus</i>	90	<i>Hydaticus</i>	242

	Pag.		Pag.
Hydronomus	231	Omius	198
Hylobius	170	Oosomus	195
Hyphaptus	207	Orchestes	255
Hypomeces	224	Orobites	514
Hypsopodus	150	ORTHOCERI	27
Ileomus	220	Orthorhinus	223
ITHY CERIDES	53	OTIORHYNCHIDES	203
Ithycerus	55	Otiorthynchus	203
Lachnaeus	59	Oxyderes	110
Laemosaccus	60	Oxyops	61
Larinus	219	OXYRHINCHIDES	76
Lasiopus	153	Oxyrhynchus	77
Lechriops	506	Pachnaeus	122
Lepropus	154	Pacholenus	216
Lepyrus	167	Pachycerus	87
Leptocerus	104	PACHYRHYNCHIDES	88
Leptosomus	143	Pachyrhynchus	92
Liophloeus	159	Panus	52
Lisorbinius	130	Paramecops	234
Listroderes	158	Penestes	226
Lixus	215	Peritelus	193
Lordops	153	Phaedropus	112
Lyrus	288	Phaenithon	37
Macrocerynus	179	Phloeobius	56
Macromerus	285	Phloeotragus	55
Madarus	275	Phlyctinus	198
Mecaspis	56	Pholicodes	186
Mecinus	321	PHYLLOBIDES	178
Mecocorynus	283	Phyllobius	186
Mecopus	304	Phytonomus	176
MECORHYNCHI	214	Phytoscapus	216
Metallites	140	Piazorus	303
Miccotrogus	247	Pinarus	307
Minyops	163	Pissodes	225
Molytes	172	Platycopes	100
MOLYTIDES	167	Platyomus	109
Mononychus	299	Platonyx	272
Myllocerus	178	Platyrhinus	34
Myorhinus	215	Plectrophorus	106
Nanodes	322	Plinthus	173
Nemorhinus	71	Polydus	82
Nerthops	60	Polydrosus	138
Nottarhinus	269	Prepodes	117
Ocladius	316	Promecops	136

	Pag.		Pag.
<i>Prostomus</i>	142	<i>Solenosternus</i>	277
<i>Protenomus</i>	131	<i>Stenocerus</i>	39
<i>Prypnus</i>	87	<i>Stenocorynus</i>	64
<i>Psalidium</i>	92	<i>Sternachus</i>	251
<i>Ptilopus</i>	118	<i>Stomodes</i>	188
<i>Ptochus</i>	187	<i>Strophosomus</i>	97
<i>Ptychoderes</i>	34	<i>Styphlus</i>	258
<i>Pycoderes</i>	194	<i>Syzygops</i>	93
<i>Rhachus</i>	30	<i>Tachyerges</i>	256
<i>RHAMPHIDES</i>	49	<i>Tanaos</i>	63
<i>Rhamphus</i>	49	<i>Tanymecus</i>	127
<i>Rhigus</i>	81	<i>TANYRHYNCHIDES</i>	212
<i>Rhina</i>	323	<i>Tanyrbynchus</i>	212
<i>Rhinastus</i>	261	<i>Tanysphyrus</i>	168
<i>Rhinocyllus</i>	58	<i>Tapinotus</i>	292
<i>Rhinopacer</i>	45	<i>Taphroderes</i>	72
<i>RHINOMACERIDEA</i>	45	<i>THAMNOPHILIDES</i>	50
<i>Rhynchites</i>	44	<i>Thamnophilus</i>	51
<i>Rhyncholus</i>	332	<i>Thylacites</i>	94
<i>Rhynchophorus</i>	326	<i>Trachodes</i>	260
<i>Rhytideres</i>	149	<i>Trachyphloeus</i>	189
<i>Rhytirrhinus</i>	162	<i>Tropideres</i>	35
<i>Sciaphilus</i>	98	<i>Tychius</i>	245
<i>Sciobius</i>	197	<i>Tyloderes</i>	206
<i>Scleropterus</i>	190	<i>Tylodes</i>	294
<i>Scytropus</i>	140	<i>Tylomas</i>	253
<i>Sibynes</i>	247	<i>ULOCERIDES</i>	75
<i>Sipalus</i>	324	<i>Ulocerus</i>	75
<i>Sitona</i>	134	<i>Ulosomus</i>	295
<i>Solenopus</i>	268	<i>Urodon</i>	31
<i>Solenorhinus</i>	256	<i>Zygops</i>	300



